

**АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ
ТОҶИКИСТОН
ИНСТИТУТИ ЧОРВОДОРӢ ВА ЧАРОГОҲ**

Ба ҳуқуқи дастнавис



**УДК: 636.2 (575-3)
ББК 43.0 (2 тадж)
И -32**

ИЗАТУЛОЕВ САФРАЛИ

**РУШДУ ИНКИШОФ ВА МАҲСУЛНОКИИ БУҚАЧАҲОИ
ГЕНОТИПАШОН ГУНОГУН ДАР ШАРОИТИ ПАРВАРИШИ
ЧАРОГОҲӢ**

ДИССЕРТАТСИЯ

оид ба дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои кишоварзӣ

аз рӯйи ихтисоси 4.2.2 - Зотпарварӣ, селекция
ва генетикаи ҳайвоноти кишоварзӣ

Роҳбари илмӣ:
доктори илмҳои кишоварзӣ
Иргашев Т.А.

Душанбе - 2025

МУНДАРИЧА

Сарсаҳифа

Номгӯи ихтисорҳо, аломатҳои шартӣ.....	4
МУҚАДДИМА.....	5
БОБИ 1. ШАРҲИ АДАБИЁТ.....	13
1.1. Дурагакунӣ яке аз усулҳои баланд бардоштани маҳсулнокии ҳайвоноти хоҷагии қишлоқ.....	13
1.2. Истифодаи технологияи интенсивӣ дар зиёд намудани истеҳлоли гӯшти гов	19
1.3. Минтақаҳо, навъҳои асосӣ ва тавсифи мухтасари растаниҳои чарогоҳӣ.....	27
БОБОИ 2. МАВОД ВА МЕТОДИКАИ ТАДҚИҚОТ.....	33
2.1. Шароити табиӣ ва иқлимӣ минтақаи гузаронидани корҳои тадқиқотӣ.....	33
2.2. Мавод ва усулҳои тадқиқот.....	35
БОБИ 3. НАТИҶАҲОИ ТАДҚИҚОТ.....	38
3.1. Ба вучуд овардани типи нави чорвои сергӯшти тоҷикӣ.....	38
3.2. Баҳодихии (апробатсияи) типи чорвои калони сергӯшти тоҷикӣ.....	40
3.3. Шароити ҳӯронидан ва парвариши букҷаҷаҳо.....	45
3.4. Хусусиятҳои афзоиш ва рушди букҷаҷаҳо дар давраи парвариш.....	48
3.4.1. Вазни зиндаи букҷаҷаҳои генотипҳои гуногун.....	50
3.5. Рушд ва афзоиши букҷаҷаҳои генотипҳои гуногун.....	54
3.6. Нишондиҳандаҳои гематологӣ хуни букҷаҷаҳо.....	57
3.6.1. Нишондиҳандаҳои морфологӣ хуни букҷаҷаҳо.....	58
3.6.2. Нишондиҳандаҳои биохимиявӣ хуни букҷаҷаҳо.....	63
3.7. Системаи парвариши букҷаҷаҳо дар чарогоҳҳои тобистонаи баландкӯҳ.....	64
3.8. Маҳсулнокии гӯштии букҷаҷаҳо, таркиби морфологӣ	

тана ва қисмҳои он.....	68
3.8.1. Нишондиҳандаҳои забҳи назоратии буқчаҳо.....	68
3.8.2. Арзёбии муқоисавии сифати гӯшт, равған ва мушаки дарозтарини пушт.....	76
3.8.3. Арзиши энергетикӣ маҳсулоти асосии гӯштӣ.....	82
3.8.4 Баромад ва рушди узвҳои дохилии буқчаҳо.....	85
3.9. Нишондиҳандаҳои миқдорию сифатии пӯст ва чарми тайёри буқчаҳо.....	87
3.9.1 Баҳодиҳии муқоисавии пӯсти буқчаҳои генотипҳои гуногун.....	87
3.9.2. Хусусиятҳои молию технологияи пӯсти тайёр.....	94
3.9.3. Таркиби химиявии чарми буқчаҳо бо технологияи коркарди хромӣ ва сурхи дубӣ.....	97
3.9.4. Хусусиятҳои физикӣ ва механикӣ чарм дар вақти коркард барои чарми хромӣ ва падоши сурхи дубӣ.....	99
3.10. Хусусиятҳои этиологии буқчаҳои генотипҳои гуногун дар шароити кӯҳистон.....	101
3.11. Хусусиятҳои физиологии буқчаҳои генотипҳои гуногун.....	104
БОБИ 4. Натиҷаҳои таҷрибавии истеҳсоли.....	110
3.12. Натиҷаҳои таҷрибаҳои истеҳсолӣ.....	110
3.13. Самаранокии иқтисодии парвариши буқчаҳо дар шароити чарогоҳ.....	111
БОБИ 5. Таҳлили натиҷаҳои тадқиқот.....	117
Хулосаҳо.....	126
Тавсияҳо оид ба татбиқи амалии натиҷаҳои тадқиқот.....	128
Руйхати адабиёти истифодашуда.....	129
Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия.....	147
Замима.....	149

Рӯйхати ихтисорот ва аломатҳо

1. КОА – Комиссияи олии аттестатсионӣ.
2. ИУТИСГ — Институти умумироссиягии тадқиқоти илмӣ саноати
гӯшт.
3. РБД – Рақами бақайдгирии давлатӣ.
4. ФР – Федератсияи Русия.
5. АИКТ – Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон.
6. ДАТ – Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон.
7. ИУТИЧ — Институти умумироссиягии тадқиқоти илмӣ
чорводорӣ.
8. КЧ – килочоуль.
9. МТФДБ ТО – Муассисаи таълимии федералии давлатии бучетии
таҳсилоти олий.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи тадқиқот. Таъмини амнияти озуқавории аҳолии кишвар, вазифаи муҳими олимон ва мутахассисони соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Истеҳсоли озуқаворӣ сарфи назар аз системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва шаклҳои моликият барои ҳар як мамлакат шартӣ муҳимтарини фаолияти ҳаёти инсон буд ва мемонад. Говпарварӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ соҳаи пешбари чорводорӣ ба шумор рафта талаботи аҳолиро бо шир ва гӯшт таъмин менамояд.

Дар натиҷаи ислоҳоти дар соҳаи кишоварзии Тоҷикистон гузаронида шудааст ва дигаргуниҳои, ки ба амал омадааст бозори истеъмолии маҳсулоти муайяни озуқаворӣ хеле ғанӣ гардонида бошад ҳам, дар масъалаи бо ширу гӯшт ба қадри кофӣ таъмин намудани аҳоли камбудихо вучуд доранд.

Бояд гуфт, ки чорводорӣ манбаи асосии истеҳсоли шир ва гӯшт мебошад. Ин маҳсулот аз ҳисоби парвариши чорвои зотҳои ширдеҳ, ширу гӯштдеҳ ва гӯштӣ истеҳсол карда мешавад.

Масалан, зоти қазоқии сарсафед дар тараққӣ додани чорводории гӯштии Тоҷикистон аҳамияти калон бозид. Ин зоти чорво аз сабаби маҳсулнокии баланди гӯштӣ ва тобовар буданаш ба шароити ҳоси иқлимии мамлакатҳои Осиёи Миёна, инчунин дар Ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Руссия низ паҳн шудааст. Солҳои охир зоти қазоқии сарсафед аз рӯи хусусиятҳои асосии иқтисодию биологие, ки самаранокии парвариши онро муайян мекунанд, бо усули селекция ва селекцияи дохилизотӣ гузаронида мешавад.

Дар солҳои охир, қорҳои селекционӣ бо зоти қазоқии сафед тавассути интиҳоб ва ҷуфткунории дохилизотӣ аз рӯи хусусиятҳои асосии хоҷагидорӣ биологӣ, ки самаранокии парвариши онро муайян мекунад гузаронида шуда исодааст.

Дар Тоҷикистон дар баробари парвариши чорвои зотӣ қазоқии сарсафед барои баланд бардоштани маҳсулнокии гӯштӣ чорвои зебуи

маҳаллӣ бо истифода аз буққаҳои зотии қазоқӣ тадқиқотҳо гузаронда шудааст, ки дар натиҷаи он дар минтақаҳои кӯҳсор подаҳои маҳсусгардонидашуда ба вучуд оварда шудааст, ки бо як қатор хислатҳои биологӣ ва иқтисодӣ аз авлодҳои худ фарқ мекунад

. Ин дастоварди селексионӣ аз ҷониби комиссияи апробатсионии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гардида, бо қарори машваратии Вазорат таҳти унвони «Чорвои сергӯшти типии тоҷикӣ» (№1/2 аз 15 апрели соли 2023) тасдиқ шудааст.

Бинобар, ин дастоварди селексионӣ зарурияти гузарондани тадқиқотҳои комплексӣ оид ба омӯختани хусусиятҳои биологию хоҷагидорӣ типии тоҷикии чорвои гуштӣ ба миён омад, ки мубрамии қорри мазкурро муайян намудааст.

Дарачаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ.

Дар айни замон, ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар дигар кишварҳо дар минтақаҳои парвариши зоти қазоқии сафеди тадқиқотҳо сершумор оид ба омӯзиши хусусиятҳои хоҷагидорию биологии онҳо, аз ҷумла нишондиҳандаҳои афзоиш ва инкишоф, мутобиқшавӣ, сифатҳои фарбеҳкунӣ, қобилияти қорқарди хӯроки чорво ба маҳсулот ва маҳсулнокии гӯштӣ гузаронида шудаанд Т.А. Иргашев [57, с. 41-46], [60, с. 231-233], Х.Х. Тагиров [122, с. 108-111] В.И. Косилов [83, с. 204-206] ва диг.

Аз ин лиҳоз В.И., Косилов [74 с. 16-19] қайд мекунад, ки парвариши чорвои гӯштӣ дар Тоҷикистон, ки як қатор хусусиятҳои хоси худро дорад, ҷуноники ин соҳа пеш аз ҳама аз ҳисоби парвариши зотҳои маҳсусгардонидашудаи гӯштӣ - зотоҳои қалмиқӣ, қазоқии сарсафед, аббердин ангусс, герефордӣ ва дурағаҳои онҳо рушд мекунад. Минтақаҳои парвариши чорвои гӯштӣ асосан дар ноҳияҳои доманакӯҳҳо ва кӯҳии ҷумҳурӣ ба шумор меравад. Чорводорӣ ин ноҳияҳо ба истифодаи захираҳои табиӣ хӯроки чорво ва асосан аз растаниҳои чарогоҳ вобаста

аст. Ҳамаи ин омилҳо ба истехсоли гӯшти нисбатан арзон ва аз ҷиҳати экологӣ тоза мусоидат мекунад.

Дар Тоҷикистон парвариши чорвои зоти қазоқии сарсафед аз соли 1958 сар оғоз шуда буд. Натиҷаҳои тадқиқотҳо нишон доданд, ки ин зот аз давраи ворид намудан ва парвариш карданаш ба шароити кӯҳсори Тоҷикистонхело хуб мутобиқ шудааст.

Тавассути тадқиқотҳои гузаронидашудаи мақсаднок системаи самарабахши парвариши чорвои гӯшти аз хориҷа овардаи зотҳои гуногун кор карда баромада шудааст. Ин имконият дод, ки потенциали генетикии чорвои тозаи гӯштӣ оқилона истифода бурда, типҳои нави чорво ба вучуд оварда шавад.

Ин имкон дод, ки потенциали генетикии чорвои гӯштӣ "дар шакли холис" оқилона истифода гардида, типҳои нави онҳо ба вучуд оварда шаванд.

Робитаи тадқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзӯҳои илмӣ. Тадқиқотҳои илмӣ дар асосӣ барномаи илмию тадқиқотии шуъбаи селекция ва технологияи чорвои гӯшти Институти чорводорӣ ва чарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон «Таҳияи асосҳои илмию амалии ташкили базаҳои чорводории гӯштӣ дар шароити нави хоҷагидорӣ» № ГР 0106ТЗ 00553, № ГР 0106ТЗ 00553 ва мувофиқи мавзӯи тасдиқшудаи рисолаи номзадӣ дар мавзӯи «Рушду инкишоф ва маҳсулнокии буқчаҳои генотипашон гуногун дар шароити парвариши чарогоҳӣ», ки бо қарори Шӯрои олимони Институти чорводорӣ ва чарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон аз 29 июни соли 2018, протоколи №6 тасдиқ гардидааст гузаронда шудааст.

Тавсифи умумии тадқиқот

Мақсади тадқиқот. Мақсади тадқиқоти мазкур омӯзиши муқоисавии хусусиятҳои генотипӣ ва фенотипии чорвои типӣ сергӯшти тоҷикӣ ва дурагакунии онҳо бо чорвои беҳғардонидашудаи зебуи маҳаллӣ дар шароити парвариши кӯҳӣ ва чарогоҳҳо мебошад.

Вазифаҳои тадқиқот:

- муайян кардани динамикаи афзоиш ва инкишофи буқчаҳои генотипҳои гуногун вобаста ба синну сол ва шароити нигохдорӣ;
- омӯзиши қобилияти фарбеҳшавӣ, нишондиҳандаҳои миқдорию сифатии маҳсулнокии гӯшти буқчаҳо;
- хусусиятҳои морфофизиологии ҷавонаҳо ва сифати пӯсти буқчаҳои генотипҳои гуногун;
- муайян намудани самаранокии иқтисодии парвариши буқчаҳои зотӣ ва дураҳо дар шароити нигохдорӣ дар ҷароғохҳо;

Объекти тадқиқот. Объекти тадқиқот ҷорҳои гӯштии генотипҳои гуногун: ҷорҳои зебуи маҳаллӣ, типҳои тоҷикии сергӯшт ва дураҳои онҳо мебошанд, ки дар давоми сол дар шароити ҷароғохҳои хоҷагии доманакӯҳи ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон парвариш карда мешаванд.

Мавзӯи (предмет) тадқиқот. Парвариши ҷорҳои типҳои сергӯштии тоҷикӣ ва дураҳои онҳо бо ҷорҳои зебуи маҳаллӣ дар тамоми фасли сол дар ҷароғохҳо.

Навоварии илмӣ тадқиқот.

Қорҳои илмӣ тадқиқотӣ дар шароити ҷароғохҳои кӯҳӣ дар буқчаҳои типҳои тоҷикии ҷорҳои сергӯшт ва дураҳои онҳо бо ҷорҳои зебумонанди маҳаллӣ гузаронида шуданд, ки дар натиҷа хусусиятҳои афзоиш ва инкишоф, маҳсулнокии гӯштӣ, сифати пӯст, нишондиҳандаҳои морфофизиологии бадан вобаста ба тағйирёбии синну сол муайян карда шудаанд ва дар ин асос системаи истифодаи самарабахши дураакунии дохилизотӣ ва саноатиро дар шароити парвариши ҷорҳо дар тӯли сол ҷароғохҳо муайян карда шуд.

Аҳамияти назариявӣ ва илмӣ амалии тадқиқот. Аз нигоҳи назариявӣ, натиҷаҳои тадқиқот заминаро барои васеъ кардани дониш дар бораи имконияти усулҳои селекционӣ дар самти дураакунии дар доираи дохили зот ва саноатӣ мебошад ва аз нигоҳи амалӣ, онҳо имкон медиҳанд,

ки истехсоли гӯшт бо истифодаи оқилонаи захираҳои ҷарогоҳҳои табиӣ афзоиш ёбад.

Нуқтаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд.

1. Дар тадқиқотҳои нишондиҳандаҳои афзоиш ва инкишофи букҷаҳаҳои генотипҳои гуногун баррасӣ шуда, арзиши биологӣ ҳаҷагидорӣ онҳо таваиф карда шудааст;

2. Маҳсулнокии гӯштӣ, нишондиҳандаҳои сифатӣ он ва сифати технологи пӯсти букҷаҳаҳои генотипҳои гуногун муайян карда шуданд;

3. Дар асоси таҷрибаҳои гузаронидашуда самаранокии иқтисодӣ парвариши букҷаҳаҳои генотипҳои гуногун барои истехсоли гӯшт муайян карда шудааст.

Дарачаи ӯтимоднокии натиҷаҳои диссертатсия.

Ўтимоднокии натиҷаҳои ба даст овардашуда ба мазмуни тадқиқот, ҳулосаҳо ва таваифҳои диссертатсия асос ёфта, бо саршумори кофии ҷорво барои баҳодиҳии объективӣ натиҷаҳо бо усули коркарди статистикий материалҳо таваиф карда мешавад.

Тадқиқотҳо дар саршумори ҷорвои басанда гузаронида шудааст. Ўтимоднокии он бо натиҷаҳои тадқиқотҳои гузаронидашуда ва маълумоти рақамӣ бадастомада, инчунин бо коркарди омӯрӣ бо истифода аз ҷадвалӣ Студент таваиф карда мешавад.

Дар асоси ин натиҷаҳо, нишондиҳандаҳои зерин ҳисоб карда шуданд: тағйирёбии миёнаи арифметикӣ ($\pm Shx$), квадрати миёнаи реша ($\pm Shx$) ва сатҳи боўтимоднокӣ (P).

Ба шиносномаи ихтисос мувофиқ будани диссертатсия.

Рисола ба шиносномаи Комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти унвони илмӣ номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯи ихтисоси 4.2.2 -Зотпарварӣ, селекция ва генетикаи ҳайвоноти кишоварзӣ мувофиқ мебошад. Ҳамчунон ба бандҳои зерин мувофиқат мекунад:

б.1. Бехтар намудани зотҳо, намудҳо, навъҳо, зотҳо ва зотҳои мавҷудай ҳайвоноти кишоварзӣ;

б.2. Такмили усулҳои мавҷуда ва кор карда баромадани усулҳои нави селекция, баҳодиҳии зотпарварӣ ва сифатҳои маҳсулнокии ҳайвоноти кишоварзӣ;

б.3. Самаранокии усулҳои гуногуни селекция барои зотпарварӣ ва зотӣ;

б.5. Баҳодиҳии хусусиятҳои берунӣ-конститутсионӣ ва ботинии ҳайвонот ва истифодаи нишондиҳандаҳои онҳо дар кори зотпарварӣ.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар тадқиқот. Муаллиф сарчашмаҳои илмиро оид ба мавзӯ ҷустуҷӯ ва таҳлил намуда, мустақилона барномаи илмӣ тадқиқот ва усулҳои иҷроиши онро тартиб дода, гурӯҳҳои таҷрибавии чорворо ташкил намудааст, нишондиҳандаҳои зоотехникӣ, физиологӣ ва гематологӣ, нишондиҳандаҳои морфологӣ ва гистологӣ, хосиятҳои технологияи пӯст, самаранокии иқтисодии натиҷаҳои тадқиқот ва коркарди омории маълумотҳои бадастовардашударо омӯхтаст ва пешниҳод кардааст.

Натиҷаҳои бадастовардашуда дар нашрияҳо, рисола ва рефератҳо инъикос ёфтаанд.

Тасвӣ ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Мундариҷа ва маводҳои асосии тадқиқот дар:

- Ҷаласаҳои Шӯрои олимони Институти чорводорӣ ва чарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон (Душанбе, 2018-2022);

- Ҷаласаҳои солонаи АИКТ, конфронсҳои илмӣ амалии олимони ҷавони АИКТ (2018-2021);

- Конфронси байналмилалӣ илмӣ-амалии «Интегратсияи илм ва амалия ҳамчун шартӣ таъмини амнияти озуқаворӣ» (Луганск, Украина, 2019);

- Конфронси IV умумироссиягии илмию амалии «Нақши илми кишоварзӣ дар рушди хоҷагии ҷангал ва кишоварзии Шарқи Дур» (Уссурийск, 2020);

-Конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Дастрасӣ ба биохимияи муосир дар Тоҷикистон» (Душанбе, 2020);

-Конфронси VIII байналмилалии илмию амалии «Вазъият ва дурнамои зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ» (Донишгоҳи давлатии аграрии Бошқирдистон, Томск), Донишкадаи кишоварзии Новосибирск: IC NSAU «Хушаи тиллоӣ» - 2020);

-Конфронси байналмилалии илмӣ-амалӣ: «Саноати аграрӣ ва истеҳсолот: вазъият ва дурнамои рушд» (Душанбе, 2021);

-Конфронси IV байналмилалии илмӣ (Новосибирск, Федератсияи Русия, 2021);

-Конференсия оид ба паррандапарварӣ ва аспарварии Институти чорводорӣ ва ҷарогоҳҳои Донишкадаи технологияи кишоварзӣ (Душанбе, 2022);

-Конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ бо иштироки олимони хориҷӣ баҳшида ба 85-солагии зодрӯзи академик Сафаров Ҳ.М. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон «Мушкилоти мутобикшавии бадани инсон ва ҳайвонот ба таъсири омилҳои гуногуни муҳити зист» (Душанбе, 2022);

-Дар маводи маҷмӯавии конфронси «Комёбиҳои илмӣ дар технологияҳои инноватсионии чорводорӣ» (Душанбе, 2022);

-Дар ҷаласаи васеи шӯъбаи шӯъбаи селекция ва технологияи говҳои гӯштӣ, кӯтоспарварӣ ва аспарварии Институти чорводорӣ ва ҷарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон (Душанбе, 2023).

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Доир ба мӯҳтавои диссертатсия Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот 13 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 3 мақола дар маҷаллаҳои пешбари тақризии Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, як монография

дар ҳаҷми 304 саҳифа ва як тавсиянома дар ҳаҷми 24 саҳифа ба таърифи расидаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертация.

Диссертатсия аз 150 саҳифаи матни компютерӣ иборат аст. Он аз муқаддима, баррасии адабиёт, бобҳои мавод ва усулҳои тадқиқот, натиҷаҳои тадқиқот, муҳокимаи натиҷаҳои тадқиқот ва хулосаву тавсияҳо, рӯйхати адабиёт низ бо номгӯи 141 истиноди иборат аст дохил карда шудааст. Рисола инчунин 45 ҷадвал ва 12 расмро дар бар мегирад.

БОБИ 1. ШАРҲИ АДАБИЁТ

1.1. Дурагакунӣ яке аз усулҳои баланд бардоштани маҳсулнокии хайвоноти хоҷагии қишлоқ

Роҳи муҳими зиёд намудани захираҳои гӯштӣ, тараққӣ додани чорводорӣ маҳсули гӯштӣ ба шумор меравад. Рушди соҳа бояд аз рӯи ташкили подаҳои дурага дар асоси ба таври саноатӣ ҷуфткунӣ модаговҳои зоти ширдеҳ ва ширдеҳу гӯштӣ бо истеҳсолкунандагони зоти гӯштӣ суръат гирад Т.А Иргашев [54, с. 114-117], Ф.Г. Қайюмов [73, с. 23], [70, с. 11-13]. [71, с. 4-6], [72, с. 23], [74, с. 216].

Аз нуқтаи назари биологӣ таъсири ҷуфткунӣ ба гетерогенӣ маҷмӯи генҳои зотҳои ҷуфтшуда асос ёфта, насли бавучудода ва сифатҳои ирсии онҳо бой мегарданд. Чорвои дурага аз ҷиҳати хусусиятҳо гуногун буда, бо хусусиятҳои ба насл гузаштан камтар тобоваранд, аммо мубодилаи моддаҳои ғизоияшон баландтар буда, хӯрокро беҳтар ҳазм мекунанд В.Л. Владимиров. [20, с. 26] Дурагаҳои насли якум аз ҷиҳати вазни зинда, харочоти хӯрока, аз рӯи афзоиш ва маҳсули забҳ аз зоти аслии волидайн бартарӣ доранд. Аммо дараҷаи бартарӣ аз хусусиятҳои генетикии зотҳо ва шароити парвариши насли дурага вобаста аст

Мувофиқи мушоҳидаҳои як қатор муаллифони Е.Н. Доротюк [43, с. 18-20], Ф.Ф. Латипов [90, с. 20] агар дар натиҷаи хостагирии байнизотӣ азхудкунии санҷоатӣ дар натиҷаи селекцияи зотҳо ба амал омада бошад, пас маҳсулнокии чорвои гибриди зиёд мешавад. Насли бадастовардашуда ба шароити маҳал мутобиқ шуда, сифатҳои хуби технологӣ дорад, ки ин барои истеҳсоли саноатии гӯшти гов аҳамияти калон дорад.

Дар чорвои дурага равандҳои мубодилаи моддаҳо, мубодилаи газ ва ҳазмшавии хӯрока бо нишондоди баландтар ифода карда шуда, баъзе узвҳо ва бофтаҳо хуб фаъолият менамоянд, ки ин аз афзоиши қобилияти мутобиқшавии чорвои дурагашуда шаҳодат медиҳад ва ҳамчун зухуроти самараноки дурагакунӣ ҳисобида мешавад А.В. Вил [19, с. 18-20], [Н.Н. Усолкина [133, с. 33-41], Л.А. Гилмияров [33, с. 15-19], Х.Х. Тагиров [127,

с. 81-83,], Т.А. Иргашев [57, с. 41-46], Х.Х. Тагиров [125, с. 62-67], И.И. Мамаев [100, с. 2-4], В.И. Косилов [75, с. 112-115], Д.М. Ахмедов [5, с. 101-105], С.С. Жаймышева [50, с. 76-79].

Е.Г. Емельянов [48, с. 2-4] ва дигарон қайд кардаанд, ки чорвои дурага нисбат ба чорвои тозаот дар вақти таваллуд ҳаҷми калони тана дошта, дар ҳолати парвариши интенсивӣ ва фарбеҳкунӣ хусусияти баланди зудкалоншавӣ дошта, хӯрокаро самаранок истифода мебаранд.

Чӣ тавре Д.В. Карликов [68, с. 5-9], В.И. Косилов [79, с. 48] қайд кардаанд, чорвои дурага нисбат ба чорвои тозаот бо баланд шудани дараҷаи хӯрокдихӣ имконияти бештари ба амал баровардани потенциали генетикии маҳсулноки дошта, аз ҳисоби беҳтар истифода бурдани хӯрокаи замони ба фурӯш баровардан, аз ҷиҳати вазни зинда ва маҳсули забҳ аз ҳамсолони худ фарқ мекунанд Б.А. Бағрий [7, с. 115], В.И. Левахин [95, с. 3-9].

Ҷавонаҳои дурағашуда дар муқоиса бо ҳамсолони зоти модарӣ беҳтар афзоиш меёбанд.

Таdqикоти А.Г. Ирсултонов [66, с. 31-33] муайян менамояд, ки вазни зиндаи чорвои зоти дашти сурх дар синни 17-моҳагӣ ба 490,0 кг, дурағи шарола×дашти сурх ба 543,0 кг, лимузин×дашти сурх ба 540,0 кг, киан х дашти сурх ба 543,0 кг, санта гертруда×дашти сурх ба 531,6 килограмм мерасад. Вазни тана ва баромади гӯшт мутаносибан 261,7 килограмм ё 59,8%; 323,7 килограмм ё 62,1%; 311,7 килограмм ё 64,0%; 309,4 килограмм ё 63,1%; 293,4 килограмм ё 60,6%-ро ташкил дод.

Ҳангоми дурағакунии чорвои зоти сиёҳало бо зотҳои симменталӣ ва зоти қазоқии сарсафед суръати афзоиши ҷавонаҳо 7,6 ва 4,0%, вазни танай навзабҳшуда 21,0 ва 4,0 килограмм, маҳсулнокии гӯшти тоза ба андозаи 7,6% расида, мутаносибан 1,1 ва 1,5% зиёд мешавад Г.Л. Зайкин [52, с. 152-154], Ф.Ф. Латипов [90, с.20].

Дар давраи омӯзиши фаъолиятнокии нашъунамои ҷавонаҳои чорвои генотипҳои гуногун маълум гардид, ки дар синни 18 -моҳагӣ вазни зиндаи букҷаҳо ва ахтакардашудаи зоти қазоқии сарсафед ба 481,5

килограмм, симменталӣ ба 509,2 килограмм, шортгорн ба 542,7 килограмм, дурагаи симменталӣ × қазоқии сарсафед ба 539,0 кг ва шароле × қазоқӣ ба 562,4 кг расид С.Б. Логинов [100, с. 28-29], [101, с. 28-29].

Д.В. Карлико [68, с. 5-9], [69, с. 21-27] чунин мешуморанд, ки чорвои зоти сиёҳало бояд барои истифода бурдани онҳо дар дурагакунии саноатӣ дар чорводории тичоратӣ, нигоҳ дошта шаванд. Ин аз он сабаб аст, ки бо голштинҳо ҷуфтикунии чорвои сиёҳало барои аз худ намудани типи нав ва бо роҳи азхудкунии, беҳтар намудани он натиҷаҳои гуногун дод.

Натиҷаҳои тадқиқот бартарии нишондодҳоро дар маҳсулнокии гӯшти дурагаҳои голштинизатсияшуда нишон доданд. Дар давраи парвариш аз рӯзи таваллуд то 18-моҳагӣ ба дурагаҳои хуни гуногундошта бо хусусияти вазнафзункунии зиёди вазни зинда хос буда, дурагаҳои гуногунхун -голштин х швид ва голштин х сиёҳалои бо афзоиши миёнаи шабонарӯзии вазни зиндашон аз чорвои зоти асли 4,9-11,1 % зиёд буд. Муқарар карда шудааст, ки зиёд шудани вазни зиндаи чорвои дурага, аз ҳисоби зиёд шудани хуннокӣ нисбат ба чорвои зоти голштинӣ вобаста аст Т. Торчков [129, с. 8-9].

Ҳангоми таҳқиқи муқоисавии самаранокии ҷуфтикунии модаговҳои зоти даштии сурх ва сиёҳало бо зоти голштинӣ муайян карда шудааст, ки дар вазнафзункунии миёнаи шабонарӯзӣ вазни зиндаи букҷаҳаҳои зоти даштии сурх, дар давоми 18 моҳ - 807 грамм ва ҳамсолони дурагаи онҳо - 862 грамм ва ё 6,8 фоиз зиёд, дар зоти сиёҳало ва дурагаҳо, мутаносибан, 877 ва 934 граммро ташкил дод. Аз ҷиҳати вазни тана букҷаҳаҳои дурага аз ҳамсолони тозазоти модарӣ 20,5 ва 18,5 килограмм, аз рӯи маҳсулнокии гӯштӣ 1,5-1,0% зиёд буданд.

Муайян карда шудааст, ки зиёд шудани ширдеҳии ғуночинҳои зоиши якуми зоти голштинӣ нисбат ба зоти сиёҳало 582 кг (18,4%; $P<0,05$), ва нисбат ба зоти бестужеви 550 кг (18,0%; $P<0,01$) бартарӣ доштанд. Ба фикри ӯ, маҳсулнокии баланди шири дурагаҳо ба фаъолияти баланд ва устувори ширдеҳӣ вобаста буда, ҳамзамон онҳо аз ҷиҳати фаъолнокии

ширчӯшӣ низ аз ҳамсолони худ бартарӣ доштанд. Натиҷаҳои таҷрибаи ӯ бо нишондодҳои тадқиқотии сершумор мутобиқат менамоянд А.С. Алентаев [1, с. 429-432], Л.А. Танана [128, с. 204-207] ва дигарон.

Аз рӯи маълумо гардид, ки тамоюли камшавии вазни зиндаи дуратҳои А. Шилов [140, с. 25-26] муайянгаҳо ва нишондиҳандаҳои забҳи онҳо аз хуни зоти голштинӣ ва симменталӣ вобастаанд.

Ба ақидаи як қатор муаллифони хориҷӣ, ҷуфтикунонии чорвои сиёҳало бо буққаҳои голштинӣ боиси зиёд шудани шир, бехтар шудани сифати он, намуди берунӣ ва шакли сина мегардад.

Дар зотпарварии амалӣ ҷуфтикунонии буққаҳои голштинӣ бо модаговҳои сиёҳало нуқсонҳои норасоии ба зотҳои «тоза» хосро бартараф намуда, генофонди дигарро бой ва тағйир дода, имкониятҳои нав барои интихоб муҳаё менамояд. Ин тағйиротҳо дар асоси падидаи гетерозис асос ёфтаанд В.Н. Важенин [18, с. 694].

Г.В. Побоква [111, с. 162] дар шароити вилояти Волгогради ФР муайян намуд, ки чорвое, ки 75% хуни голштинӣ ва 25% зоти сиёҳалоро дорад, нисбат ба ҳамсолоне, ки 87,5% хуни голштинӣ ва 12,5% сиёҳало доранд, бартарӣ доштанд.

Чунин натиҷаҳо низ дар хоҷагии таълимии «Донское»-и Университети давлатии аграрии Дон-и вилояти Ростов ба даст омадааст. Фаъолияти пурқувват ва устувортарини ширдиҳӣ дар чорво, ки хуни 3/4 ва 7/8 голштинӣ дошта буд, таалуқ дорад. Модаговҳое, ки миқдори хунашон 1/4-ро ташкил медиҳад, ширдиҳии баланд, вале ноустувор дошта суръати онҳо зуд паст мешавад. Авҷи ширдӯшии модаговҳо 3 моҳро ташкил дода, баъд дараҷаи ширдӯшии онҳо хеле паст мегардад ва дар натиҷа маҳсклнокии шир назар ба ҳамсолонашон ба миқдори 8-9 фоиз кам шуда, 4147 килограммро ташкил медиҳад. Аз ҷиҳати ғоиданок будани мӯҳлати ширдиҳӣ ва коэффитсиенти якхелаи ширдӯшӣ чорвое, ки бештар хуни зоти голштинӣ доранд, афзалтар доништа шуданд.

Н. Г. Фенченко [135, с. 200] далел меоранд, ки дар байни дурагаҳо бо зиёд шудани миқдори хуни голштинӣ, мутаносибан маҳсулнокии ширӣ

зиёд мегардад. Шири говҳои хуннокиашон $7/8$ нисбат ба шири говҳои хуннокиашон $3/4$ ширдӯшӣ ба миқдори 8,6 фоиз зиёд шуд.

Дар тадқиқоти муайян карда шудааст, ки зиёд шудани таносуби хуннокии зоти сиёҳало то $3/8$ нисбат ба зоти голштинӣ ба дараҷаи маҳсулнокии шири дурагаҳо таъсири мусбат расонд. Нишондиҳандаҳои доимии ширдеҳӣ дар онҳо 93,6 фоизро ташкил дод, ки ин аз устувории ширдӯшӣ гувоҳӣ медиҳад. Аммо бо зиёд шудани хуннокии онҳо ($7/8$) миқдори шир нисбатан кам гардид.

3. Сабанчиев [118, с. 8-10] қайд кардаанд, ки дар натиҷаи зиёд шудани таносуби хуни голштинӣ, миқдори маҳсулнокии гӯшти букҷаҷаҳо зиёд мегардад. Вазни забҳи чорвои сиёҳалои хуннокиаш $1/2 \times$ голштин $1/2$ буда 237 кг-ро ташкил намуд, ё нисбат ба ҳамсолони зоти сиёҳало 5,2% зиёдтар буд, аммо нисбат ба ҳамсолони хуннокиашон $3/4$ голштини дошта 1,5% камтар буд.

Дар таҷрибаҳои маҳсулнокии баландтаринро духтарони говҳои зоти дорои миқдори 62,5 ва 100% дар хуни голштин нишон доданд. Маҳсулнокии шири онҳо мутаносибан 3793 ва 3727 килограмм, равшаннокии шир 3,76 ва 3,77 фоиз, миқдори равшани шир дар гурӯҳи I - 142,6; дар гурӯҳи II - 140,5 килограммро ташкил дод.

Духтарони говҳои хуни голштини дошта аз рӯзи таваллуд то 25 фоиз 3482 килограмм шир бо равшаннокии 3,68 фоиз, яъне аз рӯи равшани шир 128,1 килограммро ташкил медиҳад.

А.Г. Слюсар [120, с. 84-85] чорвои бо генотипи хуннокиаш $1/2$ доштаи зоти голштиниро аз ҷиҳати маҳсулнокии ширӣ беҳтарин ва дар интихоби минбаъда ояндадор мешуморад.

Дар тадқиқотҳои Л.Н. Никифорова [108, с. 408 - 411] маълум гардид, ки ҳангоми зиёд шудани хуннокии чорвои зоти голштинӣ аз $1/2$ то $3/4$ миқдори шири онҳо зиёд гардидааст.

Л.А. Танана [128, с. 204-207] нишон доданд, ки чорвои дорои таносуби хуннокиаш $5/8-3/4$ буда, бо маҳсулнокии зиёди ширӣ аз дигар чорво фарқ дошт.

Н.М. Костомахина [86, с. 25-28], чунин мешуморад, ки гарчанде дурагаҳои голштинизатсияшуда бо маҳсулнокии баланди ширӣ фарқ мекунанд, онҳо механизми мутобиқшавии суст доранд, ки ин боиси беморшавӣ гардида, самаранокии иқтисодии истифодаи чорворо паст мегардонад.

Сарфи назар аз натиҷаҳои зиёди мусбати голштиникунонӣ, ҳодисаҳои паст шудани дараҷаи наслдиҳӣ мушоҳида карда шуданд, ки ин бо зиёд шудани миқдори мушкилиҳо дар давраи ғӯсолагирӣ ва зиёд шудани ғавти ғӯсолаҳо шарҳ дода мешавад. Ин ҳолат хусусан ба он чорвои хонагӣ ва хоҷагиҳои чорводорӣ, ки барои чорӣ намудани зоти голштинӣ пеш мераванд, дахл дорад А.В. Бакай., [9, с. 4-5], И.И. Дунин [46, с. 2-5].

Дар вақтҳои охир диққати селекционеронро зотҳои калони азимчусса, хусусан зотҳои «Аубрак» ва «Сэллер», ки дараҷаи баланди маҳсулнокии ғӯштӣ доранд, ба худ ҷалб карданд.

Ҷуфтikuнонии модаговҳои зоти сиёҳало бо буққаҳои зоти «Сэллер», «Аубрак» ва Голштин имкон медиҳад, ки чорвое ба даст оварда ҳислатҳои мусбии хоҷагию биологии ба ин генотипҳо хос дошта бошанд И.В. Миронова [106, с. 45-49], Х.Х. Тагиров [126, с. 123-126].

Ҳамин тавр, ҷуфтikuнонии саноатӣ яке аз усулҳои асосии баланд бардоштани маҳсулнокии ғӯшти чорвои калони шохдор мебошад.

1.2. Истифодаи технологияи интенсивӣ дар зиёд намудани истеҳсоли ғӯшти гов

Масъалаҳои интенсификатсияи истеҳсоли ғӯшти гов дар асоси истифодаи технологияи интенсивии парвариши чорвои ҷавон дар асарҳои сершумори олимони Ф.Г. Каюмов [72, с. 23], Л.П. Прахов [114, с. 121-123],

Н.И. Нусов [109, с. 314], Н.И. Востриков [23, с. 216], И.П. Заднепрятский [51, с. 10-14], Д.Ц. Гармаев [32, с. 64-68], Г.П. Легошин [99, с.1- 76], В.И. Косилов [85, с. 204-206], Т.А. Иргашев [61, с. 231-233] ва диг.] васеъ инъикос ёфтаанд.

Хусусиятҳои асосии интенсификатсияи ҷорводорӣ индустрикунонии саноати дар асоси прогресси техникӣ, гузаштан ба усулҳои индустриалии истеҳсолот мебошанд.

Чуноне, ки таҷрибаҳо нишон медиҳанд, технологияи интенсивии парвариш ва фарбеҳ кардани ҷавонаҳо имконият медиҳад, ки самаранокии меҳнат 8-10 баробар, маҳсулнокии ҷорво 1,5-2,0 баробар, сарфи хӯрока ва захираҳои моддӣ ба ҳар воҳиди афзоиши вазни зинда 30-40% зиёд карда шавад А.Н. Проскуряков [115, с. 22], Г. И. Белков [16, с. 379-388], Г. И. Белков [15, с. 33-35], Д. М. Ахмедов ва дигарон [5, с. 101-105]. Бо истифодаи пурраи имкониятҳои маҳсулноки ва биологӣ ҷорво дар парвариш ва фарбеҳкунӣ тавассути механиконию комплексӣ ва автоматикунонию равандҳои меҳнат талаботи истеҳсолот ба комплексҳои маҳсусгардонидашуда таъмин карда мешавад Д.Л. Левантин [92, с. 202], А.А. Гайко [25, с. 208], М.И. Раҳимов ва дигарон [116, с. 127], Г.П. Легошин [96, с. 1-76], [97, с. 12-14], Д.Ц. Гармаев [30, с. 20-22].

Э.Ф. Лискун [99, с. 534], С. С. Гуткин [38, с. 79-81], А.П. Калашников [67, с. 49-54], Н.Г. Гамарник [26, с 48], О.Н. Могиленец [107, с. 20-23], С.С. Гуткин [39, с. 51-58], Н.Ф. Дзюба [42, с. 85-91], Д.А. Смирнов [121, с. 5-8] ва дигарон ибраз менамоянд, ки барои парвариши интенсивии ҷорвои ҷавон зотҳои сермахсул лозиманд, ки метавонанд миқдори зиёди хӯроки хушсифатро истеъмол кунанд ва онҳоро самаранок коркард намуда, ба маҳсулоти гӯштии на камтар аз сифати баланд табдил диҳанд. Барои ин, репродукторҳои мавҷударо муайян ва тасдиқ намуда, бо паҳн намудани ҷорвои ватанӣ ва типҳои нави зоти репродуктивӣ дар натиҷаи афзоишдиҳии ҷорвои дохилӣ ва хориҷӣ зотҳои гаронбаҳо ва ояндадори гӯштӣ ба вучуд овардан лозим аст. Дар баробари ин, ба истифодаи захираҳои ирсии ватанӣ низ афзалият додан лозим аст.

Ин пеш аз ҳама ба чорвои зоти қазоқии сарсафед дахл дорад, ки дар минтақаи зиёди замини қорам ва истехсоли ғалла тараққӣ кардааст. Аз сабаби кам шудани майдони чарогоҳҳо ва тараққӣ додани зироаткории обӣ нигоҳубин ва хӯрокдиҳии чорво тағйир меёбад. Аммо имконияти тамоми сол нигоҳ доштани ҳамаи чорво ё гурӯҳҳои алоҳидаи ҷинс ва синну сол дар чароғҳо истисно нест. Ин усули парвариши чорвои гӯштӣ дар хоҷагии ба номи Зимовниковский-и вилояти Ростови ҶР худро мусбат нишон додааст О. В. Гартованная [31, с. 185].

Амалия нишон медиҳад, ки самарайи баланди иқтисодии парвариш ва фарбеҳ кардани ҷавонаҳои чорвои қалони шохдор бо роҳи пайвастанӣ маҳсулнокии баланди чорво бо хароҷоти ҳисбатан кам дар натиҷаи истифода аз чарогоҳҳо ба даст оварда мешавад. Ин талабот, ба гуфтаи В. А. Солошенко [122, с. 59-63], А.В. Черкаева [138, с. 53], Ф.М. Сизова [119, с. 42], Н. Рябова [117, с. 9-10], Л.З. Мазуровский [103, с. 36-41] ба технологияи фарбеҳ кардани чорво дар саҳро бештар мувофиқ аст.

Соҳтмони майдонҳо масолеҳи гаронбаҳои бинокориро талаб намекунад ва барои соҳтани онҳо вақти кам сарф мешавад. Дар чарогоҳҳо ҷавонаҳои фарбеҳшаванда озодона гурӯҳ-гурӯҳ сайру гашт намуда, растаниҳои чарогоҳро истеъмол менамоянд. Ҷойҳои беҳтарин барои онҳо нишебҳои самти ҷанубӣ ва мавзёҳои нишебияшон на он қадар зиёд, ки қамтар аз 4-6° мебошанд ба шумор меравад. Ин мавзёҳо барои он беҳтарин ҳисобида мешавад, ки ҳангоми боришотҳо нишебҳо тез хушк мешаванд ва чорво озодона мечарад.

Дар маркази ҳар як оғил барои истироҳат кардани чорво аз пору, қоҳ ва пасмондаҳои хӯрок «теппаҳо» ташкил карда мешаванд, ки баландияшон на қамтар аз 1,5 м ва ба ҳисоби 3 м² ба 1 ҳайвон мебошад.

Ҳар як кӯраи мавзёро аз тарафи шамоқгард бо девори ҷӯбини баландиаш 3,0-3,5 м маҳкам мекунанд. Ҳаҷми майдонҳои сайругашт ба ҳар сар чорво 20-24 м² мебошад. Ҳудуди ҳавлии сайругашт тавассути

қисмҳои кунҷӣ ва гузаргоҳи пасӣ ба майдончаҳои якхела тақсим карда шудааст, ки сайргохҳои се девор дар ҳамшафатии онҳо ҷойгиранд.

Иқтидори умумии як майдон барои 100 сар чорвои калон пешбинӣ шудааст. Хӯронидан ва обдиҳӣ дар майдони сайру гашт ташкил карда шудааст. Дар атрофи майдони сайругашт охурҳо дар баландии 15-20 см аз сатҳи замин гузошта шуданд. Дар ҳамаи майдонҳо обнӯшакҳои автоматикии типпи АГК-4А бо гармкунии электрикӣ дар фасли зимистон гузошта шуданд.

Ҳамаи намуди хӯрок аз ба воситаи фиристандаҳои сайёри хӯрокии дурушт ва ширадор КТУ-10, хӯрокиҳои концентратӣ ба воситаи КУТ-3А тақсим карда мешаванд. Майдони хӯрокдиҳӣ 0,6 м ба як сар чорво муайян карда шудааст. Поруро ба воситаи булдозер аз ҳавлӣ бо ҷамъ шудани он мекашонанд ва майдони хати ивазнашаванда соле як маротиба дар тобистон тоза карда мешавад.

Дар вақти ба нақша гирифтани базаи хӯрока барои итмоми парвариш ва фарбеҳ намудани чорво, дар майдонҳои фарбеҳкунӣ аз рӯи шартҳои конкретӣ кор кардан лозим аст. Дар структураи ратсиони зимистонӣ бояд камаш 70-75 фоизи арзиши ғизоии силос, хӯроки дурушт ва ширадор, то 25 фоиз хӯроки концентратӣ дошта бошад.

Дар фасли тобистон хӯроки дурушт ва ширадорро бо массаи сабз, то 80-90 фоизи арзиши ғизоии ратсион иваз кардан лозим аст.

Баҳодиҳии шумораи зиёди букҷаҷаҳои зоти қалмиқиро аз рӯи маҳсулнокии ҳуди онҳо таҳлил намуда, шумораи зиёди чорвое ошкор шуд, ки баъди аз модар ҷудо кардан ба афзоиши миёнаи шабонарӯзии 1200-1500 грамм бо сарфи камтарини хароҷоти хӯрока ба 1 кг зиёдшавии вазн (5-6 воҳиди хӯрока) дар давраи баъди ширдиҳӣ мерасанд. Чунин чорво дар синни яксолагӣ то ба вазни 400 кг ва аз он зиёд расиданаш мумкин аст Э.Н. Доротюк [44, с. 144]. Хусусиятҳои инфиродии онҳоро дар натиҷаи истифодаи минбаъдаи бордоркунии сунъӣ ба гурӯҳҳо тақсим кардан мумкин аст.

Самти асосии селекцияи чорвои зоти қазоқии сарсафед, ин баланд бардоштани афзоиши интенсивӣ ва такмил додани маҳсулоти гӯштӣ ва нигоҳ доштани қобилияти баланди мутобиқшавии чорво Х.А. Амерханов [3, с. 3-7], В. К. Еременко [49, с. 385].

Х.А. Амерханов ва дигарон [2, с. 2-5] қайд мекунанд, ки дар айни замон интенсификатсияи чорводорӣ дар чорвои зоти қазоқии сарсафед талаботи нав гузоштааст, ки ин гузаронидани селекция аз рӯи афзоиши интенсивӣ, пардохти хӯрока мебошад. Чорво бояд ба шароити маҳал мувофиқ буда, аз хӯроки дурушт самаранок истифода бурда тавонад. Дар баробари ин, усули асосии парвариши чорвои гӯштӣ дар подаҳои зотӣ бояд аз рӯи авлодҳо бошад.

Л.П. Прахов [113, с. 17] қайд мекунад, ки дар асоси тадқиқотҳои сершумори ватанӣ ва хориҷӣ айни замон системаи ду марҳилаи баҳодихӣ ва интиҳоби букҷаҷаҳои истеҳсолкунандаи зотҳои гӯштӣ қабул карда шуданд.

1) аз рӯи маҳсулнокии худӣ дар давраи парвариш намудани чорво аз синни 8 то 15-моҳа (вазни зинда, вазнафзункунии миёнаи шабонарӯзӣ, арзиши хӯрок ва маҳсулоти гӯштӣ);

2) аз рӯи сифати насл бо назардошти ҳамагон нишондиҳандаҳо, инчунин аз рӯи сифати тана ва гӯшт.

Тибқи нишондоди В.Ю. Хайнатский [137, с. 49] давраи оптималии озмоишии чорвои зоти қазоқии сарсафед аз рӯи маҳсулнокии худӣ онҳо аз синни 8 то 15 моҳагӣ тавсия дода мешавад. Ин мӯҳлати пешниҳодшударо кӯтоҳ ё дароз кардан тавсия дода намешавад. Вазнафзункунии шабонарӯзии букҷаҷаҳо дар давраи санҷиш ба миқдори 1100 грамм буда ба потенциали генетикии чорвои зоти қазоқии сарсафед бештар мувофиқ аст. Инро дар таҷрибаи С. Полских [2013] ҳангоми парвариши букҷаҷаҳо бо наслҳои симменталии ояндадори олмонӣ, ки вазни зиндаи онҳо ҳангоми забҳ, дар синни 15 моҳагӣ - 233,0-259,7 кг-ро ташкил додааст, дидаан мумкин аст.

С.Д. Тюлебоева [131, с. 29-36], [132, с. 77-83] қайд менамояд, ки парвариши интенсивии буққаҷаҳои то синни 19-моҳагӣ, дар пойгоҳи озмоишӣ имкон медиҳад, ки вазни зиндаи буққаҷаҳои нимхуни “симментали х олмонӣ” бо хуннокиаш 1/2 647,0 кг-ро ташкил менамояд.

Дар пойгоҳи озмоишӣ аз синни 15 то 19 моҳа дароз кардани мӯҳлати парвариши чорво дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ бо афзудани фоида ва арзон шудани арзиши аслии 1 сентнер зиёдшавии вазн оварда расонда, ҳамзамон, фоидаи зиёдтарин ҳам дар синни 15 ва ҳам дар синни 19 моҳагӣ аз буққаҷаҳои нимхуни симменталӣ х олмонӣ бо хуннокии 1/2 ба даст оварда шудааст.

Дар айни замон дастовардҳои селексионии авлодҳои заводӣ (маҷмӯи авлодҳои якхелаи заводӣ), оилаҳои заводии типҳои дохилизотӣ (минтақавӣ), гурӯҳҳои зотӣ ва зотҳо ҳам дар чорводорӣ ширдеҳ ва ҳам дар чорводорӣ гӯштӣ ба таври умум эътироф карда мешаванд [А.С. Всяких [22, с. 432], Ф. И. Овсянников [108, с. 295-307], Л.Ц. Джимбеев [41, с. 33-41], Б.А. Бағрий [13, с. 115], Г.М. Туников [130, с. 212].

Дар баробари ин, парвариш аз рӯи авлодҳо унсури асосии элементҳои селекция, ташкили сифатнокӣ, фарқияти генеалогии сохтори пода дар парвариши тозазотӣ, ҳамчунин беҳқунандагони чуфтиқунонии раванди гузариши репродуктивӣ ба шумор меравад.

Гардиши оилаҳо ҳам дар пода ва ҳам дар миқёси тамоми зот имкон медиҳад, ки ҳодисаҳои фавқулодавии ҳешутаборӣ пешгирӣ карда шаванд. Имконияти беҳтар ва аз ҷиҳати фенотипӣ фарқ кардани гурӯҳҳои чорво, васеъ истифода бурдани генофонди чорвои зотҳои беҳтарини ҷаҳонӣ дар беҳтар намудани чорвои ҳонагӣ имконият медиҳад, ки раванди интегратсияи онҳо пурзӯр карда шавад.

Е.Г. Емельянов. [48, с. 2-4] қайд кардаанд, ки фарқияти зотро дар муайянқунии авлодҳо, ба дараҷаи баланд гузарондани кори зотпарварӣ, васеъ истифода бурдани буққаҳои наслдеҳи хуб, муайян мекунанд. Парвариш аз рӯи оилаҳо имкон медиҳад, ки сохтори зарурии генеалогии

зотро нигоҳ дошта, интихоби мақсаднок гузаронида шавад. Дар беҳтар намудани зотҳо буққаҳои наслии хушзот нақши калон мебозанд, ки дар асоси онҳо оилаҳо ва гурӯҳҳои ба он алоқаманд ба вучуд оянд.

Имконпазирии парвариши зотҳо ва типҳои алоҳидаро тавсиф мекунад, самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти аз онҳо гирифташуда мебошад. Дар чорводории гӯштӣ зудрасӣ омили муҳим аст ва бинобар ин сабаб кори зотпарварӣ бояд ба баланд бардоштани суръати афзоиши чорво нигаронида шавад, то ин ки дар мӯҳлати кӯтоҳи парвариш аз онҳо бештар гӯшти балансифат ба даст оварда шавад.

Дар ин ҳолат ҳамчун усули селекция, ки ба мақсад мувофиқ аст, баҳодиҳии буққаҳои наслдеҳ аз рӯи маҳсулнокии худ ва пеш аз ҳама аз рӯи зуд инкишоф ёфтани гӯсолаҳо баъд аз чудо намудан аз модарашон гузаронида шавад А.В. Черкаева [136, с. 53], Л.П. Прахов [110, с. 17], П.И. Зеленков [53, с. 19], Д. Ц. Гармаев [30, с. 20-22], Ф. Каюмов [74, с. 216].

Интихоби ҷавонаҳои таъмирӣ асосан аз рӯи фаъолиятнокии афзоиши қад гузаронида мешавад. Буққаҳои наслӣ аз ҳисоби модаговҳо ва буққаҳои беҳтарин интихоб карда мешаванд, ки интихоби ниҳой дар синни 15-моҳагӣ аз рӯи натиҷаи маҳсулнокии ҳуди онҳо ва пардохти сарфи хӯрок гузаронида мешавад. Пас аз он барои санчиши сифати насл ба озмоиш гузошта мешаванд З.В. Гомбоев [36, с. 18].

Чуноне, ки Е.Н. Доротюк [43, с. 18-20] дарҷ кардааст, ки яке аз самтҳои асосии кори зотпарварӣ, дар баробари усулҳои гуногуни парвариш, гузаронидани хостагирӣ, интихоб ва ташкили баҳодиҳии сифати зотии чорво мебошад.

Мутобиқи нишондоди Н.Г. Гамарник [27, с. 49] таҷрибаи интихоби буққаҳо бо қувваи афзоиш ва маҳсулнокии гӯштӣ дар як қатор кишварҳо нишон доданд, ки дар ин марҳилаи селекция самарайи беҳтарин дар он сурат ба даст меояд, ки агар шароити хӯронидан ва нигоҳубини чорво дар давраи санчиши стандартӣ, доимӣ бошад. Баҳодиҳии буққаҳо аз рӯи сифати насл дар бисёр кишварҳо дар асоси маълумот дар бораи

насли онҳо гузаронида мешавад. Дар як қатор мамлакатҳо натиҷаи баҳодиҳии нишондиҳандаҳои охирини қобилияти мутоқибаи духтарон ва осон таваллуд кардани насл, инчунин фарбеҳкунию забҳи насли онҳоро дар бар мегирад.

Дар тадқиқотҳои худ Д.Л. Левантин ва дигарон [93, с. 48-53] қайд намуданд, ки ҷорӣ намудани баҳодиҳии букҷаҷаҳо аз рӯи маҳсулнокии худӣ имкон медиҳад, ки раванди интиҳоб бо роҳи кам намудани фосилаҳо байни наслҳо, пурзӯр карда шавад.

Дар соҳаи чорводорӣ гӯштӣ вазни зинда нишондиҳандаи асосии селекция ба ҳисоб меравад. Мушкилии интиҳоб аз рӯи ин нишондиҳанда, ба ақидаи Б. А. Багрий [13, с.115], Е.Н. Доротюк [43, с.18-20] дар он аст, ки маҳсулнокии гӯшт як қатор хусусиятҳо ва хосиятҳоеро дар бар мегирад, ки он сифат ва миқдори онро тавсиф мекунанд.

Аз модаговҳои ҳаҷмашон калон гӯсолаҳои калонҳаҷм гирифта мешавад, ки онҳо беҳтар инкишоф ва бошиддат афзоиш меёбанд ва инчунин хӯроқро самаранок истифода мебаранд. Дар ин маврид бояд шиддатнокии наҷъунамои гӯсолаҳо то аз модар ҷудокунӣ (дар синни 6 - 8-моҳагӣ) ва баъд аз модар ҷудо намудан (то синни 15-моҳагӣ) ба назар гирифта шавад. Шиддати афзоиши то синни 6-8-моҳагӣ ба вазни таваллуд (коэффициенти коррелятсия 0,46) ва дар навбати худ бо вазни волидайн ба таври мусбат (0,3-0,4) алоқамандӣ дорад.

Чунонеки В.Ф. Красота [88, с. 321] қайд мекунанд, гуногунии бузурги генетикии чорво ва мураккаб будани сифатҳои меросии аз ҷиҳати иқтисодӣ ғоиданоки хоҷагидорӣ имкон намедиҳад, ки дақиқ пешгӯӣ карда шавад, дар кадом ҳолат ҳислатҳои ба чорво ва аҷдодони онҳо хос ба насл мерос мондаанд. Таҷрибаи ватанӣ ва хориҷӣ нишон медиҳад, ки дар он ҷое, ки мунтазам баҳодиҳии сифати насл гузаронида мешавад, беҳтар намудани зоти чорво тезтар ба амал меояд.

Дар Британияи Кабир букҷаҷаҳоро аз рӯи шиддатнокии афзоиш на танҳо дар пойгоҳҳои санҷишӣ, балки дар хоҷагиҳои зотпарварӣ низ

мегузаронанд. Дар асоси натиҷаҳои ноилшуда, ки аз рӯи ба насл додани вазни зиндаи чорво дар синни 400-рӯза (13 моҳагӣ) ба даст оварда шудаанд, дар Англия дар ин синну сол интиҳоби чорво аз рӯи вазн гузаронида мешавад.

Дар ИМА синни миёнаи гузоштани букқачаҳо барои санчиш 202-205 рӯзро (7 моҳа) ташкил медиҳад. Баҳодиҳии ниҳии чорво бо назардошти маълумоти санчиш аз рӯи сифати насл гузаронида мешавад.

Б. Багрий [8, с. 272] қайд мекунад, ки дар такмил додани сифати зотҳои наслдеҳ, букқачаҳои такмилдиҳанда аҳамияти калон доранд, ва сифатҳои гаронбаҳои ирсиро ба насли худ устуворона гузаронанд.

Байни интенсивӣ афзоиш ёфтани наслдиҳанда ва афзоиши интенсивии насли он алоқаи бевосита вучуд дорад ва ин нишонаи баланди ирсият мебошад. Коррелятсияи баланд ҳангоми афзоиши букқачаҳо аз вақти таваллуд то синни 18-моҳагӣ ва дар онҳо таносуби баланд муқаррар гардид.

Санчиши сифати насли букқачаҳо муҳимтарин ҷузъи кори селекцияю зотпарварӣ мебошад. Ин усул имкон медиҳад, ки арзиши зоти истеҳсолкунанда бозътимод муайян карда мешавад.

Дар соҳаи чорводорӣ гӯштӣ усулҳои баҳодиҳии букқачоро аз рӯи сифати наслшон, ки аз тарафи И.А. Черкаев [136, с. 53] коркард шудааст, муайян мекунад. Дар ин ҷода А. Басангов [12 с. 65-68], [10 с 29-37], [11 с 25-31], Л.П Прахов [113, с. 17], О.М. Шевелева [139, с. 43] корҳои бисёр иҷро кардаанд.

Асоси назариявии таҳияи системаи санчиши истеҳсолкунандаҳо дар тадқиқотҳои илмӣ олимони П.Н. Кулешов [89, с. 223], В.И. Федоров [134, с. 161-176], Л.К. Эрнст [141, с. 283] дарҷ гардидааст.

Маълум аст, ки интиҳоби пешакии истеҳсолкунанда бояд хислатҳои хуб ва муҳими волидайнро ба насли худ гузаронанд. Барои истеҳсолкунандагоне, ки ба озмоиш гузошта шудаанд, бояд бо нишондиҳандаҳои миёнаи сифат интиҳоб карда шаванд.

Таҷрибаҳои тараққӣ додани соҳаи чорводорӣ гӯштии ватанӣ ва хориҷӣ нишон медиҳад, ки барои беҳтар намудани сифатҳои чорвои зотҳои сермахсули гӯштӣ ва дурагаҳои онҳо бо роҳи самарабахш истифода бурдани букчаҳои такмилдиҳандаи аз рӯи сифати насли санҷидашуда, гузаронида шавад. Ҳамзамон, букчаҳои хушзоткунанда дар асоси баҳодиҳии ду марҳилагӣ муайян карда шаванд Ш.А. Макаев [104, с. 366], В.И. Косилов ва диг. [85, с. 204-206].

Ҳамин тавр, дар кори селекционӣ зотпарварӣ истифода бурдани беҳтарин генофонди ватанӣ ва ҷаҳонӣ барои ба вучуд овардани зотҳо, намудҳо, типҳо ва подаҳои дурагаи гӯштӣ, ки маҳсулнокии баланд доранд, шароити мусоид фароҳам меоварад.

1.3. Минтақаҳо, навъҳои асосӣ ва тавсифи мухтасари растаниҳои ҷарогоҳӣ

Дар ҳудуди ҷарогоҳҳои парвариши чорвои гӯштӣ тақсимшавии растаниҳо вобаста ба баландии ҷойгиршавиашон аз сатҳи баҳр чунин суръат мегиранд:

1. Минтақаи нимсаваннагии растаниҳои ксерофитӣ, ки дар ҳудуди аз 800 м то 1600-1800 м аз сатҳи баҳр баланд воқеъ гардидаанд.

2. Минтақаи дарахту буттаҳо, ки он дар навбати худ ба 2 зерминтақа ҷудо мешавад:

а) зерминтақаи растаниҳои нимсаваннагии қадпаст дар баландии 1200 м то 1800-2100 м аз сатҳи баҳрдоман паҳн намудаанд.

б) зерминтақаи омехтаи сиёҳчангал бо растаниҳои нимсаваннагии хушадори қадбаланд (хардумка бо гандумак) ва растаниҳои марғзорӣ, ки дар баландии 1500-1700 то 2200 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудаанд.

Набототи ба маҳаллаҳои аҳолинишин наздик ҷойгир шуда, то баландии 1500 м аз сатҳи баҳр ҷойгиршуда ҳолати хуб надошта, руй ба таназзул оварда истодаанд, хусусан дарахтбуттаи бодому pista бо сабабҳои гуногун қариб, ки ба нестӣ расидааст ва ҳоло кормандони соҳа

кӯшиш менамоянд, ки дар таллу теппахо ва дар қисмати дастраси кӯҳӣ ин сарвати бебаҳои табиатро аз сари нав барқарор намоянд.

Дар минтақаи якум растании шибоғ (*Artemisia*) дар ҳама ҷой бартарӣ дорад. Шибоғро дар баъзе мавридҳо растании бисёрсолаи шӯрагиҳо-изен-*Salsola prostrata* ҳамроҳӣ менамояд. Аз эфемерҳо бошанд, растаниҳои хуби истеъмолии чорво, ба монанди чорӯбаки пиёзакдор - *Poa bulbosa*, чашмак - *Alyssum desertorum* ва бомасҳо - *Bromis oxyodon*, *Bromis scoparius* бо шибоғ (*Artemisia*) нашъунамо меёбанд. Дар нишебҳои самти шимолӣ алафзори табиӣ чарогоҳиро дар ҷамоаи шибоғзор растаниҳои бориқбарги хӯшадори биёбонӣ ташкил медиҳанд, ки ба инҳо типчок, ковил ва чорӯбаки биёбонӣ дохил мешаванд. Дарахтзору буттазор дар ин минтақаи биёбон хеле ҳам кам ба назар расида, дар сохтори ландшафт он қадар аҳамияти калон доранд. Аз рӯйи мавсими истифодабарӣ алафзорҳои хӯрданибоби табиӣ минтақаи якум ба чарогоҳҳои баҳорӣ аз ҳисоби растаниҳои эфемерӣ мансуб ёфта, вақти чаронидани онҳо дар фасли баҳор буда, аз ҳисоби растании шибоғ бошад, ин чарогоҳҳо тирамоҳ низ зери истифода қарор мегиранд. Дар дигар фаслҳои сол шибоғ бо сабаби дар таркибаш вуҷуд доштани рағани эфемерӣ ҳамчун растании ғайриистеъмолии чорво ҳисобида шуда, чорво онро истеъмол наменамояд. Аз ин лиҳоз, чарогоҳҳо ба мавсими истифодабарии баҳорию тирамоҳӣ ҷудо карда мешаванд. Қайд кардан зарур аст, ки минтақаи якум асосан барои зироаткорӣ истифода мешавад.

Хусусияти минтақаи дуюм дар он зоҳир мегардад, ки дар он ҷо паҳншавӣ ва нашъунамои васеи ҷамоаи дарахту буттаҳо баръало ҳис карда мешавад. Аз растаниҳои оилаи чатргулон камол - *Ferula*, юған-*Prangos pabularia*) ва торон - *Poligonum* бо дарахтону буттаҳо ҳамзистӣ доранд. Дар нишебҳои самти шимолӣ марғзор аз растаниҳои хоси ин минтақа хардумак - *Dactylis glomerata*, чилликул - *Senecia* иборат аст. Арзишмандтарин растании чарогоҳиро хардумак ташкил намуда, ҳар ҷое,

ки он бо дигар растаниҳои чарогоҳӣ омехта ва бештар паҳн шуда бошад, ҳамон қадар ҳосилнокии чарогоҳҳо баландтар мешаванд.

Дар минтақаи растаниҳои марғзорӣ гурӯҳи растаниҳои чарогоҳии истеъмолии чорво бартарият доранд. Аз ҳама бештар дар гурӯҳи растаниҳои чарогоҳӣ хардумак (*Dactylis glomerata*) эътибори зиёд дорад. Хардумак беҳтарин растании истеъмолии чорво ба ҳисоб рафта, чорво онро ҳама вақт бисёр хуб истеъмол мекунад.

Ҷамоаи набототи марғзорӣ аз гурӯҳи растаниҳои ғешагӣ асосан дар ҷойҳои намнокиашон баланд ва дар назди чашмаю кӯлҳо аҳён-аҳён вомехӯрад. Аз растаниҳои хӯшадорони даштӣ бештар растании ҷавдорак ва ҷорӯбаки даштӣ нашъунамо доранд. Ҳудуди чарогоҳҳои ин минтақа ба чарогоҳҳои мавсими истифодабариашон тобистона шомил мегардад, чунки давомнокии нашъунамои растаниҳои чарогоҳӣ ҳамагӣ 3 моҳро ташкил медиҳад. Ҳосилнокии миёнаи набототи ин мавзеъ то 12 с/га массаи истеъмолии чорворо ташкил медиҳад.

Минтақаи растаниҳои биёбонӣ қисми аз ҳама болои мавзеъ, яъне баландкӯхро ишғол намудааст, ки аз растаниҳои қадпасти рӯйихокӣ иборат мебошад. Баландии миёнаи алафзор аз 3 то 5 см мерасад. Аз ҷиҳати иқтисодӣ ин минтақа ба чарогоҳҳои мавсимии тобистона бо мӯҳлати истифодабарии он ду моҳ буда, барои ҷаронидани чорво на он қадар аҳамияти калон дорад. Ҳосили миёнаи алафҳои ҷамоаи баландкӯх аз 1,5 то 5 сентнерро ташкил медиҳад. Растаниҳои ҳоси асосии минтақаро: нештаргиёҳ - *Oxytropis*, шохалаф - *Cerastium*, гулхушкак-*Gnaphalium*, ҷавдорак - *Festuca* ташкил медиҳанд.

Дар соҳили дарёи Тоир-Су ва қисмати ҳамвортари минтақа, заминҳои шудгоршавандаи лалмӣ ва обӣ, инчунин боғҳои бисёрсола ҷойгир шудаанд.

Дар чарогоҳҳо бошад, растаниҳои гармидусти эфемерӣ доман паҳн намуданд, ки намояндаи асосии онҳо гандумачриқ (*Aegilops triuncialis*), чаваки бухорӣ (*Poa bulbosa*), ғешаи туркестонӣ (*Carex pachystylis*), чави

ёбой (*Hordeum murinum*) ва ғайра мансуб меёбанд. Дар байни растаниҳои асосӣ, ки дар боло қайд карда шуд, боз растаниҳои чарогоҳӣ аз оилаи лӯбиёғиҳо низ бисёр вомехӯранд ба монанди: нахӯдакҳо, юнучкаи ёбой, шутурхор, дар қойҳои сернам себарга ва ғайра Т.А. Иргашев [65, с. 32-35].

Дар заминҳои лалмӣ бо зироатҳои маданӣ, растаниҳои гулихайрӣ, катран, андузро низ вохӯрдан мумкин аст. Дарахтони pista дар давраи шуравӣ дар ин доманакӯҳҳо бисёртар дида мешуд ва майдонҳои калонро ташкил медоданд. Солҳои охир бо ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ барқароршавӣ ва шинонидани ниҳолҳои pista дар таллу теппаҳои ноҳияҳои Тоҷикистони Ҷанубӣ бо суръати баланд рафта истодааст. Бо сабаби гармшавии ҳарорат дар миқёси ҷаҳон ва хусусан дар Тоҷикистон сол то сол парвариши pistaю бодом ба мушкилиҳои зиёд рӯ ба рӯ шуда истодааст. Барои парвариши pista намии кофӣ лозим меояд ва барои сабзонидани он ақаллан 2 ё 3 сол бояд дарахтон бо об таъмин карда шаванд. Илова бар ин, аз сабаби сол то сол афзоиши саршумори чорво ба назар расида истодааст, ҳар як қитъаи барои pistaзор ҷудокардашуда бояд дар муддати то панҷ сол симтӯрбандӣ карда шавад.

Растаниҳои дарахту буттагӣ ба ду намуд ҷудо мешаванд.

1. Растаниҳои сиёҳчангал
2. Растаниҳои минтақаи гармсел (шибляк).

Дарахтони арча, ки намояндаи асосии онҳо (*Jeniperus zeravschanica*) ба шумор меравад, дар қисматҳои миёнакӯҳ ва баландкӯҳи минтақа қойгир шудаанд. Ҳокҳои ин минтақа ба ҳокҳои ҷигарриранги карбонатӣ шомиланд. Дар аксари мавридҳо зичии байни онҳо 0,2-0,4 м-ро ташкил медиҳад.

Аз растаниҳои алафӣ растаниҳои нимсаваннагӣ бартарият доранд. Мавқеи асосиро дар ҷамоаи арчазор растаниҳои юған ишғол намудааст. Юғанро растаниҳои нимсаваннагии дигар, ба монанди бомас, кокутӣ, қойқаҳак ва бунафшагул ҳамроҳӣ менамоянд. Онҳо дар байни дарахтон

нашъунамо карда, майдонҳои васеъро ишғол менамоянд ва дар нимаи аввали сол пӯшиши баланд ва зичро ташкил медиҳанд.

Юған хусусан ҳангоми нашъунамо ва гулкунӣ дар аввали тобистон аз дигар растаниҳои чарогоҳӣ фарқ мекунад. Дар вақти тару тоза буданаш чорво онро бо иштиҳо хӯрда наметавонад, чунки дар таркибаш моддаи захрнок дорад.

Дар сурати набудани дигар растаниҳои истеъмоли чорво камкам аз баргҳои наврасидаашро истифода менамояд. Юған дар охириҳои моҳи май ва аввалиҳои моҳи июн пурра мерасад ва зард шуда, ба беҳтарин растании истеъмолии чорво мубаддал мегардад. Яке аз аломатҳои безараршавии юған каме зардшавии баргҳояш мебошад ва дар ҳамин давра аз тарафи сокинон даравида шуда, дар фазои озод хушконида ва дар қаҳдонҳо барои зимистонгузаронии чорво истифода мешавад.

1. Растаниҳои сиёҳчангал. Дар мавзеи таҳқиқотӣ ба растаниҳои сиёҳчангал ҷамоаи фарқ, иргай, тлох, ақоқӣ ва настаран дохил мешаванд. Хусусияти хоси ин намуди дарахтону буттаҳо дар он зоҳир мегардад, ки онҳо дар нишебии самти шимолӣ нашъунамо намуда ва растаниҳои чарогоҳии намидӯст бо онҳо ҳамеша ҳамсизтӣ доранд. Сиёҳчангал ҳамчун чарогоҳ кам истифода мешавад.

Лекин дар бисёр ҳолатҳо аз тарафи сокинони деҳаҳои ба мавзеъ наздик чорво чаронида мешаванд ё ин ки ҳамчун роҳи чорвогузар истифода қарор мегирад.

2. Растаниҳои минтақаи гармсел (шибляк) Қариб дар ҳама ҷо растаниҳои гармсел аз ҷамоаи дарахтон ва буттаҳои нимхушкидӯст, ки дар минтақаи миёнакӯҳ ҷойгир шудаанд, нашъунамо доранд. Аз ҳама бештар дар ноҳияи Темурмалик майдонҳои бодомзор бо намояндагии (*Amugdalus bucharica*), ки дар заминҳои сангу шағалдори нишебии зиёддошта рушду нумӯш дорад ва барои чаронидани чорво мувофиқ ё дастрас нест, волеҳӯрад. Ба ғайр аз бодом, дар ин минтақаи миёнакӯҳӣ дарахтони pistaю калофакро низ вохӯрдан мумкин аст. Бо дарахтону

буттаҳои минтақаи гармсел намояндаи растаниҳои нимсаваннагии баландпояи чарогоҳиро низ вохӯрдан мумкин, ки пӯшиши онҳо он қадар зиёд нест, яъне онҳо ба таври пароканда доман паҳн намудаанд.

3. Биёбон. Масоҳати растаниҳои биёбонӣ он қадар зиёд нест. Дар мавзеи таҳқиқотӣ намояндаи асосии растаниҳои биёбониро ҷамоаи шибӯғ ташкил намуда, он бо pista, бодому бузгандум нашъунамо дорад.

Онҳо асосан дар қисмати нишебии самти шимолию шарқӣ бештар вохӯранд. Пӯшиши сатҳии хок аз ҳисоби шибӯғзор 80-90 %- ро ташкил менамояд ва сохтори растаниҳо аз ду қабат иборат аст. Дар қабати якум шибӯғ ва дар баъзе ҳолатҳо чорӯбаки пиёзакдор, дар қабати дуюм бошад, растаниҳои давраи нашъунамояшон хеле ҳам кӯтоҳ, яъне эфемерҳо чойгир шудаанд. Дарахтону буттаҳо ба таври пароканда дар қабатҳо низ пайдо мешаванд.

Растаниҳои эфемерӣ дар моҳи май пурра пухта мерасанд ва шибӯғ бошад, дар аввалҳои моҳи июл ба нашъунамои худ ҳусни итмом мебахшад.

Қайд намудан лозим ҳаст, ки ҷамоаи набототи шибӯғзор дар чарогоҳҳои зимистона беҳтарин хӯрокаи истеъмолии чорво ба ҳисоб меравад ва дар ҳамин асос онҳоро ба чарогоҳҳои мавсими истифодабарияшон зимистона, шомил гардонидаанд.

4. Нимсаванна. Растаниҳои нимсаваннагӣ дар минтақаи таҳқиқотӣ аз чунин намудҳо иборатанд: растаниҳои қадпасти нимсаваннагӣ, растаниҳои нимсаваннагии хӯшадори қадбаланд ва растаниҳои нимсаваннагии баландпоя.

БОБИ II. МАВОД ВА МЕТОДИКАИ ТАДҚИҚОТ

2.1. Шароити табиӣ ва иқлимии минтақаи гузаронидани корҳои тадқиқотӣ

Хочагии кооперативии «Кангурт» ва хочагии деҳқонии «Файзобод»-и ноҳияи Темурмалики минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доманакӯҳи баландиаш 1200-2000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Унсурҳои асосии релеф теппаҳою нишебҳо мебошанд.

Ин минтақаҳо дорои шароити иқлими континенталӣ мебошад. Зимистонаш нисбатан хунук, якбора ба баҳори сербориш гузашта, тобистонаш хушк мебошад. Зимистон дар баландии то 2000 м - 130-140 рӯз ва дар баландии то 3000 м - 200 рӯз давом мекунад.

Мувофиқи маълумотҳои пойгоҳи обухавошиносии Кангурт ҳарорати миёнаи солона дар мавзеи ҷойгиршавии хочагии кооперативии «Кангурт» ва хочагии деҳқонии «Файзобод»-и ноҳияи Темурмалик $7,2^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил медиҳад. Сутуни минимуми симоб дар моҳи январ то $-24,9^{\circ}\text{C}$ паст шуда ва гармии ҳаво дар моҳи август ба $+40,0^{\circ}\text{C}$ мерасад.

Дар тобистон, чун қоида, бориш намешавад. Дар минтақаҳои баландкӯҳ дар як шабонарӯз хеле тағйир ёфтани ҳарорат ва намӣ мушоҳида карда мешавад.

Самти асосии истехсолии хочагиҳо ин соҳаи чорводорӣ гӯшту шир ва гӯсфандпарварӣ мебошад. Дар фасли тобистон чорво ғизои худро пурра аз чарогоҳҳои кӯҳӣ таъмин менамояд. Дар давраи зимистон одатан хӯроки чорво намерасад.

Ҳудуди хочагӣ, ки аз он чорвои зоти қазоқии сарсафед иборат аст, дар ин минтақаи хушк мӯътадил, парвариш карда мешавад.

Дар ин ҷо ҷамӯаи растаниҳои шибоғу типчокзор ва ҷамӯаи растаниҳои даштӣ, алафи шивок (*Stipa*) доман паҳн намудаанд. Ҳудуди минтақа бо чашмаю об кам таъмин мебошанд.

Дар мавзеъ хокҳои каштанӣ ва сиёҳчатоби каштанӣ бартарӣ доранд ва дар наздикии соҳили дарёҳо бошад хокҳои марғзории сиёҳ ва қитъҳои хурди он хокҳои дашти шӯр, ки барои нигоҳдории чорво бевосита истифода бурда мешаванд.

Иқлими ноҳия дар зер таъсири маҷмӯи шароити физикию географӣ ба вучуд меояд. Дар фасли хуноки сол шароити обу ҳаво бо таъсири зиддисиклонии Сибир муайян карда мешавад, гарчанде дар ин давра рахнашавии сиклонҳои баҳри Сиёҳ, ки боришҳои зиёд ва обшавӣ меоранд, истисно нест.

Мувофиқи маълумотҳои чандинсола ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво $+8,2^{\circ}\text{C}$, хунуктарин моҳ -6°C ва гармтарин моҳ $+24^{\circ}\text{C}$ мебошад. Боришот дар давоми сол каму беш баробар, дар давраи гармӣ (моҳҳои 4-9) 239 мм, дар фасли сармо (моҳҳои 10-3) 203 мм тақсим мешавад. Дар зимистон бодҳои шарқӣ ва дар тобистон шамолҳои ғарбӣ бартарӣ доранд.

Зимистон охири моҳи ноябр меояд. Дар охири моҳи декабр қабати устувори барф муқаррар мешавад, вале дар баъзе зимистонҳо ин тавр намешавад. Давомнокии давраи фарогирии барф дар фасли зимистони ноҳия 75 рӯзро ташкил медиҳад. Ҳарорати минималии мутлақи ҳаво -26°C -ро ташкил медиҳад. Тобистон $+30-35^{\circ}\text{C}$ муқаррар шуда, ҳадди ақали мутлақ $+41^{\circ}\text{C}$, моҳи гармтарин июл бо ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво $+24^{\circ}\text{C}$ мебошад. Давраи хунуктарин 176-185 рӯз аст.

Дар даҳрӯзаи дуҷуми моҳи октябр сармоҳои аввалин омада, дар моҳи ноябр борон тез-тез меборад. Гузариши ҳарорати ҳаво то $+5^{\circ}\text{C}$ дар аввали моҳи ноябр ва гузариши устувори ҳарорати ҳаво то 0°C -ро ташкил дода, дар охири моҳи ноябр ба амал меояд. Падидаҳои хусусан хатарноки дар ҳудуди он мушоҳидашуда тӯфонҳои ҷангу ғубор, хушксолии атмосфера ва шамолҳои хушк, сармоҳои барвақт, тӯфонҳои шадид ва бориши барф бо шамоли 15 м/с мебошанд.

Шароити ҳоку иқлим ба ҳосилнокии чарогоҳҳои табиӣ ва зироатҳои хоҷагии қишлоқ ба андозаи муайян таъсири калон мерасонад.

Ҳосили миёнаи чарогоҳҳои табиӣ 20-21 сентнерӣ сабзавот, алафҳои яксола 10,0 сентнер, хӯроки сабз 46,8 сентнер; алафҳои бисёрсола барои беда 8,2 сентнер ва алафзорҳои табиӣ то 2,4 сентнер аз як га массаи хушки истеъмолии чорво, ҳосил медиҳанд.

Ҳамин тариқ, шароити табиӣ ва иқлимӣ ватанӣ парвариши чорвои казокии сарсафед ва минтақаи нави интродуксияи он тафовути калон доранд, ки асосан бо рельеф ва баландии он аз сатҳи баҳр фарқ мекунанд.

2.2. Мавод ва усулҳои тадқиқот

Қисми таҷрибавии корҳои илмӣ тадқиқотӣ солҳои 2018-2021 дар хоҷагии кооперативии «Кангурт» ва хоҷагии деҳқонии «Файзобод»-и ноҳияи Темурмалик, вилояти Хатлон гузаронида шуд.

Барои таҷриба 45 сар ҷавонаҳо ҳангоми таваллуд интихоб карда шуда, ба 3 гурӯҳ 15 сарӣ ҷудо карда шуданд.

Гурӯҳи I - букҷаҳҳои зоти маҳалии зебу (ЧМ);

Гурӯҳи II - букҷаҳҳои дурагаи типии тоҷикии чорвои гӯшти бо чорвои маҳалӣ (ЧКТТ х ЧМ) ;

Гурӯҳи III - букҷаҳҳои чорвои гӯштии типии тоҷикӣ (ЧКТТ).

Гурӯҳҳои букҷаҳҳо аз рӯзи таваллуд то синни 7-8-моҳагӣ аз рӯи системаи «гов-гӯсола» нигоҳ дошта шуда, баъди аз модар ҷудо намудани онҳо то синни 15-моҳагӣ дар чарогоҳҳои наздиқӯҳӣ ва аз синни 15 то 20-моҳагӣ, (яъне 153 рӯз) дар чарогоҳҳои тобистонаи кӯҳистон бе хӯроки концентратӣ нигоҳ дошта шуданд.

Вазни зиндаи букҷаҳҳо дар вақти таваллуд ва дар 8, 12, 15, 18 ва 20-моҳагӣ пагоҳирӯзи пеш аз хӯрокдиҳӣ ба таври индивидуалӣ муайян карда шудааст. Афзоиши мутлақи вазни зинда бо истифода аз формулаи Броди ҳисоб карда шуд ва афзоиш ва рушд бо истифода аз ҳафт ченаки асосии бадан баҳо дода шуд: баланди дар устухони чорбанд, баланди дар крестец, дарозии қачии бадан, давраи қафаси сина, паҳноии қафаси сина, чуқурии қафаси сина, даври устухони пой гирифта шуданд.

Дар асоси нишондодҳои ченакҳои гирифташуда чунин индексҳои бадани букҷаҷаҳо: тулони, дарозпой, чорбанди сандуқи сина, сарисинагӣ, пуррагӣ, ҷусатанагӣ, серустухонӣ, паҳноӣ, гӯштноки ва ҳаматарафа (Кравченко [1967] ҳисоб карда шуд.

Барои омӯхтани нишондиҳандаҳои морфологӣ ва биохимиявӣ, ҳолати физиологии организм, миқдори эритроцитҳо ва лейкоцитҳо бо роҳи ҳисоб кардан дар камераи Горяев, гемоглобин аз рӯи Салий, сафедаи умумии зардоби хун бо усули рефрактометри муайян карда шуд.

Барои назорат кардани ҳолати физиологии бадан давра ба давра суръати набз, набзи дил ва ҳарорати баданро вобаста ба синну соли букҷаҷаҳо чен карда шудааст.

Механизмҳои рафтори букҷаҷаҳо, вобаста ба мавсим, бо истифода аз усули ҳисобкунии инфиродӣ ва гурӯҳӣ, ки аз ҷониби Институти умумироссиягии тадқиқоти чорводорӣ [1975] ва усули Герасимович [1970] аз ҳар як гурӯҳ дар се букҷаҷаҳои 18-моҳа дар тӯли ду рӯз муайян карда шуданд.


Нишондиҳандаҳои забҳ ва сифати гӯшт дар синни 20-моҳагӣ аз ҳар гурӯҳ се сар букҷаҷаҳо бо методикаи Институти тадқиқоти илмӣ чорводорӣ умумироссиягӣ тариқи забҳ муайян карда шудааст [1978].

Ҳангоми забҳ вазни зиндаи пеш аз забҳ, вазни нимтана, равшан, баромади гӯшти тоза ва хунукшуда муайян карда шуд. Илова бар ин, сифати гӯшти чорво бо ҷенкунӣ ва ҳисоб кардани коэффитсиенти гӯштӣ (K1) ва коэффитсиенти сергӯштӣ (K2) баҳо дода шуд.

Сифати морфологии гӯшт бо роҳи устухонкунӣ ва тарошидан, инчунин таркиб ва навъи морфологи (аз руи классификацияи ҳасиб) аз тарафи чапи тана баҳо дода шуд. Дар вақти аз устухонҳо ҷудо кардани гӯшт массаи гӯшт, устухонҳо, бофтаи мушакҳо ва равшанҳо ва поя муайян карда шуд. Арзиши ғизоии гӯшт дар асоси натиҷаҳои таҳлили кимиёвӣ намунаи миёнаи гӯшти қима мувофиқи дастури таҳиякардаи Институти умумироссиягии ғизои чорво ва арзиши энергетикӣ гӯшт бо формулаи:

$X = C - (F + G) \times 4,1 - F \times 9,3 \times 4,188$ муайян карда шудааст.

Параметрҳои морфологӣ ва гистологӣ, инчунин хосиятҳои технологияи пӯст бо усулҳои гистологӣ ва технологӣ муайян карда шуданд. Тадқиқотҳо аз рӯи чунин нақшаи умумӣ гузаронида шуданд (расми 1).



Расми 1 - Нақшаи умумӣ гузаронидани тадқиқот

Самаранокии иқтисодии буқчаҳои генотипҳои гуногун бо назардошти хароҷоти нигоҳубини онҳо ва маҳсулнокии гӯштии он бо назардошти нархи фурӯши 1 сентнер гӯшт муайян карда шудааст.

Маълумотҳои рақамӣ бо усули омории бо истифода аз Microsoft Excel коркард карда шудааст.

БОБИ 3. НАТИҶАҲОИ ТАДҚИҚОТ

3.1. Ба вуҷуд овардани типи нави чорвои сергӯшти тоҷикӣ

Саршумори асосии зоти қазоқии сарсафед соли 1958 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шуда буд, Ин зот барои баланд бардоштани маҳсулноки ва сифати гӯшти чорвои маҳаллӣ пешбинӣ карда шуда буд.

Барои ба вуҷуд овардани типи нави чорвои гӯшти тоҷикӣ мувофиқи фармони № 360 Вазорати хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон (собиқ РСС Тоҷикистон) аз 11 декабри соли 1981 ва қарори № 555 Комитети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба илм ва техника аз 30 сентябри соли 1985 муассисаҳои илмӣ ва зоипарварӣ, инчунин хоҷагиҳои базавӣ муайян карда шуда буд.

23 апрели соли 1986 бо мақсади дар хоҷагиҳои вилояти Кулоб ба вуҷуд овардани типи тоҷикии чорвои гӯштӣ қарори қарори Ҳукумати давлат рақами 217 қабул карда шуд. Бо қарори мазкур як қатор хоҷагиҳои ноҳияҳои кӯҳсори вилоят, аз ҷумла хоҷагиҳои зотпарварии ба номи С. Сафарови ноҳияи Балҷувон, «Кангурт», «Файзобод»-и ноҳияи Темурмалик ба хоҷагиҳои таҷрибавӣ дохил карда шуданд.

Дар фармон пешбинӣ карда шуда буд, ки нақшаҳои истеҳсол ва ба давлат фурӯхтани маҳсулоти чорво бо назардошти истифода бурдани чорвои модинаи аз хориҷи кишвар овардашуда бо технологияи парвариши чорвои гӯштӣ, бо бино, хӯроки чорво, инчунин бо мутахассисони варзида таъмин карда шаванд.

Барномаи нав ва методикаи ба вуҷуд овардани чорвои гӯштии типи тоҷикӣ дар Институти илмӣ-тадқиқотии чорводорӣ тартиб дода шуда, онро Шурои илмӣ институт 18 март соли 1985 тасдиқ гардидааст. Дар барнома барои ҳар як хоҷагии алоҳида бо назардошти шароит ва имкониятҳои онҳо чорабиниҳо тартиб дода шудааст.

Аз ҷиҳати методӣ барнома шаш марҳилаи ба вуҷуд овардани чорвои гӯштии типи тоҷикиро пешбинӣ мекунад.

Марҳилаи I - (1958-1975 с.) - интихоби хоҷагиҳо, таҳлили онҳо, таҳияи нақшаи ҳолати ташкилию иқтисодӣ ва аз нав коркард намудани сохтори пода. Оғози корҳои илмӣ–тадқиқотӣ оид ба омӯхтани хусусиятҳои мутобиқшавии чорвои воридшуда дар хоҷагиҳои чорводорӣ минтақаҳои назди кӯҳӣ ва кӯҳӣ, тартиб додани нақшаи ташкилию хоҷагидорӣ, хариди зотҳои чорвои сергӯшт, таҷҳизоти маркази бордоркунии сунъӣ, таҳияи барномаҳо ва таҳияи усулҳои корҳои зотпарварӣ.

Марҳилаи II - (1975-1981) - ташкил намудани бордоркунии модаговҳо бо истифода аз усули бордоркунии сунъӣ ва табиӣ, арзёбии муқоисавӣ ва муайян кардани генотипҳои беҳтарин аз вариантҳои гуногуни ҷуфтikuнонии модаговҳои воридшуда.

Марҳилаи III - (1982-2000) - муайян намудани «типи дилҳо»-и чорвои офаридашаванда, тасдиқ намудани генотипҳо бо роҳи парвариши «дохилӣ», ташкили ғуруҳи авлодҳо, ба андозаи зарурӣ зиёд намудани саршумор, тайёр кардани маводҳо барои санҷиш, ташкили баҳогузориҳои ғӯсолаҳо аз рӯи маҳсулнокии худ ва модаговҳо аз рӯи насл, афзоиш ёфтани саршумори ҳайвоноти типӣ мувофиқ, ташкил намудани ғуруҳҳо ва шачараҳои таркиби зотӣ типӣ навбунёд.

Марҳилаи IV - (2001-2010) - озмоиши ғуруҳи селекционӣ типӣ тоҷикӣ чорвои калони ғӯштӣ аз рӯи маҳсулнокиӣ, якхела ва устувории тип, афзоиши худ ба худ, додани ариза барои ба истифода қабул намудани дастоварди селекционӣ, зиёд намудани саршумори чорво.

Марҳилаи V - (2011 - 2016) - озмоиши ғуруҳи авлодҳои дохилизотӣ чорвои калони сергӯшти тоҷикӣ, ташкили озмоиши типӣ нав аз рӯи маҳсулнокиӣ, якрангӣ ва устувории ирсӣ, зиёд кардани саршумори чорво, пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои дастоварди селекционӣ.

Марҳилаи VI - (2016-2022) - муттаҳидсозии ирсӣ дохилизотӣ чорвои калони сергӯшти тоҷикӣ, муайян намудани дараҷаи меросии наслҳо бо роҳи парвариши “дохилӣ”, зиёд намудани саршумори чорво ба талаботи тип мувофиқ. Интиҳоб ва тасдиқ намудани корхонаҳои фаръӣ, зиёд

кардани саршумори чорвои калони гӯштии типи тоҷикӣ барои ноҳияҳои Балҷувон ва Темурмалики минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон. Ташкили баҳодиҳии буққачаҳо аз рӯи маҳсулнокии худ ва сифати зот. Натиҷаи ниҳоии корҳои илмӣ тадқиқотӣ (2022), омода намудани маводҳо барои пешниҳоди типи чорвои калони шохдори сергӯшти тоҷикӣ мебошад.

Дар маҷмӯъ марҳилаи VI-и барнома ба итмом расида, типи нави чорвои калони сергӯшти тоҷикӣ бо қарори коллегияи Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 1/2 аз 15 апрели соли 2023 тасдиқ карда шудааст.

Расми 3. 2. - Типи чорвои калони шохдори сергӯшти тоҷикӣ



3.2. Баҳодиҳии (апробатсияи) типи чорвои калони сергӯшти тоҷикӣ

Корҳои илмӣ тадқиқотӣ оид ба вучуд овардани типи чорвои калони сергӯшти тоҷикӣ аз тарафи олимон ва мутахассисони соҳаи чорводорӣ ба анҷом расонида шуд, ки он дар натиҷаи корҳои илмӣ бисёрсола бо истифода аз чорвои сергӯшти қазоқии сарсафед ба анҷом расонида шуд, ки ба шароити минтақаҳои кӯҳӣ назди кӯҳӣ мутобиқ мебошанд.

Ба I январи соли 1990 дар хоҷагиҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ саршумори чорвои зоти қазоқии

сарсафед зиёда аз 30 ҳазор сарро ташкил меод. Дар айни замон дар ҷумхури зоти мазкур барои дурагакунии саноатӣ, гибридкунӣ ва афзоишдиҳии асизотӣ истифода ва парвариш карда мешаванд.

Ин зот аз ҷиҳати маҳсулнокии гӯшти ва самаранокии сарфи хӯрок, бо зотҳои гӯшти ҷаҳонӣ рақобатпазир буда, ба стандартҳои байналмилалӣ мувофиқат менамоянд.

Дар ҷароғҳои минтақаи парвариш худро нағз ҳис менамояд ва ба сардиҳои зимистон ва гармиҳои тобистон мутобиқ мебошанд.

Бунёди типӣ ҷорӣ калони шохдори сергӯшти тоҷикӣ дар асоси ҷорҳои селекционӣ зоти қазоқӣ сарсафед дар хоҷаҳои зотпарварӣ ба номи С. Сафаров-и ноҳияи Балҷувон, хоҷаҳои «Кангурт» ва «Файзобод»-и н. Темурмалик ва дар хоҷаҳои инфиродӣ ноҳияҳои Балҷувон ва Ховалинг гузаронида шудааст.

Интиҳоби ҷорӣ аввалин тавассути ворид кардани говҳо ва ҷуғҳои наслдиҳандаи зоти гӯшти қазоқӣ сарсафед аз хоҷаҳои Ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Россия ба хоҷагии “Қаҳрамон” (ҳоло хоҷагии зотпарварӣ С.Сафаров) ворид гардидааст.

Ба ин хоҷаги дар маҷмӯъ 377 сар гову ғуноҷинҳои 16-17 моҳа бо вазни миёнаи як сар 305,6 кг ворид карда шуд.

Тавсифоти типӣ офаридашуда аз рӯи таркиби зот вобаста ба хоҷаҳои дар ҷадвали 3.1. оварда шудааст.

Аз рӯи нишондодҳои ҷадвали 3.1. маълум мегардад, ки дар хоҷагии кооперативии “Кангурт”, хоҷагии деҳқонии “Файзобод” ва аҳолии ноҳияи Темурмалик саршумори ҷорӣ сергӯшти типӣ тоҷикӣ ҳамагӣ - 277 сар, ва он ҷумла, модаговҳо - 160 сар, ғуноҷинҳо – 50 сар, ҷуғҳои насл – 7 сар, ҷуғҳои таъмирӣ 60 сарро ташкил намуданд.

Чадвали 3. 1. -Саршумори асосии чорвои навбунёди типи сергӯшти тоҷикӣ ба 1 январи с. 2025

Хоҷагиҳо/ноҳияҳо	Миқдори чорвои сергӯшти тоҷикӣ, сар				
	модаговҳо	ғуноҷинҳо	букқаҳои насли	букқа-чаҳои таъмири	Ҷамъ
Кангурт, Файзобод ва аҳолии н. Темурмалик	160	50	7	60	277
С. Сафаров, фермерӣ ва аҳолии н. Балҷувон	240	100	4	20	364
Хоҷагиҳои н. Ховалинг	300	110	4	40	454
Ҷамъ:	700	260	15	120	1095

Дар хоҷагии ба номи С.Сафарови ноҳияи Балҷувон ва аҳолии ҳамагӣ - 364 сар, модаговҳо – 240 сар, ғуноҷинҳо –100, букқаҳои насли – 4 сар ва букқаҳои таъмири - 20 сар ва дар хоҷагиҳои ноҳияҳои Ховалинг, мутаносибан, 300 сар, 110 сар, 4 сар, 40 сар, ҷамъ 1040 сар парвариш меёбанд.

Дар чадвалҳои 3.2., 3.3. ва 3.4. тавсифи говҳои беҳтарини сароилаҳо аз рӯи насли онҳо вобаста ба хоҷагиҳо оварда шудааст.

Чадвали 3.2. - Тавсифи говҳои сароилаҳо дар хоҷагии кооперативии Кангурти н. Балҷувон

Р/Т	Тахаллус ва рақами сароилаҳо	Зоиш	Вазни зинда, кг	Баҳодиҳии намуди зоҳирӣ, бал
1	Санам 2842	6	560	87
2	Раванд 3214	3	550	90
3	Қурб 0181	4	585	85
4	Олифа 6214	3	560	85
5	Маъмула 1167	6	570	88
6	Олуча 6123	2	500	88
7	Вахшон 8764	3	520	90
8	Лаъл 0133	3	590	89
9	Оранҷ 1206	6	590	90



Расми 3.3. -Гурухи селексионии қатори гомологии Кангурт, ноҳияи Темурмалик

Чадвали 3.3. - Тавсифи говҳои сароилаҳо дар хоҷагии Файзободи н. Темурмалик

№ п/п	Тахаллус ва рақами сароилаҳо	Зоиш	Вазни зинда, кг	Баҳодиҳии намуди зоҳирӣ, бал
1	Хушрӯча 2002	5	570	88
2	Зуля 1585	4	560	91
3	Бурранг 0181	3	590	87
4	Љулида 6014	4	565	86
5	Љаконак 6268	5	575	90
6	Алча 8889	3	550	
7	Ғуночин 1024	4	540	92
8	Аловак 08091	5	610	91
9	Дуранг 186	5	620	92



Расми 3. 4. – Гурӯҳи селекционии қатори гомологии ХДФ Файзобод, ноҳияи Темурмалик

Ҷадвали 3.4. - Таъсифи говҳои сароилаҳо дар хоҷагии С. Сафарови н. Балҷувон

№ п/п	Тахаллус ва рақами сароилаҳо	Зоиш	Вазни зинда, кг	Баҳодихии намуди зоҳирӣ, бал
1	Зардина 2222	4	565	89
2	Гулоба 0224	5	555	92
3	Алояк 198	3	590	87
4	Мавҷак 3562	5	580	86
5	Қашқа 6548	4	590	89
6	Сиёҳча 8999	3	530	90
7	Лапашанг 895	4	545	91
8	Қашанг 8127	4	600	88
9	Бучул 9376	5	605	89



Расми 3. 5. - Гурӯҳи селексионии қатори гомологии хочагии С. Сафаров-и ноҳияи Балчувон

Дар натиҷаи муайян намудани қобилияти мутобиқшавӣ, тартиб додани нақшаи интихоб ва хостагирӣ барои ташкили подаҳои селексионӣ ва такрористехсолкунӣ, сохти конститутсионӣ, намуди беруна (экстерер), муайян кардани таркиби хун, гӯшт, пӯст, нафаскашӣ, таркиби химиявии гӯшт ва равған, таркиби морфологии тану тӯш, таркиби ғизои гӯштӣ, тана ва бадан дар подаҳои хочагиҳои зотпарварӣ ва деҳқонӣ парвариши саршумори чорвои гӯштӣ бо ду роҳ гузаронида шуд. Дар айни замон дар дохили чорвои сергӯшти типии тоҷикӣ 2 гурӯҳи гомологӣ ва 4 оила дар хочагиҳои ноҳияҳои Темурмалик ва Балчувони вилояти Хатлон ташкил карда шуд.

3.3. Шароити ҳӯронидан ва парвариши буккачаҳо

Дар давраи таҷрибаҳои илмӣ-истехсолӣ барои гурӯҳҳои таҷрибавии чорво ҳӯрокдихӣ ва нигоҳубин дар шароити яхела фароҳам оварда шуд. Чавонаҳоро, ки аз аввали баҳор ба гурӯҳҳои таҷрибавию назоратӣ ҷудо карда шуда буданд, дар давраи ширдихӣ ҳамроҳи модаронашон дар

чарогоҳҳои тобистона, бе хӯроки иловагӣ нигоҳ дошта шудаанд. Мавсими чарогоҳ аз нимаи аввали моҳи апрел то нимаи моҳи июн сар шуд, ки дар он ҷо чорво дар байни дарахту буттаҳо мечарид.

Чавонахоро бо алафи чарогоҳ хӯронидан, ба афзоиши онҳо нисбат ба хӯронидани алафҳои даравидашуда дар охурҳо, бартариҳои зиёди дорад. Дар зери таъсири ҳаракати доимӣ ва хӯрдани алафи тар, дар зери таъсири нури офтоб, ҳавои тағйирёбанда ва тоза тамоми бофтаҳо, узвҳо ва системаҳои чавонаҳо таъсир мекунанд, чуқурии нафаскашӣ ва дараҷаи шамолхӯрии шуш кам мешавад.

Дар баробари ин, истеъмоли оксиген ва ихроҷи гази карбон зиёд мешавад, инкишофи қафаси сина беҳтар, гардиши хун зиёд, фаъолияти асаб беҳтар, функсияҳои муҳофизатии пӯст, функсияҳои гармидиҳии буқчаҳо, устухонҳо ва мушакҳои скелетӣ беҳтар шуда, сар, гардан, дасту пой, пушт, камар ва тамоми узвҳои бадани буқчаҳо инкишоф меёбанд. Дар вақти чаронидан дар чарогоҳ чавонаҳо ҳамеша хӯроки тару тоза мегиранд. Афзоиши чорво беҳтар шуда, саломатии онҳо мустаҳкам мегардад.

Алаф пас аз чаронидани чорво назар ба даравидан хеле тезтар месабзад. Хӯронидани чавонаҳо бо алафҳои даравкардашуда хеле кам амалӣ мешавад. Барои буқчаҳои чавон дар тобистон хӯроки минералӣ дар шакли "намак-лесид" истифода мешавад.

Муайян кардани ратсиони хӯрокдихӣ, инчунин намуди хӯрокдихӣ низ ба маҳсулнокии гӯшти чорвои калони шохдор ва сифати гӯшти гов, таъсири муайян мерасонанд. Муқаррар карда шудааст, ки ба чавонаҳо аз рӯи ратсион додани хӯроки концентратасиаш зиёд аст, суръати дар организм ҷамъ шудани равғанро метезонад ва ба онҳо хӯрокиҳои сершираю сабз додан имкон медиҳад, ки дар танайи онҳо кам равған ҷамъ шавад.

Мувофиқи тадқиқоти олимони Амрико ҳангоми фарбеҳ кардани буқчаҳо ва кастратҳо бо гранулаҳои юнучқа вазнафзункунии шабонарӯзии онҳо ба ҳисоби миёна 1,050 кг, маҳсулнокии забҳ баъд аз

фарбеҳкунӣ 55,4%, майдони «чашми мушакҳо» 71,1 см² ва ғафсии рағғани зери пӯст 9,4 миллиметрро ташкил дод. Дар вақти фарбеҳ кардани букқачаҳо бо дони ҷуворимаққа дар як шабонарӯз - 1270 кг вазнафзункунӣ, маҳсулнокии забҳ баъд аз фарбеҳкунӣ - 59,9%, майдони «чашми мушакҳо» - 68,5 см² ва ғафсии рағғани зери пӯст - 17 мм зиёд шуд. Ҳамин тавр, бо ратсиони ғалладонагӣ фарбеҳшавии букқачаҳо ба серравғани гӯшт оварда мерасонад.

Дар Тоҷикистон соҳаи чорводорӣ махсуси гӯштӣ асосан дар ноҳияҳои доманакӯҳ ва кӯҳсор, ки майдонҳои васеи заминҳои табиӣ хӯроки чорво доранд, мутамарказ шудааст. Аммо аз сабаби шароити табиӣ иқлимӣ хӯроки концентратӣ дар баланси хӯроки чорвои хоҷагҳои ин минтақаҳо ҷои ночизро ишғол мекунад. Бинобар ин, дар хоҷагҳои ҷумҳурӣ истифода бурдани ратсионҳои хӯрокдихиро барои фарбеҳкунонии чорво, ки дар онҳо концентратҳо бартарӣ доранд, васеъ ҷорӣ кардан мумкин нест.

Азбаски чарогоҳҳои минтақаҳои поёни сӯхта, дар нишебҳои болоӣ алаф мерӯяд, чорво ба минтақаи растаниҳои субалпӣ ва алпӣ ронда шуда, дар он ҷо то охири моҳи сентябр мечаронанд. Бо фарорасии сармо чорво мунтазам ба минтақаҳои алафзори поёни ронда мешаванд. Обёрӣ дар чарогоҳ аз сарчашмаҳои табиӣ обҳои барфу борон истифода бурда мешавад.

Дар ин давра ба чорво хӯроки концентратӣ дода нашуда, онҳо фақат бо намак таъмин карда мешуданд. Баъд аз он букқачаҳои таҷрибавӣ дар давраи охирини фарбеҳкунӣ нигоҳ дошта шуданд. Чорво озодона, гурӯҳ-гурӯҳ дар майдони сайругашт дар зери айвонҳо нигоҳ дошта шуда, ба охурҳои хӯрокдихӣ ва обнӯшӣ дастрасӣ доштанд.

Ба ҳар як чорво ба ҳисоби миёна 2 м² масоҳат рост меояд, ки дар онҳо охурҳои хӯрокдихӣ бетонӣ ва охурҳои обнӯшӣ ҷиҳозонида шудаанд.

Дар таҷриба ба букқачаҳои гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ шароити яхелаи нигоҳубинӣ ва ғизодихӣ фароҳам оварда шудааст. Ҷавонаҳое, ки

дар мавсими барвакти баҳорӣ таваллул шудаанд, бо модаговҳо дар оғилхона нигоҳ дошта, ба майдони сайругашт озодона дастрасӣ доштанд.

Букҷаҷаҳо аз моҳи апрел то октябр дар чарогоҳҳои баландкӯх, ки дар баландии 2,5-3,5 ҳазор метр аз сатҳи баҳр воқеъ гардидаанд, шаш моҳ бо модаговҳо нигоҳ дошта шуданд. Онҳо дар ин ҷо ба ғайр аз шири модар аз хӯроки растаниҳои чарогоҳӣ ва онҳо обнӯширо аз обёрии рӯдҳо ва дарёҳои кӯҳӣ истифода мебурданд.

Баъди аз модар ҷудо кардан, чорвои таҷрибавӣ дар баландии 1600 - 2000 метр аз сатҳи баҳр дар шароити парвариши чарогоҳии тирамоҳию зимистона дар майдони сайру гашт озодона парвариш карда шуданд. Муқаррар карда шуд, ки дар структураи хӯроки истеъмолшаванда дар байни гурӯҳҳо тафовути ҷиддие вучуд надорад, гарчанде қайд карда шуд, ки ба ҳисоби мутлақ ва миёна букҷаҷаҳои чорвои калони шохдори сергӯшти типии тоҷикӣ нисбат ба ҳамсолони чорвои дурага ва маҳаллӣ бештар хӯрока истеъмол мекунанд. Инро бо он маънидод мекунанд, ки вазни зиндаи букҷаҷаҳои гурӯҳи таҷрибавӣ дар ҳамаи давраҳои синну соли хеле зиёд буд.

3.4. Хусусиятҳои афзоиш ва рушди букҷаҷаҳо дар давраи парвариш

Чунонки маълум аст, дар Тоҷикистон дар байни чорвои махсусгардонидашудаи сергӯшт зотҳои мутобиқшудаи қалмиқӣ, абердин-ангусӣ, қазокии сарсафед ва дурагаҳои онҳо мавқеи калон доранд. Онҳо дар минтақаи кӯҳистонии Кӯлоби вилояти Хатлон васеъ паҳн шудаанд, ки ин аз тобоварӣ, танайи мустаҳкам, маҳсулнокии хуби гӯштӣ ва ба иқлими континенталӣ мутобиқ шудани онҳоро гувоҳӣ медиҳад [Қаракулов А.Б., 1993; Заднепрянский, 2015; Косилов В.И., 2017; Иргашев Т.А., Косилов В.И., 2017; Жаймышева С.С., 2018].

Дар структураи подаи хочагиҳои вилоят ҳиссаи калонро чорвои маҳаллӣ ишғол мекунанд, ки ба онҳо сифатҳои нисбатан пасти маҳсулноқӣ хосанд. Бояд гуфт, ки дар ин минтақаи таҳқиқшаванда оид ба мақсад мувофиқ будани парвариши зоти алоҳидаи чорвои гӯштӣ асосҳои

илмӣ мавҷуд нестанд, масъалаҳои чӣ дар фасли зимистон ва чӣ дар фасли тобистон нигоҳ доштани чорво ба қадри кифоя ҳал карда нашуда, бисёре аз элементҳои интенсификатсияи истеҳсоли гӯшти гов кор карда баромада нашудаанд. Ҳамзамон, ҳалли ин масъалаҳо имкон медиҳад, ки сатҳи истеҳсоли гӯшти гов баланд гардад, сарфи меҳнат ва маблағ ба воҳиди маҳсулот вобаста карда шавад [Қаракулов А.Б., 2013; Иргашев Т.А., 2017].

Дар шароити минтақаи кӯҳистони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани сифатҳои маҳсулнокии чорвои маҳаллӣ доир ба омӯзиши самаранокии ду зоти чорвои маҳаллӣ бо истеҳсолкунандагони сергӯшти типии тоҷикии нав тадқиқотҳо гузаронида шуданд [Косилов В.И., 1999; Раҷабов Ф.М., 2008; Ҳусейнов М., 2010].

Ҳамин тариқ, тадқиқоти ҳамаҷониба оид ба баҳодиҳии муқоисавии сифатҳои маҳсулокии ва хусусиятҳои хоҷагидорию биологӣ саршумори популятсияи чорвои калони сергӯшти типии тоҷикӣ, чорвои зебумонанди маҳаллӣ ва ҷавонаҳои дурағаи онҳо барои гӯшт парваришшаванда дар шароити ҷароғоҳҳои табиӣ ва иқлимии доманакӯҳ ва кӯҳистон мувофиқ буда, барои баланд бардоштани иқтисодиёти хоҷагиҳо аҳамияти калони илмӣ истеҳсолӣ доранд.

Дар ҷароғоҳ тамоми сол нигоҳ доштан ва хӯрок додани ҷавонаҳои гурӯҳҳои таҷрибавӣ суръати баланди инкишофи индивидуалии онҳоро таъмин намуд. Дар баробари ин, аз сабаби хусусиятҳои генетикӣ суръат ва афзоиши чорвои маҳаллӣ нисбатан паст буд. Афзоиши вазни зиндаи онҳо нисбатан суст афзуда, аз рӯи ин нишондиҳанда назар ба ҷавонаҳои гурӯҳҳои таҷрибавии муқоисашаванда хеле паст буд.

Хусусияти системаи нигоҳубини чорвои гӯштӣ дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳҳои Тоҷикистон дар самаранок истифода бурдани ҷароғоҳҳо вобаста мебошад. Бинобар ин, дар тадқиқотҳои мо динамикаи вазни зиндаи бӯқчаҳои гурӯҳҳои муқоисашаванда аз рӯи синну сол оварда шудааст, ки бо қобилияти ҷаронидани онҳо тавсиф мешавад.

3.4.1. Вазни зиндаи букқачаҳои генотипҳои гуногун

Гурӯҳҳои букқачаҳои муқоисашаванда ҳам аз ҷарогоҳҳои тобистона ва ҳам аз ҷарогоҳҳои зимистона самаранок истифода мебаранд. Айни замон тағйирёбии генотипӣ дар нишондиҳандаҳои ҷарогоҳӣ ба таври равшан намоён аст. Дар ҷорводории гӯштӣ нишондиҳандаи асосие, ки арзиши хоҷагидории ҷорворо тавсиф мекунад, вазни зиндаи он мебошад. Динамикаи вазни зиндаи букқачаҳои генотипҳои омӯхташуда дар ҷадвали 3.6. оварда шудаанд.

Ҷадвали 3. 6. - Тағйирёбии вазни зиндаи букқачаҳо вобаста ба синну сол, кг ($\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$)

Синну сол, моҳ	Гурӯҳ		
	I	II	III
Навзод	20,3±0,88	25,0±0,69	25,3±0,74
8	137,5±4,47	161,0±2,48	168,2±2,36
12	223,0±8,52	225,4±3,08	239,5±4,85
15	258,4±8,20	257,0±2,98	271,2±4,77
18	308,3±9,34	321,5±3,84	334,6±5,23
20	338,0±10,7	382,2±4,19	389,4±7,84

Аз нишондодҳои ҷадвали 3.6. бармеояд, ки вазни зиндаи букқачаҳои гурӯҳи I ҳангоми таваллуд 20,3 кг, гурӯҳи II - 25,0 кг ва гурӯҳи III - 25,3 кг буд. Дар букқачаҳои гурӯҳи III бартарӣ дар динамикаи вазни зинда нисбат ба давраҳои синну соли минбаъда мушоҳида шуд. Масалан, дар синни 20 моҳагӣ, ин бартарӣ дар байни гурӯҳҳо, мутаносибан, 15,21% ва 1,88% буд.

Афзоиши вазни мутлақ ва шабонарӯзии гурӯҳҳои тадқиқшудаи букқачаҳо дар ҷадвали 3.7 оварда шудааст.

Аз маълумоти дар ҷадвали 3.7 овардашуда ба хулосае омадан мумкин аст, ки афзоиши мутлақ ва нисбии вазни зиндаи генотипҳои муқоисашудаи букқачаҳо хусусиятҳои хоси ҳудро доранд. Махсусан, зиёдшавии вазни зинда аз давраи аз таваллуд то 8-моҳа дар букқачаҳои гурӯҳи III - 142,9 кг ё назар ба ҳамсолони гурӯҳи I - 21,92 фоиз ва гурӯҳи II - 5,07 фоиз зиёд буд.

Чадвали 3.7. - Афзоиши вазни зиндаи букқачаҳо

Давраи синну сол, моҳҳо	Гурӯҳ					
	I		II		III	
	Мутлак, кг	Вазнафзункуишабонарӯзи, г	Мутлак, кг	Вазнафзункуишабонарӯзи, г	Мутлак, кг	Вазнафзункуишабонарӯзи, г
0-8	117,2	488	136,0	567	142,9	595
8-12	85,5	713	64,4	370	71,3	594
12-15	35,4	393	51,6	573	31,7	352
15-18	49,9	554	64,5	717	63,4	704
18-20	44,0	489	66,5	672	54,8	609
0-12	202,7	552	180,4	496	214,2	595
0-15	238,1	530	232,0	510	245,9	546
0-18	287,9	534	296,5	544	309,3	573
0-20	317,7	504	357,0	567	364,1	578

Аз 8 то 12-моҳа вазни мутлақи букқачаҳои гурӯҳи I низ 85, 5 кг-ро ташкил дод, ки ин нисбат ба букқачаҳои гурӯҳи II ва III - мутаносибан 32,76 ва 19,92 % зиёд мебошад. Дар давраи аз 12 то 15-моҳа низ чунин ҳолат мушоҳида шудааст. Ин шаҳодат медиҳад, ки букқачаҳои зебумонанди маҳаллӣ хӯрокиҳои чарогоҳро нисбатан самаранок истифода мебаранд.

Ба ҳамаи гуруҳҳои букқачаҳои генотипҳои омӯхташуда давраи синну сол аз 0 то 18 моҳ бо афзоиши баланди шабонарӯзии вазн хос бошад ҳам, дар ин давра букқачаҳои гурӯҳи III бартарият нишон доданд. Ин афзалиятро букқачаҳои гурӯҳҳои II ва III аз 0 то 20 моҳ нигоҳ доштанд ($P < 0,01$).

Нисбатан баланди вазни зиндаи букқачаҳои генотипашон гуногун дар давраи парвариш ба шароити мусоиди обу ҳавои мавсими тобистону тирамоҳи сол, инчунин сифати баланди алафҳои чарогоҳ вобаста мебошад.

Ҳамин тариқ, вазни мутлак ва миёнаи шабонарӯзии букқачаҳои типи тоҷикӣ нисбат ба ҳамсолони дурага ва маҳаллии худ бартарӣ доштанд. Ин хусусиятҳои ҳуби мутобиқшавии букқачаҳои типи тоҷикиро

нишон медиҳад, ки ба онҳо имкон медиҳад суръати афзоиши хоси худро нигоҳ доранд ва ин қобилиятро ба наслҳои худ диҳад.

Суръати афзоиши нисбии вазни зиндаи буқчаҳо дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ дар сини аз таввалуд то 20 моҳа фарқияти мушаххасро нишон дод (ҷадвали 3.8).

Ҷадвали 3.8. - Суръати афзоиши вазни зиндаи буқчаҳо, %


Давраҳои синну сол, моҳ	Гурӯҳ		
	I	II	III
0-8	148,5	147,70	146,24
8-12	47,4	34,98	24,24
12-15	14,7	12,41	22,32
15-18	17,6	20,93	22,29
12-18	32,1	33,13	44,07
12-20	41,1	47,67	60,13
18-20	9,2	15,14	17,20
8-1	76,6	66,19	66,53
8-20	87,0	79,34	81,40
0-18	175,3	171,88	171,14
0-20	163,7	175,60	175,43

Тавре ки дар ҷадвали 3.8 нишон дода шудааст, суръати афзоиши буқчаҳо гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ вобаста ба синну сол фарқ мекунад. Суръати афзоиши вазни зиндаи буқчаҳои гурӯҳи I аз 8 то 12-моҳа назар ба гурӯҳҳои II ва III 12,42 ва 23,16 фоиз зиёд буд. Аз 12 то 20 моҳ суръати нисбии афзоиши буқчаҳои гурӯҳи III - 60,13 % таъкил намудааст, ки нисбат ба гурӯҳҳои I ва II, мутаносибан, 19,03 ва 12,46 % зиёд буд. Аз давраи таваллуд то 20-моҳа суръати афзоиши нисбии буқчаҳои гурӯҳи II - 175,60 фоиз, буқчаҳои гурӯҳи III - 175,43 фоиз, буқчаҳои гурӯҳи I - 163,70 фоизро таъкил дод.

Барои тасдиқи ин гуфтаҳо дар ҷадвали 3.9. ва расми 3.6. коэффисент ва сурати афзоиши буқчаҳо нишон дода шудааст.

Ҷадвали 3. 9. - Коэффисенти афзоиши буқчаҳо, %

Синну сол, моҳ	Гурӯҳ		
	I	II	III
8	6,8	6,4	6,7
12	11,0	8,2	9,5
15	12,7	10,3	10,7
18	15,2	12,9	13,2
20	16,7	15,3	15,4



Расми 3.6. - Коэффициенты скорости прироста урожая, %

Маълумот дар расми 3. 2 нишон медиҳад, ки суръати афзоиши буқчаҳо вобаста ба синну сол зиёд мешавад. Ин афзоиш дар синни 18 ва 20-моҳагӣ баръало мушоҳида мешавад. Аобаста ба ин генотипи чорво хусусиятҳои хоси худро дорад.

3.5. Рушд ва афзоиши буқчаҳои генотипҳои гуногун

Маълум аст, ки ба инкишофи шакли бадани буқчаҳо омилҳои гуногуни генотипӣ ва фенотипӣ: зот, намуд, чинс, синну сол, хусусиятҳои физиологӣ, суръати мубодилаи моддаҳо, дараҷаи нигоҳубин, хӯронидан ва ғайра таъсир мерасонанд.

Барои ба даст овардани тасвири пурраи афзоиш ва инкишофи буқчаҳо, ба ғайр аз муайян кардани вазни зинда, мо шакли берунӣ ва

конститутсионии буққаҷаҳои муқоисашударо дар шароити яхелаи нигоҳдорӣ ва ҳӯронидан арзёбӣ намудем.

Нишондиҳандаҳои асосии муайян намудани андозаи бадани чорво ченакҳои бадан мебошанд.

Дар робита ба ин, ченакҳои бадани буққаҷаҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ дар синни 12 ва 20 моҳа муайян карда шуданд, ки натиҷаҳои онҳо дар ҷадвали 3.10 оварда шудаанд.

Ҷадвали 3.10. - Тағйирёбаи ченаки бадани буққаҷаҳо вобаста ба синну сол, ($M \pm m$, см)


Нишондодҳо	Синну сол	Гурӯҳ		
		I	II	III
Баландӣ то қуҳон (дар ёл)	12	102,0 $\pm$ 0,53	104,2 $\pm$ 1,8 5	109,6 $\pm$ 1,43
	20	112,3 $\pm$ 1,22	112,9 $\pm$ 1,24	116,6 $\pm$ 1,28
Баландӣ дар устухони чорбанд	12	106,2 $\pm$ 4,66	107,4 $\pm$ 1,52	114,2 $\pm$ 0,78
	20	117,2 $\pm$ 1,84	118,0 $\pm$ 1,34	123,1 $\pm$ 1,31
Дарозии қачи бадан	12	105,5 $\pm$ 1,26	113,2 $\pm$ 1,96	117,0 $\pm$ 1,29
	20	130,1 $\pm$ 1,66	135,3 $\pm$ 1,90	146,7 $\pm$ 1,10
Даври қафаси сина	12	116,3 $\pm$ 3,11	125,4 $\pm$ 1,72	132,2 $\pm$ 1,03
	20	157,6 $\pm$ 0,92	160,3 $\pm$ 2,25	170,7 $\pm$ 0,48
Паҳноии қафаси сина	12	24,2 $\pm$ 1,06	28,7 $\pm$ 0,76	29,6 $\pm$ 0,46
	20	36,5 $\pm$ 0,70	37,3 $\pm$ 0,92	40,2 $\pm$ 0,64
Чуқурии қафаси сина	12	47,3 $\pm$ 1,00	50,4 $\pm$ 0,76	55,0 $\pm$ 0,65
	20	59,1 $\pm$ 0,88	60,4 $\pm$ 0,90	63,2 $\pm$ 0,50
Васеғии қафаси сина	12	30,5 $\pm$ 0,68	32,5 $\pm$ 0,60	34,0 $\pm$ 1,63
	20	36,6 $\pm$ 0,79	37,9 $\pm$ 0,66	42,0 $\pm$ 0,48
Даври устухони пой	12	12,9 $\pm$ 0,36	13,9 $\pm$ 0,28	14,6 $\pm$ 0,29
	20	17,1 $\pm$ 0,28	17,4 $\pm$ 0,36	18,3 $\pm$ 0,13

Аз нишондодҳои ҷадвали 3.10. маълум гардид, ки ченакҳои бадани чорво бо зиёд шудани синну сол меафзояд. Тавре ки дар ҷадвали 3.10 нишон дода шудааст, дарозии қачи бадани буққаҷаҳо гурӯҳи III дар 12 моҳагӣ 117,0 см ва дар 20 моҳагӣ 146,7 см буд, ки нисбат ба ҳамсолонӣ гурӯҳи I 11,5 ва 16,60 см дарозтар ва нисбат ба буққаҷаҳои гурӯҳи II, мутаносибан, 3,60 ва 11,4 см дарозтар аст.

Ҳамчунин, чуқурии қафаси синаи буққаҷаҳои гуруҳи I дар синни 12 ва 20 моҳаи , мутасонибан, 47,3 ва 59, 1, гурӯҳи II - 50,4 ва 60,4,

гурӯҳи III - 55,0 ва 63,2, давраи қафаси синаи букқаччаҳои гурӯҳи III дар 12 моҳагӣ 132,2 см ва дар 20 моҳагӣ 170,7 см буд. Нишондоди давраи устухони пойи букқаччаҳои гурӯҳи III вобаста ба синну сол мутаносибан 14,6 ва 18,3 см буданд, ки аз рушди беҳтари дасту пойҳо шаҳодат медиҳанд.

Ин афзалият дар расми 3.7. равшантар нишон дода шудааст.



Расми 3.7. - Ченакҳои асосии бадани букқаччаҳо, см

Дар расми 3.7 нишон дода шудааст, ки байни гурӯҳҳои муқоисашудаи букқаччаҳо дар нишондодҳои андозаи бадан фарқиятҳои назаррас мушоҳида нашудаанд. Ҳамаи гурӯҳҳо афзоиши мунтазами андозаҳо, аз қабيلي баланди дар кухон, дарозии бадан, ғафсии давраи сина ва ғафсии устухони пой, нишон доданд.

Вобаста ба нишондодҳои ченакҳои дар боло нишондодашуда индекси шакли танаи букқаччаҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ вобаста ба синну сол муайян карда шуд.

Индекси шакли тана, нишондиҳандаи зоотехникӣ мебошад, ки барои баҳодиҳии комплекси инкишофи бадани чорворо имконият медиҳад. Инчунин мутаносиби ғафсияти байни ченакҳои танаи чорворо, баъд аз гирифтани ченаки бадан, нишон медиҳад. Ин усули зоотехникӣ

имконият медиҳад, типҳои екстерерӣ - намуди берунаи чорво ва тараққӣ ёфтани ҳар як қисми танаро муайян намояд.

Индексҳои бадан шакли афзоиш ва рушди чорворо муайян меkunанд. Ин маълумотҳо, ки ба тадқиқоти мо алоқаманданд, дар ҷадвали 3.11 оварда шудаанд.

Ҷадвали 3.11. - Нишондиҳандаҳои индекси бадани букҷаҷаҳо

Нишондодҳо	Сину сол, моҳ	Гурӯҳ		
		I	II	III
Дарозпӯй	12	53,7 ± 1,08	54,0 ± 2,07	53,7 ± 0,49
	20	47,3 ± 0,59	46,0 ± 0,83	45,7 ± 0,40
Тӯлонӣ	12	113,6 ± 1,70	111,1 ± 1,33	112,6 ± 1,22
	20	115,9 ± 2,51	121,7 ± 1,56	125,9 ± 1,25
Чорбанди сандуки сина	12	89,3 ± 2,85	96,7 ± 3,58	105,4 ± 2,88
	20	99,9 ± 1,66	98,9 ± 2,77	95,6 ± 1,25
Сари синагӣ	12	54,1 ± 1,57	61,1 ± 1,52	61,6 ± 1,18
	20	61,8 ± 0,80	61,8 ± 1,93	63,5 ± 1,03
Пуррагӣ	12	116,3 ± 2,31	120,6 ± 1,38	120,4 ± 1,49
	20	121,2 ± 1,65	118,1 ± 1,70	116,4 ± 0,45
Ҷусатанагӣ	12	104,5 ± 0,87	103,3 ± 1,27	104,3 ± 1,53
	20	104,3 ± 0,93	104,5 ± 1,85	105,6 ± 0,66
Серустухонӣ	12	14,7 ± 0,45	14,9 ± 0,32	14,9 ± 0,27
	20	15,2 ± 0,67	13,8 ± 0,71	15,7 ± 0,16
Гӯштнокӣ	12	73,2 ± 1,68	73,7 ± 0,81	76,6 ± 0,13
	20	75,9 ± 2,48	83,4 ± 2,20	82,9 ± 1,47

Яке аз нишондиҳандаи индекси тана, ин *индекси дарозпӯйи* мебошад, ки бо зиёд шудани синну сол ин нишондиҳанда дар ҳамаи гурӯҳҳо қоҳиш меёбад ва дар ин ҷо танайи чорво нисбат ба пӯйҳо интенсивона инкишоф меёбад. Пастшавии индекси дарозпӯйи ва инкишоф ёфтани тана пеш аз ҳама бештар дар букҷаҷаҳои гурӯҳи III дар синни 12-моҳагӣ - 53,7 ва дар синни 20-моҳагӣ - 45,7 мушоҳида карда шудааст ва ин гурӯҳи букҷаҷаҳо бояд ба типҳои чорвои гӯшти дохил шаванд.

Индекси тӯлонӣ бошад, баракс, нишондиҳандаи баланд дар букҷаҷаҳои гурӯҳи III аз 112,6 то 125,9 қайд карда шудааст. Ин дарозшавии назарраси бадан то синни 20-моҳагӣ қайд карда шудааст, ва онҳо метавонанд иқтидори баланди истеҳсоли гӯштро нишон диҳанд.

Чорбанди сандуқи сина, дар синни 12-моҳагӣ дар букқачаҳои гурӯҳи III (105,4) нисбат ба дигар гурӯҳҳо баландтар буда, ва дар синни 20-моҳагӣ бошад, нисбатан паст (95,6) гардидааст.

Нишондоди нисбатан баландтар дар индекси *сари синагӣ* дар синни 20-моҳагӣ дар букқачаҳои гурӯҳи III (63,5) мебошад, ки ин рушди кафаси синаро нишон медиҳад ва ин нишонаи муҳими маҳсунокии гӯшти мебошад.

Индекси ҷусатанагӣ дар ҳамаи гурӯҳҳо ва синну сол якхела боқӣ мондаст, ки ин аз мувозинати чорво шаҳодат медиҳад.

Ин таҳлилҳо дар интиҳоби чорво барои гирифтани насл, фарбех кардан ва муайян намудани самти маҳсулнокии он аҳамият калон дорад.

Ҳамин тариқ, метавон хулоса кард, ки аз ҷиҳати нишондиҳандаҳои афзоиш ва инкишоф, букқачаҳои типӣ гӯштии тоҷикӣ дар синни 20-моҳа дар аксари андозагирӣ ва нишондиҳандаҳои ҳолати бадан нисбат ба букқачаҳои маҳаллӣ ва дурага бартарӣ доштанд.

3.6. Нишондиҳандаҳои гематологии хуни букқачаҳо

Параметрҳои гематологӣ меъёри муҳими баҳодиҳии ҳолати физиологии чорвои хоҷагии қишлоқ ба шумор меравад. Параметрҳо ба монанди гемоглобин, лейкоцитҳо ва эритроцитҳои хун барои назорат кардани мубодилаи оксиген, фаъолияти иммуногенетикӣ ва қобилияти мутобиқшавии чорво имкон медиҳанд.

3.6.1. Нишондиҳандаҳои морфологии хуни букқачаҳо

Нишондодҳои гематологӣ меъёри муҳими баҳодиҳии ҳолати физиологии бадани чорвои кишоварзӣ мебошад. Параметрҳо ба монанди миқдори гемоглобин, шумораи эритроцитҳо ва лейкоцитҳо, имконият медиҳанд, ки ҳолати мубодилаи оксиген, фаъолияти иммуногенетикӣ ва қобилияти мутобиқшавии бадани чорворо нигоҳ дорад.

Мақсади асосии корҳои илмию тадқиқотӣ ин муайян намудани динамикаи нишондодҳои гематологии букҷаҷаҳо дар синни 8-, 12- ва 20-моҳагӣ иборат мебошад.

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки дар маҷмӯъ нишондиҳандаҳои гематологии букҷаҷаҳои таҷрибавию назоратӣ дар меъёри физиологӣ қарор дорад (ҷадвали 3. 12., расми 3. 4).

Ҷадвали 3. 12. - Тағйирёбии миқдори таркиби хуни букҷаҷаҳо, ($\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$)

Нишондодҳо	Синну сол, моҳ	Гурӯҳ,		
		I	II	III
Гемоглобин, г/л	8	82,1±4,2	83,2±5,4	80,5±7,6
	12	98,0±2,1	100,2±4,4	111,3±5,1
	20	101,3±3,6	107,0±2,5	116,4±4,8
Эритроцитҳо, 10 ¹² /л	8	5,32±0,31	5,81±0,33	6,16±0,65
	12	5,60±0,42	5,97±0,54	5,91±0,48
	20	7,81±0,24	7,12±0,85	7,23±0,28
Лейкоситҳо, 10 ⁹ /л	8	4,34±0,23	4,42±0,31	4,52±0,51
	12	4,44±0,30	4,84±0,47	5,87±0,34
	20	4,64±0,33	4,80±0,94	7,25±0,21

Чуноне, ки маълумотҳои ҷадвали 3.12. нишон медиҳанд, дар нишондиҳандаҳои хуни букҷаҷаҳо фарқияти назаррас мушоҳида карда нашуд ва тағйирёбии мавсимии онҳо эҳтимолан натиҷаи мубодилаи организм ба тағйирёбии шароити муҳити зист бошад.

Муқаррар карда шуд, ки миқдори гемоглобин бо синну сол дар гурӯҳҳо зиёд шудааст. Мисол: дар синни 8-моҳагӣ миқдори гемоглобин аз 80,5 (гурӯҳи III) то 83,2 г/л (гурӯҳи II) таъкил намудааст. Дар синни 12-моҳагӣ ин нишондод вобаста ба гурӯҳҳо аз 98,0 г/л то 111,3 г/л таъкил дода нишондоди балантарин дар букҷаҷаҳои гурӯҳи III мушоҳида карда шудааст. Дар синни 20-моҳагӣ бошад, нишондоди балантари гемоглобин дар букҷаҷаҳои гурӯҳи III, ки 116,4 г/л таъкил дод, муайян карда шуд.


Ҳамин тариқ, миқдори баланди гемоглобин дар букҷаҷаҳои гурӯҳи III ба қайд гирифта шудааст, ки ин аз беҳтар шудани оксиген дар бофтаҳо ва суръатнокии мубодилаи моддаҳо дар ин гурӯҳи букҷаҷаҳо нишон медиҳад.

Микдори эритроцитҳо дар синни 8- моҳагии букқачаҳои гурӯҳи I – $5,32 \times 10^{12}/л$, дар гурӯҳи II - 5,81 ва дар гурӯҳи III - $6,16 \times 10^{12}/л$ буда, дар синни 12-моҳагӣ ин нишондод аз 5,60 то $5,97 \times 10^{12}/л$ ва дар синни 20-моҳагӣ бошад, нишондоди баландтарин дар букқачаҳои гурӯҳи I - $7,81 \times 10^{12}/л$, паст - гурӯҳи II - 7,12 ва миёна гурӯҳи III – $7,23 \times 10^{12}/л$ ташкил намуданд. Микдори зиёди эритроцитҳо дар букқачаҳои гурӯҳи I дар синни 20-моҳагӣ ба қайд гирифта шудааст.

Микдори лейкоцитҳо дар хуни букқачаҳои ҳамаи гурӯҳҳо чӣ дар фасли тобистон ва чӣ дар фасли зимистон дар доираи аз 4,34 то 7,25 % – ро ташкил доданд. Микдори зиёди лейкоцитҳо дар синни 20-моҳагӣ, дар букқачаҳои гурӯҳи III - $7,25 \times 10^{12}/л$ ва нисбатан кам дар букқачаҳои гурӯҳи II – $4,80 \times 10^{12}/л$ муайян карда шуд.

Ҳамин тариқ, дар букқачаҳои таҷрибавию назоратӣ бо гузашти синну сол мунтазам зиёдшавии микдори гемоглобин, эритроцит ва лейкоцит муайян карда мешавад, ки ин аз тағйирёбии ҳолатҳои физиологӣ, ки аз инкишофёбӣ ва тараққӣ ёфтани бадани чорво ба вуҷуд меояд, вобаста аст.

Таҳлил намудани таркиби сафедаи зардорби хуни букқачаҳо барои баҳо додан ба ҳолати функционалии чигар, сатҳи раванди мубодилаҳои моддаҳо ва муқовимати иммунологии организм аҳамияти калон дорад.



Расми 3. 8. - Тағйирёбии элементҳои таркиби хун дар букқачаҳои 20 моҳа, %

Албуминҳо ва фраксияҳои гуногуни глобулинҳо (α , β , γ) дар организми чорво вазифаҳо ва функсияҳои муҳофизатӣ, нақлиётӣ ва танзимкуниро иҷро менамоянд.

Бинобар ин сабаб, мо дар қорҳои тадқиқотии худ нишондиҳандаҳои морфологӣ хун концентратсияи сафедаи умумӣ, альбуминҳо ва глобулинҳо дар таркиби сафедаҳои зардоби хуни буққаҷаҳо омӯхтем, ки натиҷаи он дар ҷадвали 3.13. оварда шудааст.

Аз нишондодҳои ҷадвали 3. 13. маълум мегардад, ки миқдори зиёди сафедаи умумӣ дар буққаҷаҳои 8-моҳаи гурӯҳи III - 75,1 г/л буда, миқдори нисбатан ками онҳо дар буққаҷаҳои гурӯҳи I - 59,2 г/л муайян карда шуд. Ин нишондод дар синни 12-моҳагӣ нисбатан баланд шуда, дар буққаҷаҳои гурӯҳи III - 78,5 г/л ташкил намуд.

Дар синни 20-моҳагӣ бошад, миқдори сафеда дар гурӯҳҳо дар доираи меъёри физиологӣ қарор дошта, аз 75,3 то ба 79,2 г/л муайян карда шуд. Ин нишон медиҳад, ки фаъолияти синтези сафеда аз афзоиши бадани чорво вобастааст.

Ҷадвали 3. 13. - Таркиби албумин ва глобулини сафедаҳои зардоби хуни буққаҷаҳои таҷрибавӣ, г/л, ($\bar{X} \pm Sx$)

Нишондод	Синну сол, моҳ	Гурӯҳ		
		I	II	III
Сафедаи умумӣ, г/л	8	59,2±4,4	67,2±3,6	75,1±2,6
	12	72,6±2,0	73,7±3,5	78,5±1,8
	20	78,4±1,3	75,3±4,5	79,2±2,2
Албуминҳо, г/л	8	21,1±0,8	28,1±0,6	35,4±0,7
	12	25,2±0,7	30,5±0,8	37,7±0,6
	20	3,9±0,4	35,6±0,6	37,8±0,8
Глобулинҳо, г/л	8	38,1	39,1	39,7
	12	47,4	43,2	40,8
	20	39,4	39,7	41,4
α	8	9,0±0,2	9,4±0,3	9,8±0,2
	12	10,0±0,2	10,1±2,0	10,2±0,5
	20	9,8±0,1	10,5±0,3	10,5±0,4
β	8	8,9±0,1	8,7±0,2	8,8±0,2
	12	16,0±0,7	17,0±0,9	9,2±0,1
	20	9,6±0,2	9,8±0,2	9,6±0,4
γ	8	20,2±2,1	21,0±1,8	21,1±1,6
	12	21,4±3,6	16,1±2,2	21,4±1,5
	20	20,0±3,1	19,4±1,5	21,3±1,3

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки миқдори сафедаи умумӣ дар ҳамаи этапҳои сини соли дар гурӯҳи III нисбатан зиёд буд.

Албуминҳо дар синни 8-моҳагӣ дар букқачаҳои гурӯҳи I - 21,1 г/л, дар гурӯҳи II - 28,1 ва нисбатан миқдори зиёдтар дар гурӯҳи III - 35,4 г/л муайян карда шуд. Дар синни 12- моҳагӣ миқдори зиёди албумин дар букқачаҳои гурӯҳи III - 37,7 г/л ва нисбатан пасттар дар гурӯҳи II - 30,5 г/л буд. Дар синни 20-моҳагӣ бошад, назар ба синни 12-моҳагӣ миқдори албуминҳо зиёдтар буд. Мисол: дар гурӯҳҳои II - 35,6 ва III- 37,8 г/л.

Ҳамин тариқ миқдори албумин дар букқачаҳои гурӯҳи III баланд буд, ки ин аз кори мӯтадили чигар ва мубодилаи сафедахоро далолат медиҳад.

Глобулинҳо дар синни 8-моҳагӣ дар ҳамаи гурӯҳҳо якхела буданд. Дар синни 12-моҳагӣ бошад, миқдори зиёди он дар букқачаҳои гурӯҳи I 47,4 г/л ва нисбатан пастӣ он дар букқачаҳои гурӯҳи III - 40,8 г/л муайян карда шуданд. Дар синни 20-моҳагӣ ин нишондодҳо мӯътадил шуда, миқдори он аз 39,4 то 41,4 г/л -ро ташкил намуданд.

Дар ин давра фраксияҳои гуногуни глобулинҳо (α , β , γ) омӯхта шуданд.

α -глобулин дар синни 8-моҳагӣ дар букқачаҳои гурӯҳи III - 9,8 г/л ва миқдори ками он дар гурӯҳи I - 9,0 г/л, дар синни 12-моҳагӣ миқдори онҳо дар гуруҳҳо қариб баробар (10,0; 10,1; 10,2 г/л) буданд, дар синни 20-моҳагӣ бошад, аз 9,8 то 10,5 г/л-ро ташкил намуданд.

Миқдори максималии α – глобулин дар букқачаҳои гурӯҳи III муайян карда шудааст.

β -глобулинҳо дар синни 8-моҳагӣ қариб якхела буданд (8,7 - 8,9 г/л). Дар синни 12-моҳаги афзоиши якбораи β -глобулинҳо дар гурӯҳҳои I ва II - 16,0 ва 17,0 г/л муайян карда шуд. Дар гурӯҳи III бошад, ин арзишҳо дар сатҳи - 9,2 г/л боқӣ монданд.

γ - глобулинҳо дар синни 8- ва 12-моҳагӣ дар ҳамаи гурӯҳҳо дар сатҳи қариб якхела -21,0 – 21,1 г/л буданд. Дар синни 20-моҳагӣ сатҳи γ -

глобулинҳо аз 20,0 то 21,3 г/л буда, миқдори нисбатан баландтар дар букқачаҳои гурӯҳи III - 21,3 г/л буд, ки ин метавонад ҷамъшавии иммуноглобулинҳоро нишон диҳад.

Ҳамин тариқ, сатҳи нисбатан баландтари нишондодҳо (сафедаи умумӣ, албумин, γ - глобулинҳо) дар букқачаҳои гурӯҳи III муайян карда шудааст ва нисбатан камшавии сатҳи албуминҳо дар синни 20-моҳагӣ дар гурӯҳи I мушоҳида карда шудааст, ин фишори просесҳои метаболитикро нишон медиҳад.

Ин нишондодҳои зардоби хуни букқачаҳо, ҳамчун меъёри баҳодихӣ ба ҳолати физиологии онҳо, инчунин барои самаранокии истифодаи хӯроки чорво дар шароити ҷарогоҳӣ ва шароити нигоҳубинии онҳо, истифода бурда мешавад.

3.6.2. Нишондиҳандаҳои биохимиявии хуни букқачаҳо

Инчунин таҳлили биохимиявии зардоби хуни букқачаҳои таҷрибавию назоратӣ гузаронида шуд.

Меъёрҳои биохимиявии хун сатҳи мубодилаи моддаҳоро дар бадани чорво инъикос намуда, нишондиҳандаи муҳими ҳолати физиологӣ ва мубодилаи моддаҳои бадани чорво мебошанд

Яке аз нишондодҳо ин таркиби каротин мебошад, ки он роли асосиро дар ташаккули иммунӣ ва фаъолияти антиоксидантӣ, нақши муҳимро мебозад (Ҷадвали 3. 14).

Маълумоти ҷадвали 6 миқдори зиёди каротинро дар 12 моҳ нишон медиҳад, ки аз 0,86 мг% (гурӯҳи III) то 0,94 мг% (гурӯҳи II) фарқ мекунад. Дар 20 моҳ, ин арзиш аз 0,14 то 0,26 мг% коҳиш ёфт.

Калсий дар танзими асабу мушакҳо, ташаккули бофтаҳои устухонӣ ва лахташавии хун иштирок менамояд. Миқдори калсий дар 12 моҳ дар ҳама гурӯҳҳо аз 10,10 то 12,20 мг% буд. Дар 20-моҳ консентратсияи баландтарин дар букқачаҳои гурӯҳи III мушоҳида шудааст – 12,29 мг%.

Чадвали 3.14-. Нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хуни буккачаҳо

Нишондиҳанда	Синну сол моҳ	Гурӯҳ, ($\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$)		
		I	II	III
Каротин	8	0,55±0,02	0,54±0,05	0,53±0,06
	12	0,91±0,03	0,94±0,06	0,86±0,04
	20	0,68±0,05	0,70±0,04	0,60±0,04
Калсий, мг%	8	11,86±1,24	12,2±1,35	12,41±1,11
	12	10,78±0,35	10,60±0,26	10,10±0,79
	20	11,53±1,48	11,84±1,35	12,29±1,32
Фосфор, мг%	8	4,31±0,54	4,54±0,23	4,77±0,37
	12	5,85±0,08	7,68±0,59	5,29±1,25
	20	4,21±0,22	6,64±0,87	8,76±0,50
Захираи ишқор, бо ҳаҷми % CO ₂	8	48,46±2,61	48,69±2,84	48,20±2,31
	12	61,82±2,24	42,32±2,58	48,32±4,75
	20	50,33±2,48	49,14±2,31	48,93±2,42

Фосфор дар мубодилаи энергия, сохтори устухон ва тавозуни кислотаю асосҳо роли муҳимро мебозад.

Микдори фосфор дар 12-моҳа дар буккачаҳои гуруҳи II то 7,68 мг% мушоҳида карда шуда бошад, дар гуруҳи III бошад, нисбатан кам 5,29 мг% муайян шудааст. Дар 20-моҳ микдори ками фосфор дар гуруҳи I – 4,21 мг% ва зиёд дар гуруҳи III – 8,76 мг% мушоҳида шудааст.

Захираи ишқор хосиятҳои буферии хунро тавсиф менамояд ва ҳолати тавозуни кислотаю асосҳоро инъикос менамояд. Тағйироти баландтари захираи ишқорӣ дар ҳамаи гуруҳҳо дар синни 12-моҳагӣ мушоҳида карда мешавад, ки он бо ҳолати физиологӣ ва тағйир ёфтани характери нигоҳубинӣ ва хӯрокдиҳии чорво алоқаманд мебошад.

3.7. Системаи парвариши буккачаҳо дар чарогоҳҳои тобистонаи баландкӯх

Дар хоҷагиҳои ноҳияҳои қуҳсори ҷумҳурӣ чарогоҳҳо манбаи арзонтарини хӯроки чорво мебошанд. Дар чароҳгоҳ чаронидани чорво, хусусан зоти гӯштӣ ва инчунин дурагаҳои онҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ ғоиданок мебошад.

Хусусан айни замон, ки дар кишвари мо норасоии хӯроки ғалладонагӣ дида мешавад, хӯрокдиҳӣ мароқи калон дорад. Бинобар ин

сабаб омӯхтани таъсири набототи чарогоҳҳо ва усулҳои чаронидан, дар ташаккули маҳсулнокии гӯштии генотипҳои гуногуни чорво хеле муҳим мебошад.

Чароҳгоҳҳои Тоҷикистон растаниҳои зиёд ва фаровонии хӯроки чорво, чарогоҳҳои кӯҳии алпӣ ва субалпӣ дорад, ки ба он ҷойҳо дар давраи тобистон шумораи зиёди чорвои калони шохдори гӯштӣ, асп, гӯсфанд ва бузҳо ронда мешаванд.

Барои омӯхтани хусусиятҳои зудраси ва сифатҳои гӯштии саршумори чорвои калони сергӯшти типҳои тоҷикӣ ва дурагаҳои онҳо бо чорвои зебуи маҳаллӣ дар давраи чаронидан дар чарогоҳҳо, аз охири моҳи апрел гурӯҳҳои чорвои таҷрибавӣ дар як пода муттаҳид карда шуда, онҳо ба чарогоҳҳои баландкӯҳи минтақаи Ховалинг фиристода шуданд.

Чаронидани ҷавонаҳо аз 25 апрел то 15 октябр бештар аз 5 моҳро дар бар гирифтаст. Букҷаҳаҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ аз ҳафтаи аввали фарбеҳкунӣ сар карда, ба ғайр аз алафҳои чарогоҳ хӯроки иловагӣ нагирифтанд. Намаки лесид ба сифати иловаи минерали ба онҳо дода шуд.



Расми 3.9.- Букҷаҳаҳо дар чарогоҳҳои тобистона

Бинобар ба ин сабаб дар Тоҷикистон фарбеҳ кардани чорво махсусан дар фасли тобистон васеъ истифода бурда мешавад. Инро ба назар гирифта, мо букқачаҳои генотипҳои муқоисашавандаро дар муддати 153 рӯз, аз синни 14 то 20-моҳа дар шароити чарогоҳ фарбеҳ кардем. Натиҷаҳои ин тадқиқотҳо дар ҷадвали 3.15 оварда шудаанд.

Вақте, ки чорво чаронида мешуданд, онҳо гоҳ-гоҳ ба ҷойҳои нави чарогоҳ ронда мешуданд. Обнушони чорво дар як шабонарӯз 4 - 6 маротиба (об дар назди охурҳо гузошта шуда буд) гузаронида мешуд. Дар давоми рӯз (аз 6-7 то 20 соат) бештар аз 60 %-и рӯз чорво дар чарогоҳ чаронда шудааст.

Мо букқачаҳои генотипҳои муқоисашавандаро дар муддати 153 рӯз, аз синни 14 то 20-моҳа дар шароити чарогоҳ фарбеҳ кардем. Натиҷаҳои ин тадқиқотҳо дар ҷадвали 3.15 оварда шудаанд.

Вазни зиндаи чорво дар вақти ба чарогоҳ рондан мутаносибан дар гурӯҳи I - 235,5 кг; гурӯҳи II - 254,4 кг ва дар гурӯҳи III - 260,8 кг-ро ташкил намуд.

Ҷадвали 3. 15. - Натиҷаҳои парвариши букқачаҳо дар чарогоҳҳои тобистонаи баландкӯҳ, ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)

Гурӯҳҳо	Вазни зинда, кг		Ба вазни зиндаи аввала, %	Афзоиши вазни зинда дар давраи чарогоҳӣ		Истифодабарии ҳуроки чарогоҳ ба ҳисоби миёна ба ҳар 1 килограмм зиёд шудани вазни зинда, воҳ. ҳурока
	Ҳангоми ба чарогоҳ рондан	Вақти аз чарогоҳ бозгаштан			Ба ҳисоби миёна дар як шабонарӯз, г	
I	235,5 ± 2,64	327,7 ± 9,45	39,1	92,2	573	12,80
II	254,4 ± 8,20	348,7 ± 3,12	37,1	94,3	583	12,50
III	260,8 ± 3,33	365,3 ± 4,61	40,0	104,5	649	12,41

Чӣ тавре, ки дар ҷадвали 3.15 нишон дода шудааст, вазни зиндаи букқачаҳо пеш аз фарбеҳкунӣ вобаста ба гурӯҳҳо мутаносибан 235,5 кг,

254,4 кг ва 260,8 килограммро ташкил дод. Тағйирёбии генотипӣ дар охири давраи фарбеҳкунӣ ба вучуд омада, вазни зиндаи букқачаҳо гурӯҳи III - 104,5 кг, гурӯҳи I - 92,2 ва гурӯҳи II - 94,3 кг зиёдгаштааст.

Ҳангоми аз чарогоҳ бозгаштан вазни зиндаи миёнаи букқачаҳои гурӯҳи I - 327,7 кг, гурӯҳи II - 348,7 кг ва гурӯҳи III - 365,3 кг-ро ташкил намуд.


Афзоиши миёнаи шабонарӯзӣ дар букқачаҳои гурӯҳи III - 649 г-ро ташкил намуд, ки ин нишондод нисбат ба букқачаҳои гурӯҳи I (573 г) ба миқдори 73 г ва нисбат ба букқачаҳои гурӯҳи II (583 г) ба миқдори 66 г бартарӣ доштанд ($P < 0,001$).

Маълумотҳои овардашуда, дар маҷмӯъ, самаранокии баланди истифодаи чарогоҳҳиро дар парвариши букқачаҳо бе истифодаи хӯроки концентратӣ нишон медиҳанд. Ба ин муносибат бояд гуфт, ки ин хусусияти яке аз сифатҳои пурқимати биологӣ ва хоҷагидориест, ки ба чорвои ин гурӯҳҳо хос аст.

Фарқият дар вазни зиндаи байни букқачаҳои зотӣ ва дурага дар синни 14-моҳагӣ, яъне пеш аз оғози ба чарогоҳ рондан шаҳодат дод, ки дар синни барвақтӣ афзоиши вазни зиндаи чорво бо суръати гуногун ба амал меояд.

Аз натиҷаҳои чаронидани чорвои таҷрибавӣ ва назоратӣ чунин бармеояд, дар ин давра букқачаҳои типии тоҷикӣ (гурӯҳи III) барои зиёд кардани вазни зинда қобилияти бештар нишон доданд, бо вучуди ин, чорвои дурага низ нишондиҳандаҳои қаноатбахш ба даст оварда, дар ҳар сар букқача ба ҳисоби миёна 104,5 килограмм зиёдшавии вазни зинда мушоҳида карда шуд, ки ин натиҷаи афзоиши ҳуби онҳоро дар чарогоҳ нишон медиҳад.

Бояд таъakkур дод, ки букқачаҳои типии тоҷикӣ нисбат ба ҳамсолони худ мавсими чаронидани чарогоҳҳиро нисбатан бештар истифода бурданд. Онҳо дар вазни зинда нисбат ба ҳамсолони худ (гурӯҳҳои I ва II) 12,3 ва 10,2 кг бартарӣ доштанд (расми 3.10).



Расми 3. 10.- Вазни зиндаи букқачаҳо пеш аз ба чарогоҳ бурдан ва баъди бозгашт аз чарогоҳ

Ҳамин тариқ, чунонки таҷрибаҳои гузаронидани мо нишон доданд, дар вақти нигоҳдории букқачаҳо дар чарогоҳ, бе хароҷоти хӯроки концентратӣ, маҳсулнокии хуби гӯштиро ба даст овардан мумкин аст, ки он ба талаботи ҳозираи иқтисодии бозоргонӣ мувофиқ мебошад.

3.8. Маҳсулнокии гӯштии букқачаҳо, таркиби морфологии тана ва қисмҳои он

Хусусиятҳои асосии селекционӣ, ки сифатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранокии парвариши чорвои гӯштиро муайян менамояд, ин маҳсулнокии гӯштӣ мебошад. Аз ин рӯ омӯзиши нишондиҳандаҳои асосии забҳи чорво аҳамияти муайяни илмию амалӣ дорад. Дар тадқиқотҳо, мо, баҳодиҳӣ ба сифатҳои гӯшт, баромади тана, равшан ва инчунин истифодабарии маҳсулоти иловагӣ, аз қабилӣ пӯст, аз нуқтаи назари биологӣ ва иқтисодӣ, муҳим мебошад, таҷрибаҳои махсус гузаронедем.

3.8.1. Нишондиҳандаҳои забҳи назоратии букқачаҳо

Мақсади асосии корҳои илмию тадқиқотӣ доир ба омӯختани фарқиати хусусиятҳои асосии забҳ байни букқачаҳои таҷрибавию

назоратӣ, мебошад. Аз ин лиҳоз дар синни 20-моҳагӣ забҳи букқачаҳо гузаронида шуд, ки дар он вазни зиндаи пеш аз забт, вазни танаи навзабтхшуда, баромади тана (тӯш), чарбуи дохилӣ, равған ва вазни пӯсти онҳо омӯхта шуданд. Натиҷаи гузаронидани забҳи бӯққачаҳо дар ҷадвали 3. 16 оварда шудааст.

Аз маълумоти ҷадвали 3.16. маълум мешавад, ки аз рӯи нишондиҳандаҳои маҳсулнокии гӯшт дар байни букқачаҳои генотипҳои гуногун фарқияти калон ва ҷиддӣ вуҷуд дорад. Аз ҷиҳати вазни зиндаи пеш аз забҳи букқачаҳои типҳои гӯштии тоҷикӣ (гурӯҳи III) - 388,0 кг, назар ба ҳамсолони дурагаи худ (гурӯҳи II) - 2,1% ва зоти маҳаллӣ (гурӯҳи I) - 18,9% зиёд буд ($P > 0,999$). Ин нишон медиҳад, ки суръати интенсивии инкишофёбии букқачаҳои типҳои гӯштии тоҷикӣ нисбат ба гурӯҳҳои дигар баландтар буд.

Ҷадвали 3.16. - Маълумотҳо оид ба маҳсулнокии гӯштии букқачаҳо дар охири давраи фарбеҳкунӣ оварда шудааст

Нишондиҳанда	Воҳиди ченак	Гурӯҳ, ($\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$)		
		I	II	III
Вазни зиндаи пеш аз забҳ	кг	314,7±8,60	380,0±10,58	388,0±3,78
Вазни танаи навзабтхшуда	кг	166,3±4,66	202,1±2,02	203,3±3,36
Баромади гӯшти тана	%	52,8	53,18	52,39
Вазни чарбуи дохилӣ	кг	11,1±0,36	18,0±1,02	11,20±0,40
Баромади равғани дохилӣ	%	3,5	4,74	2,89
Вазни умумии тана баъд аз забҳ	кг	177,5±5,20	255,5±8,80	214,5±3,48
Баромади умумии тана	%	56,4	59,34	55,29
Вазни пӯсти навзабтхшуда	кг	23,17±1,02	27,2±0,75	29,50±0,17
Ба ҳисоби % вазни зиндаи пеш аз забҳ	%	8,65	6,10	7,60

Нишондиҳандаи муҳиме, ки сифати забҳро нишон медиҳад, вазни гӯшти букқачаҳо пас аз забҳ аст. Арзиши он дар букқачаҳои гурӯҳи III нисбатан баландтар буда 203,3 кг-ро ташкил намудааст, ки нисбат ба букқачаҳои гурӯҳи I - 22,25% ва нисбат ба букқачаҳои гурӯҳи II - 0,59% баландтар мебошад. Мувофиқа ба ин баромади гӯшти танаи букқачаҳои

гурӯҳи II 59,34 %-ро ташкил дод, ки ин таъсири эҳтимолии гетерозисро нишон медиҳад.

Дар букқачаҳои гурӯҳи II вазни бештари рағани даруни 18,0 кг-ро бо баромади рағани дохилӣ - 4,74 %-ро ташкил намуд, ин метавонад натиҷаи беҳтар ҳӯрокхӯрӣ ва мубодилаи физиологӣ барои ҷамъшавии раған дар бадани чорво мебошад. Умуман, букқачаҳои гурӯҳҳои II ва III аз ҷиҳати баромади гӯшту раған назар ба ҳамсолони зебуи маҳаллии худ хеле бартарӣ доштанд.

Вазни зиёди пӯсти букқачаҳои навзабҳшуда дар букқачаҳои гурӯҳи III - 29,50 кг ба қайд гирифта шудааст, ки он 7,6%-и вазни зиндаро ташкил медиҳад, дар букқачаҳои гурӯҳи II - 27,2 кг ва 6,1% ва дар букқачаҳои гурӯҳи I - 23,17кг, ин нишондод 8,65%-и вазни зиндаро ташкил дод, ки ин метавонад фарқияти зичӣ ва ғафсии пӯстро нишон диҳад.

Ҳамин тариқ, таҳлилҳои муқоисавӣ нишон доданд, ки букқачаҳои гурӯҳи II нисбат ба букқачаҳои гурӯҳҳои I ва III, аз нишондиҳандаҳои мутаносиби маҳсулнокии забҳ: баромади умумии танаи навзабҳшуда, баромади рағани дохилӣ ва вазни оптималии пӯст бартарӣ доранд. Ин маълумотҳои гирифташуда аз он далолат медиҳад, ки дар оянда истифода бурдани ин гурӯҳи букқачаҳо барои баланд бардоштани даромаднокии соҳаи чорводорӣ шаҳодат медиҳад.

Дар ин давра нишондиҳандаҳои асосии сифати гӯшт ва таркиби морфологӣ он омӯхта шуд.

Нишондиҳандаи асосии сифати гӯшт ин таркиби морфологӣ гӯшт мебошад, ки он бофтаҳои мушакҳо, бофтаҳои рағанӣ, рагу пайҳо ва устухонҳоро дар бар мегирад (ҷадвали 3.17).

Аз нишондодҳои ҷадвали 3.17 бармеояд, ки таркиби морфологӣ гӯшт дар букқачаҳои генотиашон гуногун ҳархела мебошад.

Баландтарин нишондоди вазни танаи хунукшуда дар букқачаҳои гурӯҳи II дида мешавад, ки он 101,73 кг, ин нишондод букқачаҳои гурӯҳҳои I - 82,58 кг, дар гурӯҳи III бошад -100,80 кг-ро ташкил намуд.

Чадвали 3.17. - Таркиби морфологии нимтанаи буккачаҳо дар синни 20-моҳагӣ

Нишондод	Воҳиди ченак	Гурӯҳ, ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)		
		I	II	III
Вазни танаи хунукшуда	кг	82,58 ± 2,15	101,73 ± 5,38	100,80 ± 3,21
Гӯшти лаҳм	кг	62,49 ± 2,28	77,72 ± 1,67	80,58 ± 2,1
	%	75,62	76,42	79,94
Аз ҷумла: бофтаи мушакӣ	кг	57,74 ± 1,96	72,76 ± 1,50	76,70 ± 3,1
	%	69,91	71,52	76,09
бофтаи рағанӣ	кг	4,75 ± 0,52	4,96 ± 0,36	3,88 ± 0,3
	%	5,80	4,76	3,85
рағу пайҳо	кг	2,23 ± 0,18	3,21 ± 0,15	1,81 ± 0,4
	%	2,70	3,16	1,79
устухонҳо	кг	13,86 ± 1,76	23,06 ± 0,31	18,45 ± 1,6
	%	22,84	22,67	18,30
Таносуби гӯшт ба устухон		3,31 ± 0,11	3,24 ± 0,21	4,36 ± 0,19

Аз ин нишондодҳо бармеояд, ки нисбатан вазни зиёди баромади умумии танаи хунукшуда, дар буккачаҳои гурӯҳҳои II ва III муайян карда шудааст. Вазни нисбатан вазнинтари гӯшти лаҳм дар буккачаҳои гурӯҳи III, ки он 80,58 кг ва баромади гӯшт 79,94 %-ро ташкил медиҳад, муайян карда шуд. Ин нишондод нисбат ба буккачаҳои гурӯҳи II ба миқдори 2,86 кг ва нисбат ба гурӯҳи I ба миқдори 18,16 кг бартарӣ дошт.

Бофтаҳои мушакӣ бошад, дар буккачаҳои типии тоҷикии чорвои гӯштӣ - 76,70 кг (76,09%) ташкил намуд, ки ин назар ба буккачаҳои гурӯҳи I ба миқдори 18,96 ва II ба миқдори 3,96 килограммӣ зиёд аст, ин нишон медиҳад, ки бофтаҳои мушакии буккачаҳои гурӯҳи III нисбат ба ҳамсолон худ хуб инкишоф ёфтааст. Бофтаҳои рағанӣ бошад, дар буккачаҳои гурӯҳи II, ки он 48,96 кг (4,76%)-ро ташкил намуд. Дар ин давра нишондоди нисбатан камтар дар буккачаҳои гурӯҳи III, он 3,88 кг (3,85%) буд, ин нишон медиҳад, ки маҳсулоти гӯштӣ дар буккачаҳои гурӯҳи III камравған буда, ба талаботи муосири истеъмолкунандагон ҷавобгӯй мебошад.

Вазни устухон дар буккачаҳои гурӯҳи II, ки он 23,06 кг (22,67%) буда, нисбат ба буккачаҳои гурӯҳи I ва III мутаносибан 9,20 кг ва 4,61 кг бартарӣ дошт. Вале вазни қиёсии устухон дар вазни гӯшт дар гурӯҳҳои I ва II қариб як хел 22,8% буд, дар буккачаҳои гурӯҳи III бошад, ҳамагӣ

18,30%-ро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳандаи мусоид барои нимтанаи букқачаҳо мебошад.

Инчунин, дар букқачаҳо таҷрибавию назоратӣ вазни мутлақ ва арзиши нисбии қисмҳои анатомии нимтанаи онҳо муайян карда шудааст. Ин таҳлил ба мо имконият медиҳад, ки дар кадом қисми танаи букқачаҳои таҷрибавию назоратӣ фарқияти назарраси гӯшт ҷойгир шудааст, ки натиҷаи он дар ҷадвали 3.18. оварда шудааст.

Аз нишондоди ҷадвали 3.18 маълум мегардад, ки вазни мутлақи гардан аз аз 10,02 кг (гурӯҳи II) то 10,49 кг (гурӯҳи III) тағйир меёбад. Арзиши нисбии аз вазни умумӣ букқачаҳо, ки аз 9,84 % (гурӯҳи II) то 12,18 % (гурӯҳи I) фарқ мекунад. Ҳамин тариқ, вазни қисми гардани букқачаҳои гурӯҳи III нисбат ба гурӯҳҳои I ва II мутаносибан 0,43 кг ва 0,47 кг зиёд буданд. Баландтарин вазни нисбии қисми гардан дар букқачаҳои гурӯҳи I (12,18%) ба қайд гирифта шуд, лекин аз ҷиҳати арзиши гӯштӣ бошад, ин қисми тана каммаҳсул ҳисобида мешавад.

Ҷадвали 3.18.- Вазни мутлақ ва нисбии қисмҳои табиӣ анатомии нимтанаи букқачаҳо

Қисмҳои тана	Воҳиди ченак	Гурӯҳ, ($\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$)		
		I	II	III
Гардан	кг	10,06±0,21	10,02±0,16	10,49±0,71
	%	12.18	9.84	10.41
Китфу қулфак	кг	14,04±0,59	17,38±0,17	17,84±0,84
	%	17.00	17.08	17.63
Тахтапушту қабурға	кг	23,77±1,14	30,38±0,34	29,80±1,61
	%	28.78	29.86	29.46
Камар	кг	7,50±0,52	11,22±0,22	14,54±0,68
	%	9.08	11.03	14.37
Косу рон	кг	27,22±0,07	31,90±0,28	28,5±1,44
	%	32.96	31.36	28.16

Дар қисми китфу қулфак вазни мутлақ ва арзиши нисбии нисбатан баланд дар букқачаҳои гурӯҳи III - 17,84 кг (17,63%) ба қайд гирифта шудааст, ки ин нисбат ба букқачаҳои гурӯҳи I (14,04 кг) ба миқдори 3,8 кг ва нисбат ба букқачаҳои гурӯҳи II ба миқдори 0,46 кг бартарӣ доштанд.

Ин нишон медиҳад, ки қисми пеши нимтанаи букқачаҳои гурӯҳи III беҳтар инкишоф ёфтааст.

Дар тахтапушту қабурғаи қисми нимтанаи букқачаҳои дурагаи гурӯҳи II баръакс, аз букқачаҳои гурӯҳи I ва гурӯҳи III мутаносибан ба миқдори 6,61 кг (27,8%) ва 0,58 кг (2,01%) зиёд буд.

Дар қисми камари нимтана дар букқачаҳои гурӯҳи III – 14,54 кг (14,37%) буд, ки аз гурӯҳи I-ум ба миқдори 7,04 маротиба ва аз гурӯҳи II - 3,32 кг бартарӣ доштанд.

Дар қисми косу рон бошад, вазни нисбатан зиёд дар букқачаҳои гурӯҳи II - 31,90 кг мушоҳида карда мешавад, ки ин нисбат ба нимтанаи ҳамсолони худ аз гурӯҳҳои I ва III, мутаносибан, ба миқдори 4,68 (14,67%) ва 3,40 кг (10,66%) бартарӣ дошт.

Ҳамин тариқ, оид ба қисми анатомии нимтанаи букқачаҳо қайд кардан лозим аст, ки қисми тахтапушт ва косу рони букқачаҳои дурагаи гурӯҳи II натиҷаи беҳтарин мушоҳида карда шуд, ки ин гӯшти аълосифти чорворо нишон медиҳад. Дар букқачаҳои гурӯҳи III бошад, аз ҷиҳати инкишофёби қисми мобайни (қисми камар) ва китфу қулфак нисбат ба гурӯҳҳои I ва II фарқ мекунанд, дар гурӯҳи I бошад, ба ғайр аз вазни нисбии қисми гардан, аз бисёри нишондодҳо нисбатан паст буд.

Умуман нишондиҳандаҳои баландтари забҳ дар букқачаҳои гурӯҳҳои II ва III мушоҳида карда мешавад, ки онҳоро ба чорвои гӯштӣ дохил намудан афзалтар мешуморанд.

Дар ин давра таркиби морфологию анатомии нимтанаи букқачаҳои таҷрибавию назоратӣ омӯхта шуданд. Натиҷаи корҳои илмию тадқиқотӣ доир ба таркиби морфологию анатомии танаи букқачаҳо дар ҷадвали 3.19. оварда шудааст.

Чунонки аз маълумотҳои ҷадвали 3.19. дида мешавад, дар ҳамаи қисмҳои танаи букқачаҳои гурӯҳи III бофтаҳои мушакӣ нисбат ба ҳамсолони маҳаллӣ ва дурағаҳои худ зиёдтар мебошад.

Масалан, бофтаҳои мушакӣ дар қисми гардани букқачаҳои гурӯҳи III-18,0 кг буда, 76,26% қисми гарданро ташкил медиҳад, дар китфу

кулфак – 13,46 (75,45%), дар тахтапушту қабурға- 21,4 кг (71,79%), дар камар – 11,6 (79,78%) ва дар қисмҳои косу рон бошад - 22,6 кг (79,3%) буд.

Гузоштани рағғани байни мушакҳо ва зери пӯст дар ҳамсолони ҳамаи гурӯҳҳо, хусусан дар қисмҳои тахтапушту қабурға, камар ва косу рони тана ба назар мерасид, ки бартарӣ ба фоидаи букқачаҳои гурӯҳи I ва II буда, рағғангузорӣ бошад, дар қисмҳои гардан ва китфи ҳама генотипҳои чорво тақрибан якхела буданд. Микдори устухонҳо дар гурӯҳҳои букқачаҳо аз ҳама бештар дар қисми тахтапушту қабурғайи нимтана ва аз ҳама пасттар дар қисми гардан буд.

Ҷадвали 3.19.- Таркиби морфологии қисмҳои табию анатомии нимтанаи букқачаҳо, кг

Нишондод	Воҳиди ченак	Қисмҳои тана, ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)				
		Гардан	Китфу кулфак	Тахтапушту қабурға	Камар	Косу рон
I						
Бофтаи мушакӣ	кг	12,98±0,26	9,75±0,53	14,54±0,64	4,69±0,27	20,75±0,27
	%	79.32	69.50	61.28	62.55	76.23
Бофтаи чарб	кг	0,44±0,05	0,72±0,02	1,32±0,11	0,85±0,11	1,42±0,09
	%	4.38	5.17	5.53	11.42	5.20
Рағу пайвандҳо	кг	0,35±0,02	0,42±0,01	0,50±0,04	0,40±0,07	0,64±0,03
	%	3.48	2,96	1,91	4,95	2.35
Устухон	кг	1,29±0,05	3,14±0,19	7,43±0,40	1,58±0,07	4,41±0,24
	%	12.82	22, 37	31.28	21.08	16.22
II						
Бофтаи мушакӣ	кг	16,98±0,76	11,6±0,44	17,97±0,65	8,14±0,37	21,67±0,5
	%	117,45	72,47	66,53	71,2	77,76
Бофтаи рағғанӣ	кг	0,69±0,07	0,69±0,025	1,31±0,11	0,73±0,29	1,11±0,40
	%	6,76	4,44	4,94	7,84	4,0
Рағу пайвандҳо	кг	0,545±0,02	0,37±0,025	0,4±0,03	0,33±0,04	0,59±0,03
	%	3,6	2,37	1,46	3,38	2,12
Устухон	кг	1,44±0,05	3,27±0,39	7,11±0,36	1,82±0,13	4,48±0,26
	%	14,04	2071	27,04	17,62	16,13
III						
Бофтаҳои мушакӣ	кг	8,0 ±0,52	13,46 ±0,36	21,4 ±0,66	11,6 ±0,48	22,6 ±0,72
	%	76.26	75.45	71,79	79,78	79.3
Бофтаи рағғанӣ	кг	0,5 ± 0,04	0,66 ±0,03	1,3 ±0,11	0,62 ±0,04	0,8 ±0,01
	%	4,77	3,7 2	4.36	4.26	2.81
Рағу пайвандҳо	кг	0,39 ±0,02	0,32 ±0,04	0,3 0 ±0,02	0,26 ±0,01	0,54 ±0,03
	%	3,72	1,79	1.01	1,79	1,89
Устухон	кг	1,6 ±0,0,6	3,4 ±0,59	6,8 ±0,33	2,06 ±0,19	4,56 ±0,29
	%	15.26	19.06	22.81	14.17	16.04

Микдори устухонҳо дар қисмҳои табию анатомии танаи буқчаҳои типи тоҷикӣ нисбат ба буқчаҳои дурага ва маҳалӣ хеле зиёд буд.

Омӯзиши арзишҳои нисбии таркиби морфологии қисмҳои табию анатомии чорвои таҷрибавӣ ҳосили баланди гӯшти беустухонро дар онҳо нишон дод.

Муайян карда шуд, ки микдори максималии гӯшти беустухон дар чорвои ҳамаи генотипҳо дар гарданак ва китфу шона ва камтарини он дар пушту кабурға буда ва дар қисми қафо бошад, калонтарин таркиби устухонҳо ҷойгир мебошад.

Ҳамин тавр, таҳлили таркиби морфологии қисмҳои табию анатомии нимтанаи буқчаҳои маҳаллӣ, дурага ва типи тоҷикӣ дар вазни мутлақ ва нисбӣ бартарии назарраси ду гуруҳи охирро нишон дод, ки дар қисмҳои алоҳидаи онҳо маҳсулнокии баланди гӯшти беустухон ва каме паст будани устухон назар ба буқчаҳои чорвои маҳаллӣ мушоҳида шуд.

Нишондиҳандаи муҳиме, ки сифати танаи ҳайвонотро тавсиф мекунад, микдори гӯшти беустухон ва бофтаи мушакҳо ба 1 кг устухон мебошад.

Дар қисмҳои китфу шона ва пушту кабурға нишондиҳандаҳои омӯхташуда дар чорвои ҳамаи гуруҳҳо тақрибан якхела буданд. Дар қисмҳои танае, ки аз ҷиҳати ғизоӣ аз ҳама пурқимат аст, бартарӣ дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ буд.

Дар 1 кг устухони қисми гардани онҳо 0,34 кг ва бофтаи мушакҳо 0,40 кг, дар сутунмуҳра 1,01 - 0,92 ва 0,66 - 0,38 кг зиёд дар типҳои тоҷикӣ нисбат ба чорвои ҳамсолони маҳаллӣ ҷойгир аст. Дар буқчаҳои дурага нисбат ба буқчаҳои назоратӣ дар гардан гӯшти беустухон 0,69 зиёдтар буд ва аз он ҷумла, мушакҳо 0,67 ва сутунмуҳра низ мутаносибан 0,55 ва 0,55 килограмм ва дар косу рон 0,47 ва 0,40 килограмм баландтар шуд.

Зиёда аз он, дар ин буқчаҳо микдори гӯшти беустухон ва бофтаҳои мушакҳои қисмҳои гардан ва сутунмуҳраи тана нисбат ба чорвои гуруҳи

I зиёд буда, аз рӯи дигар нишондиҳандаҳои қисмҳои тана онҳо дар байни буқчаҳои гурӯҳи 1 таҷрибавӣ мавқеи мобайниро ишғол кардаанд.

Умуман, дар нимтанаи буқчаҳои типӣ тоҷикӣ дар ҳисоби 1 кг устухон 0,28 кг ва гӯшти беустухон 0,28 кг ва мушакҳо 0,24 кг, дурагаҳо мутаносибан 0,23 кг ва 0,21 кг нишондиҳандаҳои ҳамсолони худро дар гурӯҳи назоратӣ пеш гузаштанд.

Аз ин рӯ, омӯзиши таркиби морфологии тана ва қисмҳои табию анатомии онҳо нишон дод, ки буқчаҳои типӣ тоҷикӣ ва дурага аз ҳамсолони маҳаллӣ худ аз рӯи тамоми нишондиҳандаҳои асосии мутлақ ва нисбӣ бартарӣ доштанд.

3.8.2. Арзёбии муқоисавии сифати гӯшт, равған ва мушаки дарозтарини пушт

Сифати гӯштро бештар таркиби химиявии он муайян менамояд. Дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ таркиби химиявии гӯшти қима гузаронида шуд, ки дар он параметрҳои асосии арзиши ғизоӣ: миқдори намнокӣ, моддаҳои хушк, равған, сафеда хокистар ва миқдори макроэлементҳо – калсий ва фосфор омӯхта шуданд. Дар ҷадвали 3.20. таркиби химиявии гӯшти қиммаи буқчаҳои муқоисашаванда оварда шудааст.

Ҷадвали 3.20.- Таркиби химиявии гӯшти қима аз буқчаҳои генотипҳои гуногун

Нишондод	Воҳиди ченак	Гурӯҳ, ($\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$)		
		I	II	III
Намнокӣ умумӣ	%	69,32±1,97	69,12±1,87	69,53±0,49
Моддаи хушк	%	29.68	30.88	30,47±0,24
Равған	%	8,7±0,33	7,88±0,33	8,95±0,13
Сафеда	%	21,1±0,79	21,81±0,50	20,51±0,54
Таносуби сафеда ба равған	%	2,43:1	2,77:1	2,29:1
Хокистар	%	0,93±0,01	0,95±0,02	1,01±0,02
Арзиши энергетикӣ	МҶ	6,83	6,86	7,01
Калсий	мг%	0,13 ± 0,04	0,10±0,002	0,11±0,05
Фосфор	мг %	2,85 ± 0,16	3,10±0,48	2,88±0,32

Чӣ хеле, ки аз нишондодҳои ҷадвали 3.20. маълум мегардад, миқдори намнокии гӯшт дар ҳамаи гурӯҳҳои букҷаҷаҳо қариб якхела мебошанд, ки ин аз 69,12 % (гурӯҳи II) то 69,53 % (гурӯҳи III) буд, ки ин якхела будани таркиби гӯшти қимаро нишон медиҳад. Мувофиқа ба ин, миқдори моддаҳои хушк дар говҳои гурӯҳи I - 29,68%, гурӯҳи II - 30,88% ва гурӯҳи III - 30,47% -ро ташкил дод.

Миқдори зиёди раған бошад, дар букҷаҷаҳои гурӯҳи III - 8,95% мебошад, ки арзиши баланди энергетикиро таъмин менамояд. Миқдори ками раған дар букҷаҷаҳои гурӯҳи II мушоҳида карда шудааст, ки он 7,88 %-ро ташкил намуд, ки ин мумкин характери паҳрезӣ дорад. Миқдори максималии сафедаҳо дар букҷаҷаҳои гурӯҳи II - 21,8% ташкил намуд, ки ин нишондиҳандаҳои беҳтарини арзиши ғизоиро инъикос менамояд. Сафдаҳо дар букҷаҷаҳои гурӯҳи I - 21,1 %, гурӯҳи II - 21,81% ва дар букҷаҷаҳои гурӯҳи III бошад, 20,51%-ро ташкил намуданд.

Таносуби нисбатан баланди сафеда бо раған дар букҷаҷаҳои гурӯҳи II - 2,77:1 мебошад, ки ин мувозинати оптималии сафедаю липидҳоро нишон медиҳад. Инчунин, нишондоди пасттари таносуби сафеда бо раған дар гурӯҳи III - 2,29:1 мебошад, ки ин бо зиёд будани раған алоқаманд мебошад. Миқдори хокистар дар таркиби гӯшти қима на он қадар зиёд мебошад, ки он дар букҷаҷаҳои гурӯҳи III - 1,01% буда, ин дараҷаи баландтари компонентҳои минералиро нишон медиҳад.

Арзиши энергетикӣ нисбатан баланди гӯшти қима дар букҷаҷаҳои гурӯҳи III - 7,01 МДж, муайян карда шудааст, ки аз зиёд будани миқдори раған дар гӯшти қима мебошад. Арзиши энергетикӣ гӯшти букҷаҷаҳои гурӯҳи III нисбат ба ҳамсолони гурӯҳи I ба миқдори 2,57% ва нисбат ба гурӯҳи II ба миқдори 2,13% зиёд мебошад.

Инчунин миқдори нисбатан баланди калсий, дар букҷаҷаҳои гурӯҳи I - 0,13 мг⁰% ва миқдори фосфор бошад, дар букҷаҷаҳои гурӯҳи II - 3,10 мг⁰% мушоҳида карда шудааст, ки дар ин гурӯҳ баланси беҳтари минералнокии гӯшти қимаро нишон медиҳад.

Натиҷаи таҳлилҳо нишон доданд, ки дар таркиби гӯшти қимаи букқачаҳои гурӯҳи II миқдори нисбатан баланди сафедаҳо ва таносуби сафеда бо рағған, инчунин миқдори баланди фосфор, ки гӯштро серғизо менамояд, нисбат ба дигар гурӯҳҳо фарқ мекунад. Букқачаҳои гурӯҳи III бо миқдори зиёди рағған, хокистарнокӣ ва арзиши энергетикӣ минералнокӣ фарқ намуда, аз ҷиҳати миқдори сафеда паст мебошад. Букқачаҳои гурӯҳи I бошад, нишондиҳандаи миёна дошта, оид ба нишондоди фоизи калсий дар гӯшти қима нисбат ба дигар гурӯҳҳо зиёд мебошад.

Ҳамин тариқ, букқачаҳои гурӯҳи II-ро дорои арзиши баланди ғизоӣ ва биологӣ ҳисоб намудан лозим аст, дар ин ҳолат букқачаҳои гурӯҳи III бошад, дорои каллорияи баланди гӯшт мебошанд.

Барои ба таври объективӣ баҳо додан ба сифати гӯшт таҳлили физикавӣю химиявӣю мушаки дарозтарини пушти букқачаҳо муайян карда шуд, ки натиҷаҳои он дар ҷадвали 3.21. оварда шудааст.

Ҷадвали 3.21.- Арзиши биологӣ ва нишондодҳои физикию химиявӣю мушаки дарозтарини пушти букқачаҳо ($\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$)

Нишондиҳандаҳо	Воҳиди ченак	Група, ($\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$)		
		I	II	III
Намнокӣ умумӣ	%	69,32±1,97	69,12±1,87	69,53±0,49
Моддаи хушк	%	29.68	30.88	30,47±0,24
Равған	%	8,7±0,33	7,88±0,33	8,95±0,13
Сафеда	%	21,1±0,79	21,81±0,50	20,51±0,54
Таносуби сафеда ба рағған		2,43:1	2,77:1	2,29:1
Хокистар	%	0,93±0,01	0,95±0,02	1,01±0,02
Арзиши энергитики	Мҷ	6.83	6.86	7.01
Калсий	мг%	6,00	0,13 ± 0,04	0,10±0,002
Фосфор	мг%	2,85±0,16	3,10±0,48	2,88±0,32

Маълумоти ҷадвали 3.21 нишон медиҳад, ки дар мушаки дарозтарини пушт сатҳи намӣ ва сафеда нисбатан пасттар буда, моддаҳои хушк ва рағғани он назар ба таркиби химиявӣю гӯшти қима хеле зиёданд. Зимнан, арзиши энергетикӣю он дар чорвои типӣ тоҷикӣ 7,01 МД-ро ташкил дод, ки ин нисбат ба ҳамсолони дурага 2,19 фоиз ва зебумонанд 2,63 фоиз зиёд аст.

Аммо арзиши энергетикии гӯшти беустухони тамоми танаи букқачаҳои таҷрибавии типи тоҷикӣ ва нишондодҳои онҳо назар ба чорвои маҳаллӣ баландтар буд.

Ҳамин тавр, таҳлили маълумотҳои маҳсулнокии гӯшти букқачаҳои таҷрибавӣ нишон медиҳад, ки букқачаҳои чорвои сергӯшти типи тоҷикӣ аз ҳамсолони дурагаи худ ва чорвои маҳаллӣ бартарӣ дошта, дараҷаи сифатҳои индивидуалӣ аз ҷиҳати маҳсулнокии гӯшт дар шароити баландкӯҳ имконият дод, ки маҳсулнокии баланди гӯшти чорворо ба даст оварад.

Дар генотипҳои таҳқиқшудаи чорво нишондиҳандаҳои мутлақ ва нисбии узвҳои дохилӣ омӯхта шуданд. Таҳлили ин маълумотҳо нишон медиҳад, ки букқачаҳои ҳамаи гурӯҳҳо мӯътадил инкишоф ёфтаанд.

Истеъмоли хӯроки чорво ба ҳар воҳиди гӯшти букқачаҳо дар як сол барои чорвои маҳаллӣ назар ба ҳамсолони онҳо дар гурӯҳҳои таҷрибавии II ва III каме кам шуд. Аммо афзоиши вазни зиндаи букқачаҳои маҳаллӣ хеле паст буд, ки ин маҳсулоти кам додани онҳоро муайян кард.

Константаҳои физикию химиявии равғани чорво нишон доданд, ки ба равғани назди гурда нуқтаи обшавии нисбатан паст ва миқдори ками йод хос аст.

Омӯзиши таркиби химиявӣ ва хосиятҳои физикии равғани дохилии чорвои калони шохдор барои сифати гӯштӣ аҳамияти калон дорад. Раған нафақат барои мазза, сифати гӯшт, саноати гӯшт ва соҳаи илм доир ба хӯрокворӣ, балки ба хосиятҳои технологӣ, арзиши энергетикӣ ва ба коркард мувофиқат менамояд, аҳамияти калон дорад.

Мақсади асосии корҳои илмию тадқиқотӣ ин муайян намудани паҳншавии рағани дохилӣ, таркиби химиявӣ, хосиятҳои физикии раған ва фарқияти онҳо дар таркиби рағани букқачаҳои таҷрибавию назоратӣ мебошад.

Натиҷаи омӯзиши рағани дохилии букқачаҳо дар ҷадвали 3.22. оварда шудааст.

Чадвали 3.22. - Таркиби химиявӣ ва хосиятҳои физикии рағани дохилии буккаҷаҳо

Нишондод	Воҳиди ченак	Гурӯҳ, ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)		
		I	II	III
Намҳои умумӣ	%	9,48 ± 1,12	8,54 ± 0,71	9,34 ± 0,12
Моддаи хушк	%	99,52 ± 0,31	91,46 ± 0,37	90,66 ± 0,54
Раған	%	86,90 ± 1,09	87,78 ± 0,72	87,69 ± 0,51
Сафеда	%	3,49 ± 0,11	3,59 ± 0,02	2,65 ± 0,22
Таносуби раған ба сафеда	%	24,90:1	24,45:1	33,1:1
Ҳокистар	%	0,13 ± 0,01	0,19 ± 0,01	0,32 ± 0,04
Ҳарорати обшавӣ	°C	48.5	48.3	48.6

Чӣ хеле, ки аз нишондодҳои ҷадвал бармеояд, намии умумӣ дар буккаҷаҳои гурӯҳи II, нисбатан паст буда, 8,54% - ро ташкил намуд, ки ин консистенсияи зичии бофтаҳои рағанро нишон медиҳад. Миқдори максималии намай дар буккаҷаҳои гурӯҳи I - 9,48% ба қайд гирифта шуда, дар гурӯҳи II бошад, ин нишондод 9,34 %-ро ташкил намуд.

Мутаносибан, миқдори зиёди моддаҳои хушк дар гурӯҳи I - 99,52 %-ро ташкил намуд, ки ин метавонад аз сабаби паст будани миқдори пайвастаҳои берағанӣ бошад.

Аз рӯи ин нишондод буккаҷаҳои гурӯҳи I нисбат ба гурӯҳи III ба миқдори 8,86% ва нисбат ба гурӯҳи II -8,06 % бартарӣ дошт.

Инчунин таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки фарқияти раған дар байни гурӯҳҳо на он қадар баланд аст, лекин миқдори нисбатан баланди раған дар буккаҷаҳои гурӯҳи II -87,78% -ро ташкил намуд. Ин нишондод мутаносибан дар гурӯҳи III – 87,69% ва дар гурӯҳи I - 86,90% буд.

Миқдори нисбатан баланди сафеда, дар буккаҷаҳои гурӯҳи II - 3,59%-ро ташкил намуд ва он дар буккаҷаҳои гурӯҳи I -3,49% ва миқдори нисбатан ками сафеда дар гурӯҳи III -2,65% муайян карда шудааст.

Таносуби раған бо сафеда бошад, дар буккаҷаҳои гурӯҳи III -33,1:1 буда, дар он миқдори ками сафеда мавҷуд аст ва ин нишон медиҳад, ки таносуби раған нисбатан баланд буда, мумкин аст ин дар коркарди технологӣ беҳтар бошад.

Миқдори ками хокистар дар букқачаҳои гурӯҳи I мушоҳида карда шуд, ки он 0,13% буда, миқдори зиёди он дар букқачаҳои гурӯҳи III муайян карда шудааст, ки ин нишондод аз зиёд будани боқимондаи моддаҳои минералӣ, шаҳодат медиҳад.

Ҳарорати обшавии равған дар ҳама гурӯҳҳо қариб якхелаанд, ки аз 48,3 °C (гурӯҳи II) то 48,6 °C (гурӯҳи III) мебошад.

Ҳамин тариқ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ба букқачаҳои гурӯҳи II миқдори баланди равған ва сафеда, инчунин миқдори минималии намӣ, дар букқачаҳои гурӯҳи III миқдори нисбатан баланди таносуби равған ба сафеда ва хокистар, ба букқачаҳои гурӯҳи I бошад, намнокӣ ва таркиби моддаҳои хушк хос буд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки равғани дохилии букқачаҳои таҷрибавию назоратӣ ҳамчун таҳлили биокимиёвии устувор ва барои истеъмол (махсусан дар гурӯҳҳои II ва III) мутобиқ мебошанд.

Миқдор ва тақсимоти равған дар организми чорвои калони шохдор нафақат ба сифати гӯшт, хусусиятҳои кулинарӣ, балки ба арзиши иқтисодии он таъсири калон мерасонад. Муайян намудани таносуби равған дар тана ва равғани дохилии чорво имконият медиҳад, ки ба ҳолати физиологӣ ва хусусиятҳои фарбеҳшавии чорво баҳо диҳад.

Натиҷаи омӯзиши муқоисавии равғани дохилии 3 гурӯҳи букқачаҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ дар ҷадвали 3.23 оварда шудааст.

Ҷадвали 3.23. - Тақсимоти равған дар бадани букқачаҳои 20-моҳа

Нишондодҳо	Воҳиди ченак	Гурӯҳ, $\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$		
		I	II	III
Равғани тана	кг	9,50 ± 0,13	11,96 ± 0,36	15,52 ± 0,34
	%	46,04	29,22	58,08
Равғани дохилӣ	кг	11,13 ± 0,74	18,0 ± 1,02	11,20 ± 0,68
	%	53,96	70,77	41,92
Ҳамагӣ:	кг	20,63 ± 0,81	29,96 ± 1,06	26,72 ± 0,78
	%	100	100	100
Ба ҳисоби % ба вазни зиндаи пеш аз забҳшуда:				
Равғани тана		3,02	3,15	4,00
Равғани дохилӣ		3,54	4,74	2,88
Равғани умумӣ		6,55	7,88	6,89

Аз нишондодҳои ҷадвали 3.23. бармеояд, ки вазни мутлақи равған дар танаи букқачаҳои гурӯҳи III -15,52 кг, ки 58,08%-и миқдори умумии равғани дар организм бударо ташкил медиҳад. Дар гурӯҳи II ин нишондиҳандаи нисбатан

пастар - 11,96 кг (29,22%) ва дар гурӯҳи I - 9,50 кг (46,04%) буд. Ҳамин тариқ, дар букқачаҳои гурӯҳи III таҳшиншавии рағған дар пӯст ва байни мушакҳо ба амал меояд, ки ба мармарию ва тамъи гӯшт таъсир мерасонад.

Вазни зиёди мутлақ ва нисбии рағғани дохилӣ дар гурӯҳи II - 18,0 кг буда, аз миқдори умумии рағған 70,77%, дар гурӯҳҳои I ва III бошад, мутаносибан, - 11,13 кг (53,96%) ва 11,20 кг (41,92%)-ро ташкил намуданд. Ин нишон медиҳад, ки тенденсияи паҳншаваии рағған дар букқачаҳои гурӯҳи II, аз ҳолати физиологӣ ва шароити ҳӯронидани онҳо вобаста аст.

Миқдори умумии рағған дар организми букқачаҳои гурӯҳи II - 29,96 кг, гурӯҳи III - 26,72 кг ва дар гурӯҳи I - 20,63 кг-ро ташкил намуданд, ки ин нишондод дар букқачаҳои гурӯҳи II нисбат ба ҳамсолон, паҳншавии рағған зиёдтар буда, ин интенсивнокии фарбеҳшудани букқачаҳоро нишон медиҳад.

Нисбатан баландтарин вазни хоси рағғани тана, ба ҳисоби вазни зиндаи пеш аз забҳшуда, дар букқачаҳои гурӯҳи III - 4,00 %, дар гурӯҳҳои I ва II мутаносибан - 3,02 ва 3,15%-ро ташкил намуд.

Вазни рағғани дохилӣ бошад, нисбатан баланд дар букқачаҳои гурӯҳи II - 4,74 % ва нисбатан пастар дар гурӯҳи III - 2,88% мебошад. Миқдори рағғани умумӣ ба ҳисоби % ба вазни зиндаи пеш аз забҳшуда: нисбатан баландтар дар букқачаҳои гурӯҳи II - 7,88 %, гурӯҳи III - 6,89 ва нисбатан паст дар гурӯҳи I - 6,55% мушоҳида карда шудааст.

Ҳамин тариқ муайян карда мешавад, ки тақсимооти рағған дар бадани букқачаҳои 20-моҳа нисбат ба вазни зинда, дар букқачаҳои гурӯҳи II мебошад, ки ба онҳо вазни баландтари рағғани дохилӣ хос мебошад, дар гурӯҳи III миқдори нисбатан баландтари рағған дар тана мавҷуд аст, ки ин ба хусусиятҳои тичоратии гӯшт таъсири мусбӣ мерасонад. Дар букқачаҳои гурӯҳи I бошад, дар ҳамаи таҳлили нишондиҳандаҳои бадастомада мавқеи миёнаро ишғол менамояд.

3.8.3. Арзиши энергетикӣ маҳсулоти асосии гӯштӣ

Арзиши энергетикӣ асосан аз рӯи сифати гӯшт ва аз таркиби рағған вобаста буда, дар он назар ба сафедаҳо ва карбогидратҳо энергия бештар

захира карда мешавад. Арзиши энергетикӣ дар асоси маълумоти таҳлили химиявии маҳсулоти забҳшуда ҳисоб карда шуд (ҷадвали 3.24).

Аз маълумоти ҷадвали 3.24. бармеояд, ки аз ҷиҳати арзиши энергетикӣ нишондиҳандаҳои таҳқиқшуда дар 1 кг гӯшти лаҳм дар байни букқачаҳои генотипҳои гуногун амалан тафовути ҷиддӣ ба назар намерасид, гарчанде умуман арзиши энергетикӣ гӯшти лаҳм дар чорвои калони сергӯшти типӣ тоҷикӣ ва баъд аз онҳо дурагаҳо нисбат ба ҳамсолони чорвои маҳаллӣ хеле зиёд буд.

Бо вучуди ин, арзиши энергетикӣ 1 кг гӯшти лаҳми танаи букқачаҳои гурӯҳи III - 7,01 МҶ ва гурӯҳи II - 6,86 МҶ ташкил дода, назар ба ҳамсолони чорвои маҳаллӣ (6,83) баландтар буд.

Ҷадвали 3.24. - Арзиши энергетикӣ маҳсулоти забҳи букқачаҳо, МҶ

Нишондод	Гурӯҳ, ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)		
	I	II	III
1 кг гӯшти лаҳми тана	6.83	6.86	7.01
Гӯшти лаҳми умумии тана	852.28	1025.29	1129.73
1 кг рағани дохилӣ	34.56	36.01	33.50
Рағани умумии дохилӣ	383.54	648.18	375.2
Гӯшти лаҳми тана бо рағани дохилӣ	1235.72	1673.47	1504.99
Гӯшти лаҳми тана бо чарбу ба 100 кг вазни зиндаи пеш аз забҳ	392.70	440.39	387.88

Арзиши энергетикӣ маҳсулоти забҳшуда дар маҷмӯъ дар гӯшти лаҳми умумии тана дар букқачаҳои гурӯҳи III (1129,73) нисбат ба гурӯҳҳои I ва II мутаносибан ба миқдори 277,45 ва 104,44 МҶ зиёд буд.

Дар букқачаҳои гурӯҳи II дар 1 кг рағани дохилӣ - 36,01 МҶ ва дар гурӯҳи I - 34,56 МҶ, дар гурӯҳи III бошад, нисбатан камтар - 33,50 МҶ-ро ташкил намуд.

Гӯшти лаҳми тана бо рағани дохилӣ нисбатан зиёд дар букқачаҳои гурӯҳи II муайян кард шуд, ки он -1673,47 МҶ-ро ташкил менамояд.

Гӯшти лаҳми тана бо чарбу бошад, ба 100 кг вазни зиндаи пеш аз забҳ дар букқачаҳои гурӯҳи II муайян кард шуд (440,39 МҶ).

Ҳамин тариқ, арзиши энергетикӣи гӯшти лаҳми танаи умумии буққачаҳои таҷрибавӣи типӣи тоҷикӣ ва дурағаҳои онҳо назар ба ҳамсолони чорвои маҳаллӣ баландтар буд.

Тавсифи моддаҳои ғизоӣи маҳсулоти забҳӣ қисми истеъмолии танаи буққачаҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ бо арзиши энергетикӣ муайян карда мешавад, ки натиҷаи он дар ҷадвали 3.25. нишон дода шудааст.

Чуноне, ки маълумотҳои ҷадвали 3.25. нишон медиҳад, арзиши энергетикӣи қисми гӯшти танаи буққачаҳои гурӯҳҳо хеле баланд буданд.

Аз нишондодҳои ҷадвал маълум мегардад, ки вазни зиндаи пеш аз забҳ дар буққачаҳои гурӯҳи III (388,0 кг) нисбат ба гурӯҳи I (314,67 кг) ба миқдори 74 кг ва нисбат ба гурӯҳи II (380,0 кг) ба миқдори 8 кг бартари дошт.

Ҷадвали 3.25.- Миқдори моддаҳои ғизоӣ дар қисми истеъмолии тана ва арзиши энергетикӣи он дар буққачаҳои 20-моҳа

Нишондод		Гурӯҳ, ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)		
		I	II	III
Вазни зиндаи пеш аз забҳ, кг		314,67	380,0	388,0
Миқдори дар тана мавҷуд буда, кг	сафеда	26.26	32.60	33.05
	равған	10.85	11.78	14.42
Миқдор дар як кг, вазни зинда, %	сафеда	83	86	85
	равған	34	31	37
Арзиши энергетикӣ, МҶ				
Ҳамагӣ дар тана		852,18	1025,29	1129,0
Ба 1 кг вазни зинда		2,71	2,70	2,91

Миқдори нисбатан зиёди сафеда дар танаи буққачаҳои гурӯҳи III - 33,05 % буда, ин нишондод дар гурӯҳҳои II ва I нисбатан пастар - 32,60 ва 26,26 %-ро ташкил намуд.

Миқдори равған бошад, дар танаи буққачаҳои гурӯҳи III - 14,42 кг буда, нисбат ба танаи буққачаҳои гурӯҳҳои I ва II мутаносибан ба миқдори 3,75 кг ва 2,64 кг бартарӣ дошт.

Инчунин, дар 1 кг вазни зиндаи буққачаҳо миқдори сафеда дар гурӯҳи II – 86,0 %, гурӯҳи III – 85,0 % ва дар буққачаҳои гурӯҳи I нисбатан камтар буда, 83,0 %-ро ташкил намуд. Миқдори равған бошад, дар 1 кг вазни зиндаи буққачаҳои гурӯҳи III - 37,0% буда, дар гурӯҳи I - 34% ва миқдори нисбатан ками равған дар буққачаҳои гурӯҳи II - 31% -ро ташкил намуд.

Арзиши энергетикӣ дар танаи букқачаҳои гурӯҳи III - 1129,0 МҶ ё ин ки ба 1кг вазни зинда 2,91МҶ баробар буда, ин нишондод дар букқачаҳои гурӯҳи II -1025,29 МҶ (2,70) ва миқдори нисбатан ками он дар букқачаҳои гурӯҳи I - 852,18 (2,71) муайян карда шудааст.

Ҳамин тариқ аз таҳлили ин нишондодҳо маълум мегардад, ки миқдори моддаҳои ғизоӣ дар қисми истеъмолии ғуштии тана (миқдори сафеда ва рағбан) ва арзиши энергетикӣ дар букқачаҳои гурӯҳи III зиёд буда, доир ба ин нишондодоҳо нисбат ба ҳамсолони дурага ва маҳаллӣ, бартарӣ доштанд.

3.8.4. Баромад ва рушди узвҳои дохилии букқачаҳо

Аҳамияти амалии омӯзиши баромад ва рушди узвҳои дохилии букқачаҳо аз он иборат аст, ки андозаи маҳсулоти иловагӣ, асосан арзиши онҳо, сифати тиҷоратӣ ва инчунин ҷамъшавии мубодилаи моддаҳоро дар организми чорво муайян менамояд.

Корҳои илмию тадқиқотӣ доир ба омӯзиши рушди ва вазни узвҳои дохилии букқачаҳои таҷрибавию назоратӣ ва категорияи онҳо омӯхта шуданд. (ҷадвали 3.26.).

Чӣ хеле, ки дар ҷадвал 3.26. нишон дода шудааст, ба категорияи I вазни узвҳои дарунии букқачаҳо: чигар, гурдаҳо, забон, дил, диафрагма ва дум дохил мешаванд, ки ин нишондодҳо дар букқачаҳои гурӯҳи III нисбат ба гурӯҳҳои I ва II зиёдтар буда 12,27 кг-ро ташкил намудааст ва аз ҳисоби вазни зиндаи пеш аз забҳ - 3,16%-ро ташкил дод, ки ин нишондодҳо дар букқачаҳои гурӯҳҳои I ва II мутаносибан 10,45 кг (3,32%) ва 11,69 кг (3,07%) буданд.

Чигар. Вазни нисбатан калони чигар дар букқачаҳои гурӯҳи III -5,90 кг буда, вазни нисбатан пасттари он дар букқачаҳои гурӯҳи I - 4,60 кг муайян карда шуд.

Гурдаҳо. Вазни гурдаҳои букқачаҳои гурӯҳи III 1,20 кг-ро ташкил намуда, аз ҳамсолони гурӯҳи I ба миқдори 0,55 кг (48,8%) ва нисбат ба гурӯҳи букқачаҳои гурӯҳи II ба миқдори 0,23 кг (19,2%) бартарӣ дошт.

Дил. Чӣ хеле, ки маълум аст, вазифаи асосии дил аз фаъолияти матории он иборат аст. Аз таҳлилҳо маълум гардид, ки вазни дил дар букқачаҳои таҷрибавию

назоратӣ яхела набуданд. Вазни нисбатан баланди дил дар гурӯҳи III - 1,47 кг ва нисбатан пасттар дар буккачаҳои гурӯҳи I -1,18 кг муайян карда шудааст.

Ҷадвали 3.26. - Вазни мутлақи узвҳои дохилии буккачаҳо, кг

Нишондод	Гурӯҳ, ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)		
	I	II	III
Категорияи I			
Вазни зиндаи пеш аз забҳ, кг	314,67 $\pm$ 6,11	380,0 $\pm$ 4,24	388,20 $\pm$ 3,78
Чигар, кг	4,60 $\pm$ 0,08	5,22 $\pm$ 0,06	5,90 $\pm$ 0,05
Гурдаҳо, кг	0,65 $\pm$ 0,02	0,97 $\pm$ 0,03	1,20 $\pm$ 0,05
Забон, кг	2,10 $\pm$ 0,12	1,78 $\pm$ 0,08	1,23 $\pm$ 0,03
Дил, кг	1,18 $\pm$ 0,07	1,44 $\pm$ 0,04	1,47 $\pm$ 0,02
Диафрагма, кг	1,37 $\pm$ 0,03	1,45 $\pm$ 0,08	1,47 $\pm$ 0,10
Дум, кг	0,58 $\pm$ 0,04	0,83 $\pm$ 0,03	1,00 $\pm$ 0,05
Ҳамагӣ маҳсулоти иловагии категорияи I, кг	10,45 $\pm$ 0,78	11,69 $\pm$ 0,43	12,27 $\pm$ 0,53
Ба % ҳисоби вазни зиндаи пеш аз забҳ	3,32	3,07	3,16
Категорияи II			
Ишкамба, кг (рубел)	6,98 $\pm$ 0,12	6,63 $\pm$ 0,31	6,97 $\pm$ 0,40
Ҳазорхона	3,05 $\pm$ 0,10	3,00 $\pm$ 0,06	3,07 $\pm$ 0,10
Турмеъда, кг	1,02 $\pm$ 0,03	1,08 $\pm$ 0,04	1,00 $\pm$ 0,05
Ширдон	1,17 $\pm$ 0,03	1,22 $\pm$ 0,06	1,20 $\pm$ 0,08
Испурч, кг	0,75 $\pm$ 0,02	1,12 $\pm$ 0,04	1,53 $\pm$ 0,05
Шуш бо хирной, кг	2,50 $\pm$ 0,05	2,82 $\pm$ 0,15	3,53 $\pm$ 0,10
Калла, кг	17,93 $\pm$ 0,99	19,43 $\pm$ 0,57	22,9 $\pm$ 0,48
Пойҳо, кг	6,63 $\pm$ 0,03	6,89 $\pm$ 0,12	8,04 $\pm$ 0,16
Ҳамагӣ маҳсулоти иловагии категорияи II, кг	40,04 $\pm$ 0,13	42,19 $\pm$ 0,88	48,24 $\pm$ 0,33
Ба % ҳисоби вазни зиндаи пеш аз гӯшт супурда шуда	12,72	11,10	12,43

Диафрагма. Вазни нисбатан баландтари диафрагма дар буккачаҳои гурӯҳи гурӯҳи III, ки 1,47 кг буда, вазни нисбатан пасттар он дар буккачаҳои гурӯҳи I -1,37 кг мушоҳида карда мешавад.

Ба нишондиҳандаҳои категорияи II бошад, чунин нишондодҳо : ишкамба, ҳазорхона, турмеъда, ширдон, рӯдаҳо, испурч, шуш бо хирной, калла ва пойҳо дохил мешаванд, ин нишондодҳо дар буккачаҳои гурӯҳи III нисбат ба гурӯҳҳои I ва II вазнинтар буда, ҳамагӣ 48,24 кг ва 12,43 %-и вазни пеш аз забҳро ташкил намуданд.

Дар ин нишондодҳои узвҳои дарунии буккачаҳои таҷрибавию назоратӣ фарқияти ҷиддӣ дида нашудааст.

Ишкамба. Чӣ хеле, ки аз нишондоди чадвал маълум мегардад, вазни ишкамба нисбат ба дигар узвҳои дарунии организаи букҷаҳо вазнинтар буда, дар букҷаҳои гурӯҳҳои таҷрибавию назоратӣ фарқияти кам дорад.

Масалан, вазни ишкамба дар букҷаҳои гурӯҳи I - 6,98 кг, гурӯҳи III - 6,97 ва дар гурӯҳи II бошад, нисбатан камтар буда, 6,63 кг-ро ташкил намуд.

Ҳазорхона. Дар байни букҷаҳои таҷрибавию назоратӣ дар вазни ҳазорхона фарқият ҷидди дида намешавад, ки дар букҷаҳои гурӯҳи I ин нишондод - 3,05 кг, гурӯҳи II - 3,00 кг ва дар гурӯҳи III бошад, 3,07 кг-ро ташкил намуд.

Шуш бо хирной. Шуш бо хирной ҳамчун узви нафаскашӣ ҳисобида шуда, вазни нисбатан зиёди он дар букҷаҳои гурӯҳи III - 3,53 кг-ро ташкил намуд ва нисбат ба гурӯҳҳои I ва II мутаносибан ба миқдори 1,03 кг ва 0,71 кг вазнинтар, мушоҳида карда мешавад.

Калла. Вазни калла дар букҷаҳои гурӯҳи III нисбатан вазнинтар буда, 22,9 кг-ро ташкил намуд, ки нисбат ба букҷаҳои гурӯҳи I - ба миқдори 21,07% ва гурӯҳи II ба миқдори 15,2% бартарӣ дошт.

Пойҳо. Нишондиҳандаҳои пойҳо бошад, вазни зиёд дар букҷаҳои гурӯҳи III - 8,04 кг ва вазни пасттар дар букҷаҳои гурӯҳи I - 6,63 кг муайян карда шуданд.

Ин маълумотҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки узвҳои асосии дохилӣ инкишофи мӯътадил доштанд ва дар айни замон дар ҷорҳои таҷрибавӣ баъзе тафовути генотипӣ муқаррар карда шудаанд.

Таҳлили узвҳои дарунӣ нишон медиҳад, ки букҷаҳои ҳамаи гурӯҳҳо инкишофи мӯътадили худро доштанд, ки ин фаъолияти қаноатбахши ҳаёт ва зӯхуроти генотипҳои потенциали генетикии хоси онҳоро барои маҳсулноки таъмин намуд.

3.9. Нишондиҳандаҳои миқдорию сифатии пӯст ва ҷарми тайёри букҷаҳо

3.9.1 Баҳодиҳии муқоисавии пӯсти букҷаҳои генотипҳои гуногун

Омӯختани хусусиятҳои пӯст ва нахи муйҳои ҷорҳои таҷрибавӣ дар шароити минтақаи баландкӯҳ мароқи калон дорад.

Хусусиятҳои чунин ҳосилаҳои пӯст, монанди оби бадан (рутубати, ғадудҳои равған ва болопӯши мӯй имкон медиҳанд, ки дараҷаи мутобиқшавии чорво дар шароити нави экологии парвариш, самаранокии ташкили ҷуфтикунонии байнизотии зотҳои гӯштии саноатӣ барои мустаҳкам намудани захираҳои гӯшт, зиёд намудани потенциали генетикии чорвои парваришбанда ва васеъ намудани онҳо хусусан дар минтақаҳои доманакӯҳ ва кӯҳсор муайян карда шавад (Д.М.Ахмедов, 2023; Х.Х.Рофизода ва дигарон 2023). Хусусиятҳои молию -технологии пусти букачаҳои генотипҳои гуногун дар ҷадвали 3. 27 оварда шудааст.

Ҷадвали 3.27. - Хусусиятҳои молию -технологии пусти букачаҳои генотипҳои гуногун

Нишондодҳо	Воҳиди ченак	Гурӯҳ		
		I	II	III
Вазни зиндаи пеш аз забҳ	кг	314,7±8,6	380,0±4,24	388,0±3,78
Вазни пӯсти намнок	кг	27,2±0,75	23,17±1,02	31,50±0,17
Баромади пӯст	%	8,65	6,10	7,60
Масоҳати умуми пӯст	дм²	245,8	290,4	334,0
Дарозии пӯст	м	1,60±0,01	1,76±0,04	1,91±0,02
Паҳноии пӯст	м	1,53±0,09	1,65±0,06	1,75±0,03
Ғафсӣ дар қабурғаҳо	мм	6,0±0,05	5,3±0,02	5,5±0,04
Ғафсӣ дар оринҷҳо	мм	4,0±0,02	3,6±0,03	3,8±0,01
Ғафсӣ дар кос	мм	6,2±0,06	6,0±0,03	6,4±0,01
Ғафсии миёна	мм	5,40	4,97	5,21

Дар баробари ин, хусусиятҳои гистологии мӯйҳои букачаҳои типҳои тоҷикӣ, дурагаҳо ва маҳаллӣ омӯхта шуданд. Маълумот дар бораи гистоструктураи пӯсти букачаҳои таҷрибавӣ дар ҷадвали 3.28 оварда шудааст.

Ҷадвали 3.28. - Сохтори гистологии пӯсти букачаҳои таҷрибавӣ ($\bar{X} \pm S_{\bar{X}}$)

Гурӯҳ	Синну сол, моҳ	Ғафсии пӯст, мкм ($\bar{X} \pm S_{\bar{X}}$)			
		умумӣ, микрон	аз ҷумла		
			эпидермис	қабати пилярӣ	қабати ретикулярӣ
I	12	2835,1 ± 151,2	35,0 ± 1,70	1081,6 ± 72,5	1718,5 ± 78,9
	18	4692,7 ± 174,4	48,3 ± 1,53	1316,7 ± 114,5	3327,7 ± 155,5
II	12	2881,7 ± 189,4	41,7 ± 6,12	1120,0 ± 195,6	1720,0 ± 86,3
	18	4732,9 ± 210,3	47,9 ± 4,10	1290,0 ± 149,4	3395,0 ± 73,4
III	12	2876,0 ± 312,0	33,6 ± 5,72	1199,5 ± 292,2	1642,9 ± 77,9
	18	4868,4 ± 240,0	47,9 ± 3,63	1242,7 ± 214,6	3577,8 ± 92,8

Дар синни 12-моҳагӣ ғафсии пӯсти умумӣ дар букқачаҳои гурӯҳи III - 2835,1 мкм, дар гурӯҳи II - 2881,7 ва дар гурӯҳи III бошад, 2876,0 мкм - ро ташкил намуданд. Дар синни 20-моҳагӣ зиёд шудани ғафсии пӯст дар букқачаҳои гурӯҳи I ба миқдори 1857,6 мкм ё ин ки 39,6%, дар гурӯҳи II - 1851,2 мкм (39,1%) ва гурӯҳи III - 1992,4 (40,9%) рост омад.

Инчунин нисбатан ғафсии пӯсти эпидермисӣ ва пилярӣ дар гурӯҳи I дар синни 20-моҳагӣ муайян карда шуд, ки онҳо - 48,3 мкм ва 1316,7 мкм-ро ташкил доданд, қабати ретикулярӣ бошад, дар синни 20-моҳагӣ - 3577,8 мкм-ро ташкил намуд.

Дар механизми терморегуляция дар баробари пӯст аппарати ғадудҳо ва хати мӯй нақши ҳалқунанда мебозанд (Қадвали 3.29).

Қадвали 3.29 - Хусусиятҳои инкишофи аппарати ғадудҳои пӯсти букқачаҳои таҷрибавӣ, ($\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$)

Гено-тип	Синну сол, моҳ	Ғадудҳои ихроҷи оби бадан (арақ)			Ғадудҳои ихроҷи рағғани бадан		
		миқдор, ба 1 мм ²	амиқ	диаметр	миқдор, ба 1 мм ²	амиқ	диаметр
I	12	25,8 ± 0,89	741,3 ± 106,9	76,3 ± 8,57	28,5 ± 0,91	433,7 ± 25,9	65,1 ± 3,92
	18	23,3 ± 2,34	151,6 ± 64,8	96,1 ± 1,13	22,7 ± 0,90	520,1 ± 23,3	80,1 ± 0,42
II	12	23,4 ± 1,75	1001,0 ± 75,2	80,0 ± 9,52	23,1 ± 0,40	550,0 ± 87,3	61,2 ± 8,60
	18	23,3 ± 1,87	1170,1 ± 37,0	105 ± 9,30	24,0 ± 0,50	489,1 ± 32,4	83,1 ± 6,30
III	12	23,9 ± 1,58	1019,1 ± 80,9	83,0 ± 11,71	24,9 ± 2,66	609,2 ± 113,3	63,3 ± 7,62
	18	23,1 ± 1,89	1171,0 ± 16,2	110,6 ± 12,80	25,0 ± 0,56	556,5 ± 47,7	85,7 ± 7,50

Дар букқачаҳои типии тоҷикӣ дар синни 12-моҳагӣ, дар 1 мм² майдон миқдори ғадуди ихроҷи оби бадан 25,8 қайд карда шуд, дар ҳоле ки дар чорвои маҳаллӣ 23,9 ва дар дурага 23,4 буд.

Ҳолати шабех дар ин давра дар онҳо аз рӯи миқдори ғадудҳои рағған мушоҳида мешавад (гурӯҳи II - 23,1; гурӯҳи III - 24,9), аммо дар синни 18-моҳагӣ фарқияти назаррас дар байни гурӯҳҳо муқаррар карда нашуда, фарқияти мавҷуда аз ҷиҳати омӯрӣ эътимоднок нест.

Аён аст, ки ба гармӣ тобоварӣ ва терморегулятсияи чорво ба ғайр аз

микдори ғадудҳои зиёд дар як воҳиди майдон ба фаъолияти онҳо хеле таъсири зиёд мерасонад. Дар баробари ин, дар байни чорвоҳои хусусан гурӯҳҳои I ва III аз ҷиҳати микдор ва сохтори мӯйҳо тафовут мавҷуд аст (ҷадвали 3. 30).

Муайян карда шуд, ки зичии мӯй дар ҷавонаҳо назар ба чорвои калон хеле зиёд аст. Букчаҳои 12-моҳаи типии тоҷикӣ дар ҳар воҳиди сатҳи пӯст назар ба ҳамсолони маҳаллии худ 254 дона зиёд пашм доштанд ва то 18-моҳагӣ, ки ба фасли тобистон рост омад, дар букчаҳои ҳар се гурӯҳ зичии мӯй кам шуд.

Ҷадвали 3.30 -Хусусиятҳои муқоисавии нахи мӯйи букчаҳои таҷрибавӣ

Нишондод	Гурӯҳ, синну сол ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)					
	I		II		III	
Синну сол, моҳ	12	18	12	18	12	18
Микдори мӯйҳо дар 1 см ² масоҳати пӯст, дона	1907 ± 98,1	16,18 ± 273,8	1800 ± 260,4	1600 ± 160,4	1653 ± 221,4	16,31 ± 158,7
Вазни мӯй аз 1 см ² масоҳати пӯст, мг	109,3 ± 7,3	17,6 ± 4,2	93,4 ± 8,4	26 ± 3,71	44,5 ± 9,2	30,1 ± 1,55
Дарозии миёнаи мӯй, см	4,07 ± 0,22	1,27 ± 0,46	3,08 ± 0,35	1,40 ± 0,10	2,41 ± 0,4	1,50 ± 0,12
Ғафсии мӯй, микрон:						
Тибит	19,43 ± 0,69	31,35 ± 0,66	18,60 ± 1,10	32,35 ± 1,10	18,5 ± 1,38	33,0 ± 1,32
Гузаранда	29,13 ± 1,27	49,85 ± 0,63	28,4 ± 0,35	48,1 ± 3,10	27,9 ± 0,65	47,1 ± 3,42
Қил	61,7 ± 5,60	73,95 ± 1,50	58,6 ± 6,10	74,6 ± 2,10	57,4 ± 5,67	75,3 ± 3,26
Ба ҳисоби миёна	36,76 ± 1,83	52,7 ± 0,80	35,2 ± 1,95	51,7 ± 1,84	34,6 ± 2,19	51,8 ± 1,93
Таркиби мӯй, %						
Тибит	48,0 ± 11,2	15,7 ± 8,8	51,0 ± 6,85	10,0 ± 6,40	52,3 ± 6,9	8,3 ± 2,27
Гузаранда	23,3 ± 16,8	37,7 ± 8,9	23,9 ± 7,95	33,5 ± 7,90	24,7 ± 3,56	28,7 ± 6,6
Қил	28,7 ± 5,75	46,6 ± 14,2	25,1 ± 4,93	56,5 ± 4,8	23,0 ± 3,67	63,0 ± 4,3

Муайян карда шуд, ки зичии мӯй дар ҷавонаҳо назар ба чорвои калон хеле зиёд аст. Букчаҳои 12-моҳаи типии тоҷикӣ дар ҳар воҳиди сатҳи пӯст назар ба ҳамсолони маҳаллии худ 254 дона зиёд пашм доштанд ва то 18-моҳагӣ, ки ба фасли тобистон рост омад, дар букчаҳои ҳар се гурӯҳ зичии мӯй кам шуд.

Хос аст, ки зичии мӯй дар букқачаҳои гурӯҳи II дар синни 12-моҳагӣ нисбат ба букқачаҳои гурӯҳи I- 107 адат кам ва нисбат ба гурӯҳи III- 14,7 адат зиёд буд.

Одатан, ҳаҷми мӯй аз зичии он камтар муҳим аст, аммо ҳангоми омӯзиши ин нишондод дар якҷоягӣ бо дигарон, мо ба тавсифи умумии тағйирёбии хати мӯй илова ба даст овардем.

Бояд қайд кард, ки вазни мӯй аз дарозии онҳо вобаста аст. Зиёда аз он, ин нишондиҳандаҳо дар фасли зимистон дар чорво назар ба тобистон зиёданд.

Масалан, массаи муй дар 1 см² майдони пӯсти букқачаҳои 12-моҳаи типии тоҷикӣ 91,7 мг ва дарозии миёнаи онҳо назар ба 18-моҳа мутаносибан 2,8 см ($P > 0,999$) зиёд буда, дар чорвои маҳаллӣ ин фарқият 14,4 мг ($P < 0,95$) ва 0,91 см ($P > 0,95$) буданд.

Дар букқачаҳои дурага дар ин давра вазни муйҳо аз 67,4 мг ва дарозии онҳо низ аз 1,68 миллиметр зиёд шуд. Мо ҳам баъзе фарқияти байни зотҳоро ёфтем.

Ба воҳиди майдон массаи мӯй дар синни 12-моҳагӣ дар чорвои типии тоҷикӣ 109,3 мг, дар дурага 93,4 ва дар маҳаллӣ ҳамагӣ 44,5 мг-ро ташкил дод, ки ин назар ба ду гурӯҳи аввал хеле кам аст ва дар 18-моҳагӣ нисбат ба 12-моҳагӣ он хеле кам шуд.

Дар ин давра массаи муйҳо дар гурӯҳи I 6,2 баробар, дар гурӯҳи II — 2,6 баробар ва дар гурӯҳи III 1,5 баробар кам шудааст. Илова бар ин, дар ин давраҳои синну сол тақрибан якхела дар арзишҳои дарозии миёнаи мӯй дар чорвои таҷрибавӣ ба амал омаданд.

Бояд гуфт, ки вазни миёнаи мӯй дар 1 см² майдони пӯсти букқачаҳои 8-моҳаи типии тоҷикӣ 64,8 мг ($P > 0,999$) ва дарозии миёнаи онҳо 1,66 мм ($P > 0,99$) назар ба ҳамсолони чорвои маҳаллӣ зиёдтар, дар синни 18-моҳа бошад, баръакс, вазнаш 13,5 мг ($P > 0,95$) ва дарозияш 0,23 мм ($P > 0,95$) зиёд буд. $P < 0,95$).

Букқачаҳои типии тоҷикӣ аз рӯи вазни миёна ва дарозии мӯй дар

байни дурага ва чорвои маҳаллӣ дар синни 12 ва 18-моҳагӣ баҳои миёна доштанд. Аз ин рӯ, ба назари мо, метавон хулоса кард, ки чорвои типи тоҷикӣ дар натиҷаи интиҳоби дарозмуддати табиӣ ва сунъӣ ба ташаккули механизми мураккаб ва фарқкунандаи муҳофизати пӯст ва мӯй ба сарфи сарфакоронаи энергияи онҳо дар натиҷаи тағйир ёфтани шароити муҳити зист мусоидат кардааст.

Ин тип қодир аст, ки сифатҳои пурқимати хоҷагидорӣ ва биологиро ба насл бо роҳи дурагакунии байнизотӣ гузошта, дар минтақаҳои экстремалӣ парвариш ёфта, имкон медиҳад генофонди чорвои маҳаллии каммаҳсул беҳтар карда шавад. Дар гурӯҳҳои тадқиқшудаи чорво ҳангоми мӯйивазшавии баҳорӣ (охири моҳи май ва аввали июн) зиччӣ ва дарозии мӯйҳо хеле кам шуда, бо фарорасии зимистон онҳо зиёд шуданд.

Хусусият дар он аст, ки дар букқачаҳо сохтори мӯй вобаста ба фаслҳо тағйир меёфт, дар зимистон тибит, дар тобистону тирамоҳ қил бартарӣ доштанд. Сарфи назар аз он, ки онҳо дар зимистон дар майдончаи сайру гашт нигоҳ дошта мешуданд, афзоиш ва инкишофи онҳо хусусан дар чорвои гурӯҳҳои I ва II назаррас буд. Охирин, ки қобилияти баланди чунин ҳосилаҳои пӯст, ба монанди таркиби хуби болопӯши мӯй доранд, ба шароити ҳоси хоку-иклим ва чарогоҳу ҳӯрокиҳои минтақаи экологии миёнакуҳ ва баландкӯҳ мутобиқ шуданд.

Дар баробари омӯختани сифатҳои маҳсулнокии букқачаҳои типи тоҷикӣ ва дурага хусусиятҳои молию технологияи пӯст ва чарми аз онҳо истехсол кардашударо барои тағ (падош) ва болои пойафзол омӯхтем. Хусусиятҳои пӯсти буғшудаи букқачаҳо вобаста ба генотип дар чадвали 3.31 оварда шудаанд.

Таъсири генотип ба сифати ашёи хом ва чарми тайёр муқаррар карда шудааст. Пӯстҳое, ки ҳангоми забҳи назоратии букқачаҳо дар синни 20-моҳагӣ гирифта шудаанд, барои таҳқиқот истифода шуданд. Баркашидан ва чен кардани пӯстҳо бевосита ҳангоми забҳ гузаронида мешуд. Мувофиқи ГОСТ 1010-78 барои пӯсти хом пӯсти букқачаҳои типи

точикӣ, дурага ва зебу ба категорияи «букқачагии вазнин» (вазнаш зиёда аз 25 килограмм) мувофиқ аст.

Ҷадвали 3.31. - Нишондиҳандаҳои хосиятҳои молии пӯсти букқачаҳо

Нишондодҳо	Воҳиди ченак	Гурӯҳ		
		I	II	III
Вазни зиндаи пеш аз забҳ	кг	314,7±8,6	380,0±4,24	388,0±3,78
Вазни пӯсти намнок	кг	27,2±0,75	23,17±1,02	31,50±0,17
Баромади пӯст	%	8,65	6,10	7,60
Масоҳати умуми пӯст	дм ²	245,8	290,4	334,0
Дарозии пӯст	м	1,60±0,01	1,76±0,04	1,91±0,02
Пахноии пӯст	м	1,53±0,09	1,65±0,06	1,75±0,03
Ғафсӣ дар қабурғаҳо	мм	6,0±0,05	5,3±0,02	5,5±0,04
Ғафсӣ дар оринҷҳо	мм	4,0±0,02	3,6±0,03	3,8±0,01
Ғафсӣ дар кос	мм	6,2±0,06	6,0±0,03	6,4±0,01
Ғафсӣ дар мобайн	мм	5,40	4,97	5,21

Вазни миёнаи пӯст вобаста ба генотип 30,40 32,33 килограмм буда, маҳсулнокии доираи 7,60 —7,97%-ро ташкил дод.

Фарқияти назаррасии массаи пӯст вобаста ба генотипи чорво муқаррар карда шуд. Пӯсти вазнинтаринро аз букқачаҳои дурага мегиранд. Ин бартарӣ нисбат ба гурӯҳи I 1,93 кг (6,35%) ва нисбат ба гурӯҳи III 0,83 (2,63%) буд. Пӯсти ҳамаи гурӯҳҳои омӯхташудаи букқачаҳо ба дараҷаи I тасниф карда шуданд.

Андозаи масоҳати пӯсти чорво дар стандарт пешбинӣ нашудааст ва бинобар ин, сатҳи пӯст чи тавре пӯсти гусфанд ва бӯз чен карда мешуд, ҳамон тавр бо зарб задани дарозии пӯст аз рӯи пахноии худ ҳисоб карда шуд. Ин барои масоҳати пӯстҳо арзиши анъанавӣ медиҳад ва маълумоти бадастомада ба мо имкон медиҳад, ки андозаи мураббаи онҳоро муайян кунем.

Арзиши пӯст дар шароити дигар ба масоҳати онҳо бевосита мутаносиб аст. Пораҳои аз пӯсти андозаашон калон гирифташуда ҳангоми буридан пурратар истифода мешаванд ва аз онҳо қисмҳои калонтар гирифтани мумкин аст.

Яке аз нишондихандаҳои муҳими арзиши молии пӯст майдони пӯсти аз онҳо гирифташуда мебошад. Гузашта аз ин, маълум мешавад, ки пӯсти таҳорӣ аз ғафсии пӯст ва якрангии майдони он вобаста аст.

Аз рӯи меъёрҳо масса ва майдони унсурҳои пӯст, зин, гиребон ва фаршро муқаррар мекунанд. Майдони пӯсти чорвои гурӯҳи II ва III амалан якхела буд ва онҳо аз ҳамсолони гурӯҳи I мутаносибан 0,61 дм² (20,75%) ва 0,40 (6,0%) зиёд буданд.

Қайд карда шудааст, ки бо як хел вазн ғафсии пӯст вобаста ба генотипи чорво хеле фарқ мекунад. Масалан, дар зебу бештар ғафсии пӯст дар кабурға ва сакрум буд ва бартарии онҳо нисбат ба ҳамсолони гурӯҳҳои I ва II мутаносибан 11,2 ва 5,0 ва 8,0 ва 6,1%-ро ташкил дод.

Дар байни гурӯҳҳои тадқиқшуда аз рӯи ин нишондихандаҳо буккачаҳои типӣ тоҷикӣ ғафсии аз ҳама хурдтар доштанд. Аз ҷиҳати ғафсӣ дар китф бартарӣ дар паҳлӯи буккачаҳои дурага буд.

Муқаррар карда шудааст, ки ғафсии пӯсти ин гуна буккачаҳо (на камтар аз 4,5 мм) назар ба маълумоти стандартӣ хеле зиёд буда, барои тайёр кардани чарми тағи пойафзол ва меҳи печдор низ мувофиқ аст.

3.9.2. Хусусиятҳои молию технологияи пӯсти тайёр

Барои коркарди минбаъда ба хром ва падош(дуби сурх) пӯстҳо ба 2 қисм ҷудо мешаванд. Дар заводи чармбарории ш.Душанбе хусусиятҳои молӣ ва технологияи пӯсти тайёри ҳамаи гурӯҳҳои таҷрибавии буккачаҳо омӯхта шуданд.

Қабули пӯст мувофиқи ГОСТ 1134-51 «Ашъёи хоми пӯст» амалӣ карда шуд. Пӯст тоза буд, минтақаҳои канорӣ бо каме тароват, намуди зоҳирии хуб, дар қисми поёни пӯст ягон нуқсоне ки сифати онҳоро паст кунад, набуд.

Ашъёи хом аз рӯи усули ягонаи тайёр кардани чарм барои қисмҳои боло ва поёни пойафзол кор карда баромада, аз рӯи ҳулосаи мутахассисони комбинат сифати хуб дошт. Ҳам буккачаҳои дурага ва ҳам

типи тоҷикӣ сифати хуби чармро доштанд ва ба стандартҳои чарми вазнин мувофиқ буданд.

Мо масоҳат, навъ ва ғафсии пӯсти хромии букчаҳои генотипҳои гуногунро барои болопӯши пойафзол омӯхтем.

Ҷадвали 3. 32.-Нишондиҳандаҳои сифатии чарми хром аз пӯсти букчаҳо

Нишондод	Гурӯҳ		
	I	II	III
Майдон (50% маҳсулоти тайёр)	129	149	158
Навъ	4	3	3
Ғафсӣ дар пушт, мм	1,3	1,4	1,6

Чӣ тавре маълумоти ҷадвали 35 нишон медиҳад, сатҳи (майдони) 50%-и маҳсулоти тайёри пӯсти букчаҳо дар гурӯҳи III - 158% буда, нисбат ба гурӯҳҳои I ва II мутаносибан ба миқдори 0,29 ва 9% зиёд буда, гурӯҳҳои II ва III ба навъи 3 ва гурӯҳи I ба навъи 4 дохил карда шудааст.

Ғафсии пӯстиҳои барои хромӣ коркардшуда дар нуктаи стандартӣ дар байни букчаҳо фарқ мекарданд. Бузургтарин ғафсӣ дар пусти букчаҳои гурӯҳи III - 1,6 мм буда, ғафсии нисбатан пасттар дар гурӯҳи I - 1,3 мм муайян карда шудааст.

Мувофиқи талаботи ГОСТ 17-258-80 чармҳои хромии омӯхташуда барои болопӯши пойафзол ба дараҷаи III тасниф карда шуданд.

Бартариҳои калони пӯстҳои, ки аз букчаҳо гирифта шудаанд, якхела буда, бо ғафсии якхела дар тамоми майдони пӯст мебошад (Ҷадвали 3.33).

Дараҷаи якрангии ғафсӣ бо фоизи конус (камшавии ғафсӣ аз қафа ба гиребон) ифода карда мешавад, ки бо таносуби фарқияти ғафсӣ байни нуқтаҳои стандартӣ дар қафа ва дар давидан муайян карда мешавад.

Ҷадвали 3.33 - Масоҳат, категория ва навъи чарми подоши букчаҳо

Гурӯҳ	Масоҳати 50% маҳсулоти тайёр (дм²)	Аз ҷумла			Категория	Навъ
		тахтапушт (47%)	гарданак (28%)	поёни шикам (25%)		
I	133	62,51	37,24	33,25	IV	III
II	154	87,84	55,64	48,61	I	II
III	170	80,11	47,69	42,20	I	II

Дар чорвои гурӯҳи III, ки масоҳати умумии пӯстҳои алоҳидаашон 170 дм² мебошад, маҳсулнокии қисми пурқимати тахтапӯт 80,11 дм² буда, аз нишондиҳандаҳои гурӯҳи I 1,38% ва гурӯҳи II 5,12% зиёд шуд.

Пӯсти тайёри букҷаҷаҳои гурӯҳҳои таҷрибавӣ ба категорияи I мансуб буда, ба дараҷаи навъи II ва III баҳо дода шуд.

Маълумот дар бораи ғафсии пӯсти букҷаҷаҳо дар нуқтаҳои гуногуни топографӣ барои поёни пойафзол дар ҷадвали 3. 34 нишон оварда шудааст.

Ҷадвали 3.34. - Нишондиҳандаҳои ғафсии пӯсти танаи коркардшудаи букҷаҷаҳо дар нуқтаҳои гуногуни топографӣ, мм

Нуқтаҳои топографӣ	Гурӯҳ		
	I	II	III
Думғоза	3,6	4,6	3,6
Тахтапушт	3,7	3,6	4,0
Гардан	4,1	4,5	3,3
Поёни ишқам	3,5	3,7	3,5
Пӯсти қисми қатқашак	2,8	3,2	3,3
Пеш	3,4	3,3	3,5
Қафо	3,2	3,5	3,4

Маълум аст, ки ғафсии чарм ба ғафсии пӯст, ба усулҳои дубикунонӣ (дуббуғикунонӣ), пур кардан, печондан ва дигар равандҳои технологияи он вобаста аст. Андозагирии ғафсии чармҳои тайёри коркарди дуби сурх дар нуқтаҳои стандартӣ топографӣ: пушт, тахтапӯшт, гиребон, фаршҳо ва ғафсӣ, инчунин дар шонаҳо (пеш ва қафо) гузаронида мешуд.

Аз маълумотҳои ҷадвал дида мешавад, ки ғафсии чармҳои тағи пойафзол ва меҳи печдор, инчунин риштагӣ ва часпакӣ мустаҳкамкунӣ, алалхусус зинҳо, ба ғафсии тахта чарми дараҷаҳои I ва II, гиребонҳои дараҷаи II мувофиқ буданд. Чепраки чармин аз пӯсти букҷаҷаҳои гурӯҳи III бештар ғафсӣ дошта, ин нишондиҳанда аз букҷаҷаҳои гурӯҳи I 8,2 фоиз ва аз гурӯҳи II 6,1 фоиз зиёд буд.

Бузургтарин ғафсӣ дар дурағаҳо (5,2 мм) буда, ин бартарият дар гурӯҳи I 1,96% ва дар гурӯҳи II 6,12%-ро ташкил меод. Дар ҳама ҳолатҳои дигар фарқият аз ҷиҳати оморӣ аҳамиятнок набуд.

Муайян карда шуд, ки чарми пӯсти букҷаҷаҳои дурага аз ҷиҳати ғафсӣ дар нуқтаҳои гуногун нисбатан якхела буд. Ин имкон медиҳад, ки он дар истеҳсоли пойафзоли хушсифат ва дигар маҳсулоти серталаб оқилонатар истифода бурда шавад.

Ҳамин тавр, тадқиқоти комплекси хосиятҳои молию технологияи пӯстҳо, инчунин тавсифоти сифатии чарми коркардшуда имконияти аз пӯстҳои вазнин ба даст овардани чармҳои хромии андозаи калон бо арзишҳои оптималии ғафсӣ аз чорвои гӯштӣ ва гибридҳои онҳо ва дуби сурхро барои қисмҳои боло ва поёни пойафзол нишон медиҳанд.

Дар баробари ин, нави пӯсти букҷаҷаҳои ҳамаи генотипҳои тадқиқшуда нисбатан баланд (I ва III) баҳогузори шуда, ба талаботи саноати чарм пурра ҷавобгӯ мебошанд.

3.9.3. Таркиби химиявии чарми букҷаҷаҳо бо технологияи коркарди хромӣ ва сурхи дубӣ

Таҳлили химиявии маҳсулоти тайёри чарми алоҳида аз ҳамаи гурӯҳҳои таҷрибавӣ гузаронда шуд. Натиҷаҳои таҳлил нишон медиҳанд, ки таркиби химиявии чарми тайёр дар доираи меъёрҳои тасдиқкардаи ГОСТ 938-22-71 ва 1010-78 мебошад. (ҷадвали 3.35).

Ҷадвали 3.35 - Таркиби химиявии чарми хромии букҷаҷаҳо, % (ГОСТ 938-22-71)

Нишондиҳанда	Гурӯҳ			Талабот ГОСТ 17-258-80
	I	II	III	
Намҳои	11,5	12,8	14,0	12-16
Равған	9,3	8,9	9,0	3,7-10
Оксиди хром	6,3	4,7	4,8	4,3

Дар чарми хромӣ барои болояш ва коркарди чарми сурхи дубӣ) барои тағи пойафзол миқдори намӣ, равған ва оксиди хром муайян карда шудааст.

Нисбатан паст будани равғани намунаҳои чарми ҳамаи гурӯҳҳои букҷаҷаҳо шояд аз сабаби набудани маҷмӯи зарурии равғанҳо барои

муайян кардани меъёри ин нишондиҳанда мувофиқи талаботи ГОСТ бошад. (ҷадвали 3.36).

Дар байни гурӯҳҳо аз ҷиҳати таркиби хокистар дар намунаҳо фарқияти ҷиддӣ вучуд нашофт. Миқдори оксиди хром дар чарм аз рӯи стандарт дар ҷавонаҳои гурӯҳи I 0,5%, II 0,4 ва III 0,9% зиёд буд, ки ин бо шиддатнокии хокистаркунӣ ва хромпушкунӣ алоқаманд аст.

Ҷадвали 3.36. -Таркиби химиявии чарми сурхи дубӣ (ГОСТ 938-22-71)

Нишондиҳанда	Гурӯҳ			Талаботи ГОСТ
	I	II	III	
Намнокӣ, %	9,6	9,8	9,5	12-17
Равған, %	3,4	3,3	3,6	На бештар аз 4,6
Хокистар, %	6,4	6,7	6,6	Стандарткунонӣ нашудааст
Оксиди хром, %	1,7	1,9	2,1	На бештар аз 0,6-0,2
Моддаи Галевои	47,3	48,2	47,1	Стандарткунонӣ нашудааст
pH	4,8	4,4	4,0	3,5-5,0
Ҳиссаи умумии моддаҳои шусташуда, %	8,7	7,7	7,3	На бештар аз 18
Коэффитсиенти мустаҳкамӣ	76,5	73,2	72,7	Ҳадди ақал 55

Ҷузъи асосии чарм як моддаи сафедаест, ки аз пӯст ба чарм, яъне ашёи урён мегузарад. Як вақтҳо дар таркиби пӯст, хусусан дар пояи тахта, миқдори моддаи бараҳна ҳамчун нишондиҳандаи асосии сифат ва тобоварии фарсудашавии он ҳисоб мешуд.

Тадқиқоти минбаъда хато будани муайянкунии пурраи таркиби холигии моддаҳои пӯстро дар чарм бо хосиятҳои амалии он исбот карданд. Миқдори моддаи пӯст асосан ҳамчун нишондиҳандаи дараҷаи сершавӣ бо пуркунандаҳои дубикунонӣ ва чарбкунанда истифода мешавад ва дар чарми букқачаҳо сатҳи он аз 47,9 то 51,2% буд.

Ҳамин тариқ, пӯст, ки бо ҷойгиршавии паймонҳои сохтори нахдор хос аст, инчунин миқдори максималии моддаҳои чармро дорад. Дар ин маврид нишондиҳандаҳои пӯсти букқачаҳои гурӯҳи II мисол шуда метавонанд ва баръакс, пӯсти сусти сохтори нахдор бо кам будани моддаи урён дар букқачаҳои гурӯҳи I хос аст.

Бояд гуфт, ки миқдори зиёди коэффитсиенти дарозии чармҳои таҳқиқшуда ба 100 қисм моддаи пӯст зиёд будани миқдори моддаҳои холигии вобастаро нишон медиҳад.

Чун қоида, чарм бо усулҳои бо ришта, ширеш ва нохун часпонидани он шумораи маҳсулот аз рӯи қоида бояд на камтар аз 55 (ГОСТ 1010-78) дона бошад. Бузургӣ ва фарқияти он дар букҷаҷаҳо аз 67,8 то 74,6 буд. Сифати чарм бештар ба таркиби химиявии онҳо ва ба таносуби нам, равшан ва асосан нисбати оксиди хром вобастагӣ дорад.

Таҳлили натиҷаҳои химиявии чарм дар онҳо фоизи нисбатан баланди нам ва равшанро нишон дод. Концентратсияи баланди оксиди хром ба пӯсти букҷаҷаҳои гурӯҳи I рост меояд, ки ин сифатҳои баланди онҳоро тасдиқ мекунад. Пӯсти дигар гурӯҳҳои букҷаҷаҳо низ аз рӯи ин нишондиҳанда аз талаботи стандартӣ зиёд аст.

Натиҷаҳои таҳлили химиявии пӯсти тахтаи коркарди дуби сурх нишон медиҳанд, ки дар байни букҷаҷаҳои зотҳои гуногун аз ҷиҳати намӣ, равшан, хокистар ва оксиди хром баъзе фарқиятҳо мавҷуданд.

Миқдори намӣ дар намунаҳои чарм нисбат ба талаботи стандартӣ каме пасттар аст, ки ба қобилияти баланди ҳатмии коллаген аз пӯсти букҷаҷаҳои ҳамаи генотипҳо бо дуби сурх алоқаманд аст. Ҳамин тариқ, таркиби химиявии пӯсти букҷаҷаҳо арзишҳои оптималии таркиби ҷузъҳо ва мувофиқати онҳоро ба талаботи стандарт нишон медиҳад.

3.9.4. Хусусиятҳои физикӣ ва механикии чарм дар вақти коркард барои чарми хромӣ ва падоши сурхи дубӣ

Натиҷаҳои санҷишҳои физикию механикии чарми хромӣ имкон дод як қатор хосиятҳои муайян карда шаванд, ки сифат ва хосиятҳои амалии истифодабарии онҳоро нишон медиҳанд (Қадвали 3.37).

ГОСТ 938-22-71 стандартҳои нишондиҳандаҳои асосии санҷишҳои физикӣ ва химиявии чармҳои хромиро муқаррар мекунад: муқовимати рӯйпӯши тар ба соиш, қувваи кашиш, фишор ҳангоми пайдо шудани

тарқишҳо дар қабати пеш, дарозӣ дар зери фишор ва муқовимати рӯйпӯш ба хамшавии такрорӣ.

Аз рӯи тобоварии рӯйпӯши тар ба соиш ва хамшавии такрорӣ дар ҳамаи букҷаҷаҳо як хел нишондиҳандаҳо ба даст оварда шуданд, ки ин ҳам ба стандарт мувофиқ буд.

Ҷадвали 3.37. – Хусусияти физикию механикии чарми хромӣ(ГОСТ 938 - 22-71)

Нишондиҳанда	Гурӯҳ			ОСТ 17-258-80 на камтар аз 200 гардиш
	I	II	III	
Муқовимати рӯйпӯши тар ба соиш (рӯйпӯши нитроэмульсионии гардиш на камтар аз)	220	220	220	
Масоҳат, мм ²	10,6	11,6	11,7	12-13
Қувваи ниҳии пӯст кг/мм ²	2,2	2,8	3,3	1,6
Дар ҳолате, ки тарқишҳои рӯи пӯст пайдо мешаванд, қабати 10 МПа дар пӯст на камтар	1,5	2,1	2,4	1,3
Ёзиш дар хоб. 10 МПа дар пӯст %	43,0	36,0	32,0	20-35
Муқовимати рӯйпӯш ба ҳам шудани такрорӣ пӯст, дар ҳолати баҳогузори на камтар аз	3	3	3	ақаллан 2

Илова бар ин, санҷишҳои физикӣ ва механикии намунаҳои пӯсти сурхи поёни пойафзол нишон доданд, ки онҳо асосан ба талаботи муқаррарнамудаи стандартҳо мувофиқат мекунанд (ҷадвали 3.38).

Ҷадвали 3.38. - Таркиби физикию химиявии коркарди падоши чарми сурх, (ГОСТ 938-22-71)

Нишондиҳанда	Гурӯҳ			ГОСТ 1010-78
	I	II	III	
Масоҳат, м ²	41,2	42,3	48,8	Муқаррарӣ нест
Кандашавии умумӣ, кг/мм ²	2,0	2,3	2,0	На камтар аз 2.0
Ёзиш, %	24,0	25,5	26,5	Муқаррарӣ нест
Модули қатшавӣ, %	428,0	421,4	377,3	600-1000
Ҷунҷоии намии 2 соата, %	94,7	92,1	90,6	105
				На бештар аз 65%

Бо вучуди ин, пӯсти ҳамаи гурӯҳҳои букҷаҷаҳо амалан қобилияти баландтари нигоҳдории намай дошт. Сабаб он аст, ки дар саноат ҳангоми

коркард дар комплекти равған равғаноккуниҳо мувофиқ набуданд, ки ин дар навбати худ боиси ба худ гирифтани намӣ дар чарм гардид.

Нишондиҳандаҳои даридани умумии пӯст дар букқачаҳои гурӯҳи I 2,2 кг/мм² ва дар гурӯҳи II 2,1 кг/мм² буд, ки нисбат ба ҳамсолони онҳо дар гурӯҳи III каме зиёд аст. Пӯсти гурӯҳҳои II ва III аз рӯи бузургии ёзиш фарқ мекард. Модули чандирии ҳамаи букқачаҳо баланд буд.

Ҳамин тавр, дар натиҷаи омӯзиши ҳаматарафаи нишондиҳандаҳои сифатии пӯст ва чарм муқаррар карда шуд, ки бо дурага кардани букқачаҳои типии тоҷикӣ бо чорвои маҳаллии зебу ва парвариши букқачаҳои дурага мусоидат мекунад, ки сифати пӯст ва хосиятҳои молию технологияи он (вазн, ғафсӣ, майдонҳои кор) хеле беҳтар карда шавад. Аз букқачаҳои 20-моҳа гирифтани пӯсти хом барои истеҳсоли маҳсулоти хушсифат мувофиқ аст ва имконият медиҳад, ки чармҳои хромӣ ва вазнини тахта ба даст оварда шавад.

3.10. Хусусиятҳои этиологии букқачаҳои генотипҳои гуногун дар шароити кӯхистон

Дар соҳаи чорводорӣ нигоҳдории чорвои гӯштӣ дар чарогоҳ, хусусан аз рӯи системаи гов бо гӯсола аҳамияти калон дорад. Ба ин муносибат дар шароити хоҷагии Кангурт ҳангоми коркарди технологияи соҳаи махсусгардонидашудаи чорвои гӯштӣ, ки ба хусусиятҳои шароити табиӣ ва иқлимӣ он мувофиқ қунонида шудааст, мавсими чарогоҳи тобистона нисбат ба дигар минтақаҳо хеле дарозтар буда, алафҳои табиӣ ро оқилона истифода бурдан ва инчунин роҳ надодан ба поймол кардани растаниҳои чарогоҳ аҳамияти калон дорад.

Нармаев М.Б., [1992], Отаров А. [2018], Слепцов И.И. [2020], Жаймышева С.С. [2023] қайд мекунанд, ки ба букқачаҳои типии тоҷикӣ дараҷаи суръати тезии ҳаракат дар чарогоҳ хос буда, онҳо метавонанд дар як шабонарӯз дар ҷустуҷӯи хӯрока то 50 км роҳро тай намоянд.

Аз таҷрибаи хоҷагиҳои ватанӣ, ки чорвои типии тоҷикӣ парвариш карда мешавад, бо чарогоҳ таъмин намудани чорво зарур аст. Қайд

кардан лозим аст, ки аксарияти чарогоҳҳои табиӣ аз сабаби масоҳати хеле калон доштан, девор гирифта нашудааст. Дар вақти чаридани чорво дар масофаи тӯлонӣ ба чорво кам назорат карда мешавад, ё ин ки умуман беназорат мемонад, дар ин вақт мумкин аст чорво ба мушкилиҳо дучор гардад.

Аз ин рӯ, дар шароити хоҷагии Кангурт таклиф карда мешавад, ки варонидани чорво дар чарогоҳҳо бо ду тарз ташкил карда шаванд: чарогоҳҳои бо девор гирифташуда ва мавзеҳои кушоди чарогоҳҳои табиӣ (бедевор), инчунин чаронидани чорво дар мавзеҳои кушоди чарогоҳҳои масоҳаташон бисёр калон, бояд тахти назорати подабонҳо бошад.

Тадқиқотҳои илмию таҷрибавӣ оид ба ин масала дар базаи хоҷагии кооперативии «Кангурт»-и ноҳияи Темурмалик гузаронда шуд.

Ҳарорати ҳаво дар вақти гузаронидани корҳои илмию тадқиқотӣ: пагоҳӣ $+18-20^{\circ}\text{C}$, рӯзона $+34-36^{\circ}\text{C}$, бегоҳ $+20-23^{\circ}\text{C}$ ва шабона $+14-16^{\circ}\text{C}$ гарм буд.

Дар давраи тирамоҳу зимистон, дар вақти гузаронидани тадқиқотҳои илмӣ, ҳаво абрҳои шамоли ва бебориш буд. Ҳарорати ҳаво пагоҳӣ $+8-10$, рӯзона $+15-17$, бегоҳӣ $+11-13$, шабона $+9-10$ дараҷа гарм буд.

Чорвои тадқиқотӣ дар майдони 60 гектар, бо релеф ва минтақаҳои ландшафти кушоди дараҳо нигоҳ дошта шуданд.

Букчаҳо ҳаррӯза мутаносибан аз 47 то 50 % ва аз 37 то 41 % дар чарогоҳ чарида ва истироҳат менамуданд.


Яке аз нишондиҳандаҳои муҳиме, ки ба маҳсулнокии ғуштии чорво таъсир мерасонад, ин мавсими сол ва омили мӯътадили физиологӣ ва мубодилаи моддаҳо дар организми чорво мебошад. (Чадвали 3. 39, расми 3.11).

Дар ин ҷода хусусиятҳои рафтори букчаҳои генотипашон ғуногун дар фаслҳои зимистон ва тобистон омӯхта шуданд. Муқаррар карда шудааст, ки меъёри нишондиҳандаҳои функционалӣ дар букчаҳо ба

таври гуногун ба амал меояд. Онҳо дар фасли тобистон бештари вақти худро дар истироҳат - 61,2 - 62,0%, чаридан - 26,2 - 27,4% ва ҳаракат намудан - 12,6 - 10,6 % гузарониданд.

Ҷадвали 3.39.- Хусусиятҳои этиологии букқачаҳои типӣ чорвои калони сергӯшти тоҷикӣ дар чарогоҳ (ба ҳисоби миёна барои 2 рӯзи санҷиш)

Этология	29-30 июн (ҳарорати рӯзона 31-32°C)		03-04 июл (ҳарорати шабона 17-19°C)	
	миқдори вақт, дақиқа	%	миқдори вақт, дақиқа	%
Чаридан	630,0 ± 15,2	43,7	672,5 ± 7,5	46,7
Обнӯшӣ ва ҳаракат	207,5 ± 10,5	17,9	187,5 ± 6,5	13
Истироҳат	602,5 ± 7,5	38,4	580,0 ± 7,0	40,3
Ҳамагӣ:	1440	100	1440	100



Расми 3. 11. - Рафтори букқачаҳои типӣ тоҷикӣ дар давраи таҷрибаомӯзӣ

Ҳамин тариқ, букқачаҳои типии чорвои сергӯштӣ тоҷикӣ бисёр истироҳат ва кам ҳаракат намуданд, инчунин ҳӯрокхӯрӣ бошад 26,2 – 27,4%-ро ташкил намуд ва онҳо нисбатан ором буданд, ки ин ба зиёд шудани вазни танайи онҳо таъсири мусбат расонид.

Вақте, ки ҳарорати ҳаво рӯзона ба +34 - 36°C расид, чаридани чорво ба миқдори 5% ва истироҳати онҳо бошад, ба миқдори 3% кам гардид. Инчунин, вақт барои обнӯшӣ ва ҳаракат дар рӯзҳои гарм назар ба рӯзҳои салқин 5% зиёд буд.

Дар ҳавои гарм букқачаҳо ба обнӯшӣ рӯзе 3-4 маротиба ва дар рӯзҳои салқин бошад, 2 маротиба мерафтанд. Ҳангоми истироҳат дар рӯзи гарм чорво кӯшиш мекард, ки ҷойҳои сояфкани чарогоҳро интихоб намояд ё ин ки дар зерӣ дарахтон ё буттаҳо истироҳат кунад, ин метавонад вақти ҳаракатро зиёд намояд.

Инчунин, дар вақти истироҳати, дар рӯзҳои гарм, букқачаҳоро ҳашароти хунхор ба ташвиш меовард, дар рӯзҳои салқини шамоли бошад, чорво нисбатан ором мечарид ва ҳам истироҳат менамуд.

Ҳангоми тадқиқотҳои илмӣ маълум гардид, ки букқачаҳои типии тоҷикӣ фаъолона чарогоҳро истифода бурда ва аксар вақт алафу баргҳои буттаҳоро меҳӯранд, лекин ин гуна рафтор дар чорвои маҳаллӣ ба қайд гирифта нашудааст. Ин рафтори букқачаҳои типии тоҷикӣ дар давраи таҷрибаомӯзӣ ба қайд гирифта шудааст. Маълум мегардад, ки чорвои калони типии тоҷикӣ нарасидани моддаҳои ғизоиро аз алафу баргҳои буттаҳо истифода мебаранд.

3.11. Хусусиятҳои физиологии букқачаҳои генотипҳои гуногун

Хусусияти муҳимтарини чорво дар шароити экстремалии баландкӯҳҳо, ки дар онҳо тағйироти номусоиди иқлим, дар фаслҳои гуногуни сол мушоҳида мешавад, дар як сатҳи нисбатан доимӣ нигоҳ доштани ҳарорати бадан мебошад, ки ин барои чараёни мӯътадили мубодилаи моддаҳо ва равандҳои физиологӣ зарур аст.

Самаранокии истифодаи чорвои маҳаллии зебу ва насли дурагаи он, пеш аз ҳама, қобилияти мутобиқшавӣ ба шароити номусоиди иқлими чарогоҳ, хӯрока ва дигар шароити муҳити зист вобастагӣ дорад. Дар баробари ин, дар чунин шароит нигоҳ доштани сифатҳои хоси истеҳсоли ва репродуктиви онҳо, яке аз вазифаҳои асосии масъалаи имрӯза мебошад.

Хусусиятҳои инфиродӣ, ки дар букҷаҷаҳои генотипҳои гуногун мавҷуданд, дар нишондиҳандаҳои физиологӣ муайян карда шуданд.

Натиҷаҳои ҷенкунии ҳарорати бадан, нафаскашӣ ва набзи чорвои генотипашон гуногун дар ҷадвали 3.40. оварда шудааст.

Ҷадвали 3.40. - Динамикаи нишондиҳандаҳои клиникалии букҷаҷаҳои генотипҳои гуногун (%), ($\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$)

Гурӯҳ	Нишондодҳо			
	Синну сол, моҳ	Ҳарорати бадан, °C	Суръат дар як дақиқа	
			нафаскашӣ	набз
I	8	$38,2 \pm 0,98$	$22,0 \pm 1,60$	$70,1 \pm 2,11$
	12	$38,8 \pm 0,06$	$23,0 \pm 2,59$	$71,3 \pm 3,66$
	20	$39,4 \pm 0,10$	$24,7 \pm 1,15$	$80,3 \pm 2,00$
II	8	$38,4 \pm 0,10$	$23,1 \pm 0,41$	$71,4 \pm 1,35$
	12	$38,7 \pm 0,61$	$23,4 \pm 0,72$	$71,7 \pm 1,57$
	20	$38,9 \pm 0,40$	$23,0 \pm 0,61$	$77,1 \pm 0,71$
III	8	$38,9 \pm 0,69$	$25,4 \pm 1,11$	$70,6 \pm 1,09$
	12	$39,0 \pm 0,33$	$23,5 \pm 0,10$	$70,3 \pm 1,04$
	20	$38,4 \pm 0,91$	$22,6 \pm 1,08$	$71,2 \pm 0,82$

Аз нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 3.32 овардашуда маълум мешавад, ки ҳангоми аз шир ҷудо кардани букҷаҷаҳо аз модарашон, дар синни 8 моҳагӣ, ҳарорати бадани букҷаҷаҳои гурӯҳи III $38,9^{\circ}\text{C}$ буд ва суръати нафаскашӣ нисбат ба букҷаҷаҳои гурӯҳҳои I ва II баландтар буда - $25,4$ нафаскашӣ дар як дақиқа таъкил намуд.

Тапиши дил дар букҷаҷавҳи гурӯҳи I - $70,1$ ва гурӯҳи III - $70,6$ буд, ки ба меъёрҳои физиологӣ мувофиқат мекунад.

Дар букҷаҷаҳои маҳаллӣ, дурага ва типии тоҷикӣ бо мурури синну сол ҳарорати бадан, нафаскаши ва тапмиши дил хеле тағйир меёбад.

Масалан, ҳарорати бадани букқачаҳои гурӯҳи I дар 20-моҳа $39,4^{\circ}\text{C}$ буд, ки ин назар ба букқачаҳои гурӯҳи II ва III мутаносибан $0,5$ ва $1,0^{\circ}$ баландтар ва суръати нафаскашии онҳо мутаносибан $24,7$ ва тапиши дил $80,3$ буд.

Маълумоти бадастомада нишон медиҳад, ки ҳарорати бадани говҳои гурӯҳи таҷрибавӣ дар фаслҳои сол ба таври назаррас тағйир намеёбад. Дар букқачаҳои гурӯҳи I тағйироти назарраси вобаста ба синну сол дар ҳарорати бадан, суръати нафаскашӣ ва тапиши дил мушоҳида шуданд.

Маълумотҳои ба даст овардашуда нишон медиҳанд, ки ҳарорати бадани букқачаҳо дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ дар фаслҳои сол чандон фарқ намекунад. Дар букқачаҳои гурӯҳи I, ки ба синну сол хеле калон аст, дар ҳарорати бадан, суръати нафаскашӣ ва набз мушоҳида карда шуд.

Ҷадвали 3.41. - Мубодилаи газу энергия дар организми букқачаҳои 15-моҳа

Нишондиҳанда	Гурӯҳ		
	I	II	III
Сатҳи нафаскашӣ дар 1 дақиқа.	$23,0 \pm 2,59$	$23,0 \pm 2,59$	$23,0 \pm 1,01$
Пурра нафаскашӣ, мл	$1517,10 \pm 79,25$	$1688,03 \pm 77,23$	$1994,21 \pm 80,21$
Ҳавоивазгардонии шуш, л/дақ	$33,90 \pm 3,03$	$40,14 \pm 2,88$	$45,91 \pm 3,02$
Истеъмоли O_2 , мл/дақ	$1337,32 \pm 69,86$	$1548,31 \pm 44,21$	$1630,00 \pm 57,32$
Ихроҷи CO_2 , мл/дақ	$1079,84 \pm 69,86$	$1268,22 \pm 65,35$	$1236,31 \pm 62,53$
Коэффитсиенти нафаскашӣ	$0,80 \pm 0,02$	$0,82 \pm 0,01$	$0,76 \pm 0,02$
Индекси оксиген	$39,45 \pm 1,84$	$38,57 \pm 1,23$	$35,50 \pm 2,21$
Ба 1 кг вазни зинда, мл/дақ:			
Ҳавоивазгардонӣ	$169,83 \pm 15,17$	$167,60 \pm 11,41$	$224 \pm 12,03$
Истеъмоли O_2	$6,70 \pm 0,35$	$6,46 \pm 0,39$	$7,95 \pm 0,34$
Ихроҷшавии CO_2	$5,41 \pm 0,35$	$5,29 \pm 0,21$	$6,02 \pm 0,29$
Истеҳсоли гармӣ:			
Дар як шабонарӯз барои 1 сар чорво, МҶ	38,80	41,2	46,5
Дар як соат ба 1 сар чорво, МҶ	1,61	1,72	1,94
Дар як соат ба 1 кг вазни зинда, МҶ	$8,10 \pm 0,45$	$8,60 \pm 0,41$	$9,47 \pm 0,37$

Бо аз $+20^{\circ}\text{C}$ боло рафтани ҳарорати ҳаво суръати нафаскашии букқачаҳои 18-моҳаи гурӯҳи III нисбат ба маҳаллӣ $2,7$ дар як дақиқа

($P>0,95$) зиёд буд, ки ин шиддатнокии функсияҳои физиологии онҳоро бо мутобиқшавӣ алоқаманд шарҳ медиҳад.

Букқачаҳои маҳаллӣ дар давраи зикршуда ба тағйироти шароити муҳит камтар вокуниш нишон доданд.

Ҳамзамон, мубодилаи газ дар чорвои гурӯҳҳои таҷрибавӣ шиддатнок гузашта, омили паст шудани фишори парсиалии оксиген ба организми онҳо таъсири манфӣ нарасонд.

Таҳлили маълумотҳои бадастовардашуда нишон медиҳад, ки букқачаҳои гурӯҳи I ва II дар синни 15-моҳагӣ аз ҷиҳати арзиши мутлақи вентилятсияи шуш нисбат ба чорвои назоратӣ 9,0 л/дақиқа (25,4%) ва 1,1 л/ дақ (3,1%) мутаносибан зиёд шуда ва охирин низ дорои ҳаҷми ками гирифтани оксиген дар 36,7 мл/дақ (29,4%) ва 50,7 мл/дақ (40,6%), барориши CO_2 дар 29,6 мл/дақ 24,9% ва дар муқоиса бо гурӯҳҳои таҷрибавӣ 35,0 мл/дақ (2,9%) ($P>0,95$) буданд.

Манзараи шабеҳи ин нишондиҳандаҳо дар синни 18-моҳагӣ низ мушоҳида мешавад.

Дар ҳама ҳолат фарқияти баланд назаррас ($P>0,95$) аст.

Аммо нишондиҳандаҳои оксиген (ҷадвали 3.41, 3.42) дар букқачаҳои типӣ тоҷикии синни 20-моҳа нисбат ба гурӯҳҳои I ва II –и чорво 1,18 ва 1,10 зиёд буд.

Ин нишон медиҳад, ки организми онҳо аз ҳар як литр ҳавои ба шуш дохилшуда назар ба букқачаҳои тозазот ва дурага бештар оксигенро қабул кардааст, ки бешубҳа тасдиқи қобилияти бехтари қабули оксигени бадани онҳо мебошад.

Ҳамин тариқ, дар букқачаҳои гурӯҳи 1 дар синни 15-моҳагӣ ихроҷи гармии шабонарӯзӣ 10,7 мҷ ва 26,2 Ҷ ($P<0,95$), ва 8,04 мДж и 20,1% ($P>0,95$) нисбат ба ҳамсолони гурӯҳи 3, мутаносибан ба 1 сар дар як соат ба миқдори 0,44 мҷ ва 28,2; 0,34 мҷ ва 20,1% ($P>0,95$) зиёд буд.

Дар синни 20 моҳагӣ ба ҳар 1 килограмм вазни зинда аз ҷиҳати вентилятсияи шуш 6,6 мл/дақиқа ва азхудкунии оксиген 0,8 мл/дақиқа

типи тоҷикӣ аз чорвои назоратӣ бартарӣ дошт. Охиринҳо низ аз ҷиҳати ихроҷи маҳсулоти гармӣ дар як шабонарӯз ва дар як соат ба ҳар сар аз онҳо кам буданд. Дар баробари ин, баъзе фарқияти байни зотҳо низ ошкор карда шуданд.

Ҷадвали 3.42. - Мубодилаи газу энергия дар организми буққаҳои 20-моҳа

Нишондиҳанда	Гурӯҳ		
	I	II	III
Сатҳи нафаскашӣ дар 1 дақиқа	24,7±1,15	24,7±1,18	30,3±0,98
Пурра нафаскашӣ, мл	2181,55±112,66	2331,40±82,11	1814,00±84,23
Ҳавоивазгардонии шуш, л/дақ.	55,54±3,44	55,24±1,76	54,79±1,96
Истеъмоли O ₂ , мл/дақ.	2065,18±77,74	1971,50±86,44	1711,12±82,12
Ихроҷи CO ₂ , мл/дақ.	1548,04±60,84	1554,81±99,21	1511,03±95,41
Коэффитсиенти нафаскашӣ	0,75±0,03	0,79±0,03	0,81±0,02
Индекси оксиген	37,79±1,13	35,69±1,64	31,23±1,48
Ба 1 кг вазни зинда, мл/дақ.			
Ҳавоивазгардонӣ	164,33±10,17	141,86±4,01	143,2±3,49
Истеъмоли O ₂	6,11±0,23	5,06±0,24	4,47±0,21
Ихроҷшавии CO ₂	4,58±0,18	3,99±0,12	3,95±0,29
Истеҳсоли гармӣ			
Дар як шабонарӯз барои 1 сар чорво, Мҷ	59,05	56,19	52,61
Дар як соат ба 1 сар чорво, Мҷ	2,46	2,34	2,19
Дар як соат ба 1 кг вазни зинда, Мҷ	7,28±0,20	6,01±0,31	6,41±0,28

Аммо новобаста аз ин, аз рӯи 1 килограмм вазни зинда фарқи байни буққаҳои ин гурӯҳҳо беъътимод баромад. Дар хусуси буққаҳои маҳаллӣ бошад, онҳо низ аз рӯи ин нишондиҳандаҳои ихроҷи гармӣ аз ҳамсолони зотӣ пеш гузаштанд.

Маълумотҳои бадастомада дар бораи нафаскашии шуш, шиддатнокии мубодилаи газ ва гармии ҳосилшаванда нишон доданд, ки дар чорвои гурӯҳҳои I ва II дар шароити гипоксия аз меъёри физиологӣ ягон дуршавӣ мушоҳида карда нашудааст.

Баланд шудани шиддати нафаскашии шуш ва мубодилаи газ дар онҳо, ба фикри мо, ба зиёд шудани сарфи энергия барои таъмини функсияҳои физиологии организм, шиддатнокии баланди афзоиши вазни

бадан вобаста аст, ки дар баъзе давраҳо назар ба чорвои маҳаллӣ 1,5—2-баробар зиёд аст.

Ҳамаи ин имкониятҳои баланди чорвои типӣ тоҷикӣ ва дурагаро, ки дар шароити экстремалии ноҳияҳои баландкӯҳи ҷумҳурӣ бо роҳи дурагакунии байнизоти ба даст оварда шудаанд, зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти гӯштиро тасдиқ мекунад.

Ҳамин тариқ, ҳарорати бадан, суръати нафаскашӣ ва тапиши дили букҷаҷаҳо дар ҳамаи гурӯҳҳои таҷрибавӣ дар доираи меъёрҳои физиологӣ буданд.

БОБИ 4. НАТИЧАҲОИ ТАҶРИБАҲОИ ИСТЕҲСОЛӢ

4.1 Натиҷаҳои таҷрибаҳои истеҳсолӣ

Барои санҷидани эътимоднокии натиҷаҳо, ки дар таҷрибаҳои илмию тадқиқотӣ, ки дар тӯли 180 рӯз ба даст оварда шудаанд, дар 3 гурӯҳи буқачаҳо: гурӯҳи I - буқачаҳои маҳаллӣ, гурӯҳи II - буқачаҳои дурага ва гурӯҳи III - типӣ тоҷикӣ дар шароити парвариш ва нигоҳубини тамоми сол дар ҷароғохҳо гузаронида шудаанд.

Дар давраи таҷрибаҳои илмӣ-истеҳсолӣ барои ҳамаи гурӯҳҳо шароити якхела фароҳам оварда шуда буд. Аз ин ру таъсири чунин тарзи парвариш ба саршумори ҳар се ғуруҳ омӯхта шуд.

Гурӯҳҳои буқачаҳои таҷрибавӣ аз рӯи нишондодҳои ҳамсолон: вазни зинда, синну сол, фарбеҳӣ ва зот ташкил карда шудаанд.

Дар вақти ташкил намудани гурӯҳҳо ҳар як сар ҷорво аз муоинаи ветеринарӣ гузаронида шуд.

Гурӯҳҳои буқачаҳои таҷрибавӣ дар майдони сайругашти изолятсияшуда, дар як ҳел шароити ҳӯрокдихӣ ва нигоҳубинӣ парвариш карда шуданд.

Вазни зиндаи буқачаҳои таҷрибавӣ бо вазнкашии индивидуалӣ муайян карда шуданд, ки натиҷаи онҳо дар ҷадвали 4.1.1. оварда шудааст.

Ҷадвали 4.1.1. - Вазни зинда ва афзоиши миёнаи шабонарӯзии буқачаҳои таҷрибавӣ

Гурӯҳ	Синну сол, моҳ						
	12	18			20		
	Вазни зинда, кг	Вазни зинда, кг	Вазни мутлак, кг	Вазнафзун-кунии шабонарӯзӣ, г	Вазни зинда, кг	Вазни мутлак, кг	Вазнафзун-кунии шабонарӯзӣ, г
I	211,0	288,4	77,4	520	332,0	73,6	407
II	220,0	311,0	91,0	506	378,0	67,0	744
III	204,5	320,5	116,0	644	380,0	59,5	661

Муайян карда шуд, ки буқачаҳои типӣ тоҷикӣ дар охири таҷрибаи истеҳсолӣ (20-моҳа) аз ҷиҳати вазни зинда аз ҳамсолони худ, буқачаҳои

махаллӣ ва дурага 48,0 ва 2,0 кг зиёд буд, ё ин ки мутаносибан 12,6 ва 0,5%-ро ташкил намуд. Вазнафзункунии шабонарӯзӣ бошад, дар букқачаҳои гурӯҳи II -744 г-ро ташкил намуд, ки нисбат ба гурӯҳҳои I ва III мутаносибан ба миқдори 337 ва 83 г бартарӣ доштанд.

Дар давоми се моҳ дар чарогоҳҳои тирамоҳӣ фарбеҳ кардани букқачаҳо имконият дод, ки аз ҳар сар чорво ба таври илова бо вазни зинда 59,5-73,6 килограммӣ гӯшт ба даст оварда шуд.

Натиҷаҳои, ки дар санҷиши истеҳсоли ба даст оварда шудаанд, маълумотҳоро дар рафти корҳои илмӣ - таҷрибавӣ тасдиқ мекунанд.

4.2 Самаранокии иқтисодии парвариши букқачаҳо дар шароити чарогоҳ

Ҷоида ва дараҷаи даромаднокӣ аз ҳисоби ба гӯшт супоридани букқачаҳои генотипҳои гуногун ба даст оварда мешавад. Ҳамин тариқ, истифодаи оқилона ва парвариши типҳои навбунёди сергӯшти тоҷикӣ, имкон медиҳад, ки истеҳсоли маҳсулоти хушсифати сафеддор ва аз ҷиҳати экологӣ тозаӣ – гӯшти гов зиёд карда шавад.

Дар ҳамаи давраҳои синну сол ҷоида ва дараҷаи даромаднокӣ аз ҳисоби ба гӯшт фурухтани букқачаҳои генотипҳои гуногун ба даст оварда мешавад. Бинобар ин парвариши букқачаҳои типҳои чорвои калони сергӯшти тоҷики самарҳои баланди иқтисодӣ медиҳанд.

Ҳоҷагӣҳои, ки бо парвариши типҳои сергӯшти тоҷикӣ машғуланд, метавонанд мӯҳлати технологияи нигоҳубину парвариши чорворо нигоҳ дошта, арзиши аслии маҳсулотро паст ва даромаднокии онро баланд бардоранд.

Дар сохтори унсурҳои хароҷот барои истеҳсоли гӯшти гов дигар хароҷоти муастаким низ саҳми калонро ишғол карданд, ки қисми зиёди онҳо, ин хароҷоти нақлиёт мебошад ва асосан барои бо душвориҳои калон аз дуриҳо кашондани чорво, хӯрокаи ва дигар молҳои барои кори соҳа зарур, сарф мешаванд (ҷадвали 4.2.1).

Ҷадвали 4.2.1. - Самаранокии иқтисодии парвариши букқачаҳо ба ҳисоби миёна ба 1 сар (бо назардошти хароҷот дар нигоҳдории букқача) бо нархҳои соли 2020

Нишондиҳанда	Гурӯҳ		
	I	II	III
Хароҷоти умумӣ барои парвариши як сар	4350	4560	4520
Даромад аз фурӯши гӯшт бо сомонӣ	9647,0	11720,5	11852,5
Ҷоида бо сомонӣ	5297,	7160,5	7332,5
Даромадноки, %	22,0	57,0	62,2

Ҷоиданокии парвариши букқачаҳои типии тоҷикӣ 62,2%, дурагаҳо - 57,0% ва зебуи маҳаллӣ 22,0%-ро ташкил дод, яъне дар шароити якхелаи нигоҳдорӣ фарқиати генотипӣ ба самаранокии истеҳсолот таъсир мерасонад.

Натиҷаҳои озмоишҳои истеҳсолӣ

Дар давраи озмоиши истеҳсолӣ, гурӯҳҳо бо истифода аз усули аналогӣ дар асоси вазни зинда, синну сол, ҳолати бадан ва зот ташкил карда шуданд. Ҳар як ҳайвон ҳангоми ташкили гурӯҳ аз муоинаи байторӣ гузашт.

Букқачаҳо дар оғилҳо дар гурӯҳҳо, дар ҷойҳои ҷудогонаи майдони гаштугӯзор ва ғизодиҳӣ бо ҳӯрокдиҳандагон ва ҷӯйборҳои об ҷойгир карда шуда, дар гурӯҳҳо ғизо дода шуданд.

Дар давраи тадқиқот, букқачаҳои таҷрибавӣ дар шароити якхелаи ғизодиҳӣ ва нигоҳдорӣ нигоҳ дошта шуданд.

Вазни зинда дар аввали озмоиши истеҳсолӣ бо вазни алоҳидаи букқачаҳо муайян карда шуд.

Букқачаҳои типии тоҷикӣ аз популятсияи Кангурти зоти сарсафеди қазоқӣ ва говҳои дурагашудаи Қазоқи нисбат ба букқачаҳои зебуи маҳаллӣ вазни зиндаи бештар доштанд, яъне вазни зиндаи букқачаҳои гурӯҳҳои II ва III дар синни 18-моҳа мутаносибан 311,0 ва 320,5 кг ва дар синни 21-моҳа 378,0-380,0 кг буд ва афзоиши миёнаи ҳаррӯза 744 ва 661 г буд.

Муайян карда шуд, ки буққаҷаҳои типии тоҷикии популятсияи Кангурти дар охири озмоиши истеҳсоли нисбат ба ҳамтоёни худ, буққаҷаҳои дурагашуда ва маҳаллии худ, мутаносибан 48,0 ва 2,0 кг (14,5%, $P < 0,01$) ва 0,5% аз рӯи вазни зинда пештар буданд.

Маълумоте, ки дар натиҷаи озмоиши истеҳсоли ба даст оварда шудааст, маълумоти кори таҷрибавии илмиро тасдиқ мекунад.

Ҳамин тариқ, муайян карда шудааст, ки омехта кардани чорвои зебуи маҳаллӣ бо ҳайвоноти популятсияи Кангурт ва типии тоҷикии чорвои ҷавони дорои шароити баландро ба вучуд меорад, ки қодиранд захираҳои хӯроки ҷарогоҳҳои кӯҳиро самаранок истифода баранд ва истеҳсоли гӯшти гови баландсифатро афзоиш диҳанд.

Самаранокии иқтисодии парвариши шадиди буққаҷаҳо

Қайд кардан зарур аст, ки яке аз кафолатҳои асосии ғоידаовари чорвои гӯштӣ истеҳсоли ҳадди аксар ғӯсолаҳои тичоратӣ барои ҳар 100 гов ва ғӯсола мебошад. Ғайр аз ин, масъалаи тақвияти парвариши чорвои ҷавон махсусан муҳим аст. Аз ин рӯ, тадқиқоти муқоисавӣ оид ба самаранокии парвариши шадиди буққаҷаҳои се генотип дар шароити баландкӯҳ гузаронида шуд.

Тафовутҳои назаррас дар суръати афзоиш ба ғоиди хароҷоти хӯрок аз ҷиҳати афзоиши вазни зинда таъсири ҳалкунанда расонданд (ҷадвали 4.2.3).

Таҳлили маълумоти ҷадвал нишон медиҳад, ки хароҷоти хӯрок дар воҳидҳои хӯрок барои парвариши буққаҷаҳои ҷавон то 8 моҳа 58,3% аз хароҷоти парвариши буққаҷаҳои аз таваллуд то 18 моҳа барои гурӯҳи буққаҷаҳои типии тоҷикӣ 58,4% барои гурӯҳи буққаҷаҳои дурага ва 59,5% барои гурӯҳи чорвои маҳаллӣ буд, зеро дар чорводорӣ гӯштӣ, ҳамаи хароҷоти хӯрок барои парвариши чорво баъди буққаҷаҳои ҷавон то 9 моҳа тақсим карда мешаванд.

Истеъмоли солонаи хӯроки буққаҷаҳои аз чорвои маҳаллӣ нисбат ба ҳамсолони онҳо дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ каме камтар буд.

Чадвали 4.2.3. - Харочоти хӯроки чорво барои як сар ва 1 кг афзоиши вазни зинда аз рӯйи давраи афзоиш (аз ҷумла харочоти нигоҳдории гов)

Гурӯҳ	Давраи синну сол, моҳ	Афзоиши вазни зинда, кг	Харочоти хӯроки чорво, воҳидҳо, кг	Истеъмоли хӯроки чорво, воҳидҳо Барои 1 кг афзоиш
I	0-8	132,4	1847,2	13,9
	8-14	77,0	1072,8	13,9
	14-19	104,7	1039,5	9,9
	0-21	355,5	3959,5	11,1
II	0-8	146,1	1926,6	13,2
	8-14	88,8	1122,0	12,6
	14-19	108,9	1071,0	9,8
	0-21	385,5	4419,6	10,7
III	0-8	136,0	1978,8	14,5
	8-14	78,8	1130,8	14,4
	14-19	106,2	1008,0	9,5
	0-21	357,0	4117,6	11,5

Аммо, дар ҳама давраҳои синну солӣ, афзоиши вазни зинда дар буққаҳои маҳаллӣ ба таври назаррас камтар буд, ки боиси паст шудани харочоти хӯроки онҳо гардид.

Сарфи назар аз он, ки аз 8 то 18 моҳа, буққаҳои ҳама гурӯҳҳо дар шароити комилан якхелаи ғизодиҳӣ ва нигоҳдорӣ қарор доштанд, буққаҳои маҳаллии барои як кг афзоиш 0,8 воҳиди хӯрок сарф карданд. Ин нисбат ба ҳамтоёни худ зиёдтар аст. Истеъмоли нисбатан баланди хӯрок барои як кг афзоиши вазни зинда барои типҳои тоҷикӣ 10,0 воҳиди хӯрок қобили таваҷҷӯҳ аст:

Мо боварӣ дорем, ки инро бо он шарҳ додан мумкин аст, ки дар ин давраи афзоиш афзоиши вазни онҳо 21,6 кг (5,7%) нисбат ба гурӯҳи назоратӣ камтар буд. Умуман, дар тамоми давраи таҷрибавӣ, истеъмоли хӯрок барои як воҳиди афзоиши вазни зинда 13,3 воҳиди хӯрокро ташкил дод, ки 0,4 воҳиди хӯрок (2,9%) нисбат ба гурӯҳи маҳаллӣ камтар аст.

Таҳлили натиҷаҳои бадастомада нишон дод, ки пасттарин истеъмоли хӯрок барои як кг афзоиши вазни зинда ҳангоми парвариши буққаҳои 14-19 моҳа ба даст омадааст. Гарчанде ки дар ин давра фарқиятҳо дар харочоти байни генотипҳо мушоҳида мешаванд, онҳо ночизанд.

Дар давраи ниҳони парвариш, истеъмоли хӯрок нисбатан баланд буд, ки ин аз афзоиши миёнаи вазни зиндаи буқчаҳо дар ҳамаи гурӯҳҳои тадқиқшуда вобаста аст. Дар давраи 20-моҳагии парвариш, буқчаҳои гурӯҳи II камтарин миқдори хӯрокро барои як кг афзоиши вазн - 10,7 кг воҳиди хӯрок истеъмол карданд, ки мутаносибан 0,4 ва 0,8 воҳиди хӯрок камтар аз гурӯҳҳои I ва III аст.

Маълумоти ҷадвал нишон медиҳад, ки унсурҳои асосии хароҷот барои парвариши буқчаҳо аз хӯрок, музди меҳнат ва дигар хароҷоти мустақим иборатанд.

Ҳангоми ҳисоб кардани хароҷоти хӯроки чорво, ки ба арзиши истеҳсолот дохил карда шудааст, хӯроки чарогоҳ, зеро он арзиши пулӣ надорад, одатан ба ҳисобҳо дохил карда нашудааст.

Хароҷоти мустақими дигар низ саҳми назарраси унсурҳои хароҷотро барои истеҳсоли гӯшти гов ташкил медоданд, ки қисми зиёди он аз ҳисоби хароҷоти нақлиёт ба ҳисоб мерафт.

Ин пеш аз ҳама ба мушкилоти назаррас ва масофаҳои дур ҳангоми интиқоли чорво, хӯрок ва дигар молҳои зарурӣ барои фаъолияти соҳа вобаста аст.

Хароҷоти кунунии парвариши ҳайвонот боиси хароҷоти нисбатан баланд барои як воҳиди афзоиши вазни зинда гардидааст. Тафовутҳо байни зотҳо низ муайян карда шудаанд.

Муайян карда шуд, ки фоизи арзиши афзоиши чорвои маҳаллӣ 4350 сомониро ташкил дод, ки 170,0 сомонӣ нисбат ба буқчаҳои типӣ тоҷикӣ ва 210,0 сомонӣ нисбат ба буқчаҳои ҳамсолони дурага зиёдтар аст. Бояд қайд кард, ки барои ин нишондиҳанда арзиши буқчаҳои дурагаи гурӯҳи II нисбат ба буқчаҳои типӣ тоҷикии ҳамагӣ 40,0 сомонӣ гарантар буд.

Арзёбии иқтисодии тадқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки чаронидани буқчаҳои ҷавон то синни 8 моҳ ва баъдан парвариши шадид то 20 моҳ аз ҷиҳати хароҷот самаранок аст.

Ҷоиданокии буқчаҳо барои гурӯҳи типӣ тоҷикии популятсияи

Кангурти 62,2%, барои чорвои дурагашуда - 57,0% ва барои букҷаҷаҳои зебумонанди маҳаллӣ - танҳо 22,0% -ро ташкил дод.

Дар натиҷа, ҳатто бо хароҷоти баланди хоҷагӣҳо барои нигоҳдории подаи гӯштӣ, парвариши чорвои гӯштӣ ва ташкили дурагакунӣ бо истифода аз давраи ҷароғоҳ дар парвариши чорвои ҷавон бо истифода аз технологияи парвариши чорвои гӯштӣ, имконпазир аст, ки захираҳои моддӣ ва техникӣ, махсусан ҳӯроки чорвои ғалладона ба таври назаррас кам карда шаванд ва идоракунии ғойдаовари соҳа таъмин карда шавад.

Ҳамин тариқ, имкониятҳо дар технологияи истеҳсоли гӯшт кушода мешаванд. имконияти кам кардани бечунучарои нархи арзиши он - 2,2-1,2 маротиба, дар муқоиса бо он чизе, ки дар аксари хоҷагӣҳои минтақаҳои баландкӯҳ ба вуҷуд омадааст.

БОБИ 5. ТАҲЛИЛИ НАТИҶАҶОИ ТАДҚИҚОТ

Тадқиқоти оид ба омӯзиши муқоисавии хусусиятҳои хоҷагидорию биологии бӯқчаҳои типҳои тоҷикӣ, зоти маҳаллии зебу ва дурагаҳои онҳо дар шароити кӯҳҳои ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлони Тоҷикистон гузаронидашуда ба мо иҷозат медиҳад, ки хулосаҳои зеринро пешниҳод намоем.

Қорҳои илмӣ тадқиқотӣ оид ба бавучуд овардани типҳои қорҳои қалони серғӯшти тоҷикӣ аз тарафи олимони соҳаи қорводорӣ ба анҷом расонида шуд ва ин тип дар натиҷаи қорҳои илмӣ бисёрсола бо истифода аз қорҳои серғӯшти қазоқии қарсафед ба вучуд оварда шуданд, ки ба шароити минтақаҳои кӯҳӣ назди кӯҳӣ мутобиқ мебошанд.

Қаршумори асосии зоти қазоқии қарсафедро ба Қумҳурии Тоҷикистон аз соли 1958 қар қарда ворид намудаанд. Зоти мазкур барои беҳтар қардани маҳсулноқӣ ва сифати ғӯштии қорҳои маҳаллӣ равона қарда шуда буд. Ба 1 январи соли 1990 дар хоҷагҳои минтақаи Қӯлоби вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи қумҳурӣ қаршумори қорҳои зоти қарсафеди қазоқӣ зиёда аз 30 ҳазор қарро ташкил меод. Дар айни замон дар қумҳурӣ зоти мазкур барои дурағақунии саноатӣ, гибридақунонӣ ва афзоишдиҳии асизотӣ истифода ва парвариш қарда мешаванд. Аз қиҳати маҳсулноқии ғӯштӣ ва самараноқии қарфи хӯрок, бо ҳама зотҳои ғӯштии қаҳонӣ рақобатқазир буда, ба стандартҳои байналмилалӣ мувофиқат менамоянд. Дар қароғоҳҳои минтақа ҳудро нағз ҳис менамояд ва ба қардиҳои зимистон ва гармиҳои тобистон мутобиқ мебошанд.

Бунёди типҳои серғӯшти тоҷикӣ дар асоси қорҳои селеқсионии зоти қарсафеди қазоқӣ дар хоҷагҳои зотпарварию ба номи С. Сафаров-и ноҳияи Балқувон, хоҷагҳои «Қангурт» ва «Файзобод»-и н. Темурмалик ва дар хоҷагҳои инфиродии ноҳияҳои Балқувон ва Ховалинг гузаронида шуд.

Накшаи - офаридани типи чорвои калони сергӯшти тоҷикӣ интихоби чорвои аввалин тавассути ворид кардани говҳо ва буққаҳои наслдиҳандаи зоти гӯштии қазоқии сарсафед аз хоҷагиҳои мамлакати Қазоқистон ва Федератсияи Россия ба хоҷагии “Қаҳрамон” (ҳоло хоҷагии зотпарварии С. Сафаров) ворид гардида, гузаронида шудааст. Дар маҷмӯъ, 377 сар гову ғуночини 16-17 моҳа бо вазни миёнаи як сар 305,6 кг ворид карда шуд.

Дар як шароити технологӣ парвариш кардан бо сарфи аз ҳад зиёди хӯроки чарогоҳ 35—40% аз сарфи умумии он, ҳамаи буққаҳо дар ҳолати сарфи умумии хароҷот то 20-моҳагӣ бо 3,3—3,6 ҳазор воҳиди хӯрока ба нуқтаи баланди фарбеҳӣ расиданд.


Дар баробари ин, вазни зиндаи буққаҳои типи тоҷикӣ (гурӯҳи III), дурага (гурӯҳи II) ва зебуи маҳаллӣ (гурӯҳи I) мутаносибан 389,4 382,2 ва 338,0 килограммро ташкил дод. Буққаҳои дурага расиши бармаҳал дошта, то 12-моҳагӣ ба таври шиддатнок афзоиш ёфтанд, ки ин ба истеҳсоли гӯшти хушсифати ғӯсолагӣ мусоидат мекунад.

Буққаҳои чорвои сергӯшти типи тоҷикӣ (гурӯҳи III) дар синни 20-моҳагӣ бо вазни зинда нисбат ба ҳамсолони чорвои маҳаллӣ (гурӯҳи I) ба 51,4 килограмм (13,2%, $P < 0,001$) ва дурагаҳо (гурӯҳи II) 7,2 килограмм (1,8%) бартарӣ доштанд.

Чорвои калони сергӯшти типи тоҷикӣ ҳамчун зоти падарӣ дар ҷуфтikuнонии саноатӣ дар шароити баландкӯҳ маҳсулнокии баланди гӯштӣ нишон дода, ба мустаҳкам шудани генофонди чорво, иқтидори хоҷагӣ, дар зиёд намудани истеҳсоли гӯшти гов, самаранок пеш бурдани чорводорӣ дар шароити ҳоси хоку иқлим ва хӯроки чарогоҳҳои баландкӯҳҳои вилояти Хатлони Тоҷикистон мусоидат мекунад.

Дар вақти омӯختани самарайи ҷуфтikuнонӣ чорвои беҳтаршудаи маҳаллӣ бо истеҳсолкунандагони чорвои калони сергӯшти типи тоҷикӣ дар шароити минтақаи кӯҳсор бо технологияи нигоҳубин, то 8-моҳагӣ парвариш кардани чавонаҳо ва дар давраҳои минбаъдаи синну сол аз

чорводории гӯштӣ, ки аз тарафи умум қабул шудааст, амалан фарқ намекард.



Расми 3.12. - Говҳо бо гӯсалаҳояшон дар чарогоҳҳои тобистона

Букчаҳои навзоди типи тоҷикӣ ва дураҳои ду зот аз ҷиҳати вазни зиндаи баландтарин фарқ мекарданд, ки дар ин нишондиҳанда дураҳо нисбат ба букчаҳои маҳаллии зебумонанд 2,5—6,1 килограммӣ бартарӣ доштанд.

Букчаҳои типи тоҷикӣ (гурӯҳи III) дар 20-моҳагӣ аз маҳаллиҳои худ 51,4 килограмм зиёд ва нисбат ба ҳамсолони дураҳои худ 7,2 килограмм вазнинтар буданд.

Нишондиҳандаҳои беҳтарини шиддатнокии афзоиши вазни зинда, инчунин инкишофи шаклҳои бадан, ки гӯштнокии чорворо муайян мекунанд, ба чорвои типи тоҷикӣ хосанд. Дураҳо аз ҳама ҷиҳат мавқеи фосилавиرو ишғол мекарданд, гарчанде насли дурага ҳамаҷиҳата ба ҳамсолони тозазоти худ наздик мешуд.

Нишондиҳандаҳои камтарин бо вазни зинда, ченакҳои хаттӣ ва нишондиҳандаҳои бадан, ки дараҷаи ташаккули гӯштнокиро тавсиф мекунанд, дар букчаҳои чорвои маҳаллӣ фарқ мекарданд. Микдори эритроцитҳо ва гемоглобин дар хуни чорвои ҳамаи гурӯҳҳо дар фасли тобистон ва дар фасли зимистон аз меъёри физиологӣ берун намебаромад.

Микдори эритроцит ва лейкоцит дар хуни чорвои ҳамаи гурӯҳҳо чи дар тобистон ва чи дар зимистон ба меъёри физиологӣ мувофиқ буд.

Қайд карда шуд, ки нишондиҳандаҳои таркиби морфологии хун хеле баланд буда, дар байни чорвои генотипашон гуногун фарқи калон дида намешавад.

Дар нишондиҳандаҳои нисбии мубодилаи энергияи газ дар буқчаҳо ба ҳисоби 1 килограмм вазни зинда дар фасли тобистон нисбат ба зимистон тағйироти калон ба амал омаданд, гарчанде майли паст шудан доштанд. Мо инро ба он вобаста менамоем, ки дар тобистон нисбат ба зимистон шиддати афзоиш ва инчунин сарфи энергия дар чорвои ҳамаи гурӯҳҳо хеле зиёд буд. Ҳамин тавр, дараҷаи баландтари маҳсулнокии буқчаҳои гурӯҳи II ва III бо гузаштани мубодилаи шиддатнокии газу энергия дар бадани онҳо мушоҳида мешуд.

Дураҳо, чун қоида, дар ҳама давраҳои синнусолӣ мавқеи миёнаро ишғол карданд. Чорвои маҳаллӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои мубодилаи газ бо беҳтар мутобиқ шудани организми худ ба шароити паст будани оксиген хос буд, гарчанде дараҷаи мубодилаи газу энергия ба маҳсулнокии ин чорво мувофиқ буд.

Типи нави чорвои сергӯшти тоҷикии бавучудовардашуда дар давраи нишондодашуда бо афзоиши нисбатани вазни тана фарқ мекард. Чунин тамоюл дар дураҳои онҳо низ мушоҳида карда шуд. Ин хоси он аст, ки дар 20-моҳагӣ чорвои гурӯҳҳои I ва II бо гузоштани хеле бештари чарбуи дохилӣ нисбат ба ҳамсолони гурӯҳи III тавсиф карда шуданд.

Паст шудани шиддати афзоиши тана ва пурзӯр шудани раванди зиёдшавии рағани дохилиро ба назар гирифта, ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки пас аз 20-моҳагӣ парвариш кардани буқчаҳои типии тоҷикӣ дар шароити Кангурти ноҳияи Темурмалик мувофиқ нест.

Ҳангоми омӯзиши сифатҳои маҳсулнокии буқчаҳои генотипашон гуногун дар истеъмоли хӯрок аз ҷиҳати арзиш байни буқчаҳои гурӯҳҳои таҳқиқшуда аз рӯи технологияи анъанавии парвариши чарогоҳӣ тафовути калон ошкор гардид.

Букқачаҳои гурӯҳҳои III ва II қариб дар ҳамаи ҷенақҳо нисбат ба ҳамсолони худ ва гурӯҳи I бартарӣ доштанд. Ин бартариро хусусан аз рӯи андозагирии пахноӣ ва чуқурӣ дар тамоми давраи парвариш мушоҳида кардан мумкин аст.

Ҳангоми муқоиса кардани ҷорҳои таҷрибавӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои бадан букқачаҳои гурӯҳи III ва II бадани мутаносиб, устухонҳои мустаҳкам ва нисбатан мустаҳкам, дасту пойҳояшон кӯтоҳтар, букқачаҳои гурӯҳи I пасттар афзоишёфта, оммавӣ ва бештар фурӯрафта буданд.

Нишондиҳандаҳои клиникалии гематологии букқачаҳои таҷрибавиро муқоиса намуда, қайд кардан лозим аст, ки дар букқачаҳои гурӯҳи I нишондиҳандаҳои таҳқиқшуда баландтаранд, ки ин аз афташ, аз шиддати бештари равандҳои мубодилаи моддаҳо дар организми онҳо баамаломатаи иқлим, ба шароити ҳӯронидан ва мутобиқшавии баланди организм таъсири мусбат мерасонад.

Дар ҷароғоҳ нигоҳ доштан имконият медиҳад, ки аз алафҳои табиӣ ҷароғоҳ пурмахсул истифода бурда шавад. Дар давоми 153 рӯз аз ҳар сар ҷорҳои дураға ба ҳисоби миёна 108,1 килограммӣ мутлақ ба ҳисоби миёна 716 грамм афзоиши вазни зинда ба даст оварда шуд. Мувофиқи он, дар зебуи маҳаллӣ 104,7 ва 689, дар типӣ тоҷикӣ 106,2 ва 699,2 грамм сарфи ҳӯроки ҷорво ба ҳисоби миёна ба ҳар 1 килограмм афзоиши вазни зинда 12,41—12,76 воҳиди ҳӯрокаро ташкил дод.

Нишондиҳандаҳои берунии букқачаҳои типӣ тоҷикӣ, зебуи маҳаллӣ ва дурағаҳои онҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки дурағаҳои аввали онҳо нисбат ба ҳамсолони худ бартарӣ доранд. Дар онҳо қаваси синаи афзоишёфта, дарозии қачи бадан, чуқурӣ ва пахноии сина беҳтар инкишофёфта мебошанд.

Омӯзиши маҷмуи нишондодҳои клиникӣ, физиологӣ, морфологӣ ва дигари ҷорво дар бораи қобилияти баланди мутобиқшавии онҳо ба шароити минтақаи кӯҳии табиӣ экологии маҳали Тоҷикистон шаҳодат медиҳад.

Консентратсияи элементҳо ва чузъҳои ҳосилшудаи плазмаи хун шиддатнокии равандҳои мубодилаи моддаҳоро тасдиқ ва афзоишу инкишофи муътадили букқачаҳоро дар ҳама давраҳои синнусол таъмин мекунанд.

Бо технологияи чарогоҳпарварӣ ва фарбехкунӣ букқачаҳои ҳамаи гурӯҳҳои тадқиқшудаи I, II ва III дар синни 20-моҳагӣ мутаносибан ба вазни зиндаи 338,0; 382,2 ва 389,4 килограмм расиданд.

Зиёдшавии вазни зиндаи букқачаҳои типи тоҷикӣ нисбат ба чорвои маҳаллӣ ва дурагаҳо 51,4 - 7,2 килограмм буд. Дар чорвои маҳаллӣ афзоиши миёнаи шабонарӯзии вазни зинда 64 г (11,1%, $P < 0,01$) ва 74 г (12,8%, $P < 0,01$) назар ба гурӯҳҳои дурагаи II ва III кам аст.

Ба гурӯҳҳои таҷрибавии чорво маҳсулнокии хуби гӯшт хос аст. Вазни танай нав забҳшудаи ҷавонаҳои гурӯҳи III ба 37,0 кг (18,2%) ва вазни забҳшуда назар ба чорвои маҳаллӣ— 58,2 килограмм (37,0%, $P > 0,999$) зиёд буд. Ҳангоми забҳ дар синни 20-моҳагӣ аз саршумори типи тоҷикӣ 203,3 килограмм, аз дурагаҳо 202,1кг, аз зебуи маҳаллӣ 166,3 килограмм тана гирифта шуд. Маҳсулнокии гӯшт 55,5—56,1% -ро ташкил дод.

Букқачаҳои гурӯҳи III аз рӯи арзишҳои мутлақ ва нисбии таркиби гӯшти беустухон ва бофтаи мушакҳо дар тана фарқ мекарданд. Баромади гӯшти беустухон умуман дар букқачаҳо 75,6—79,9%, бо устухон 18,3—22,8%, бо нишондиҳандаи гӯштнокӣ 4,36—3,31 килограммро ташкил дод.

Аз букқачаҳои типи тоҷикӣ, дурагаҳо ва букқачаҳои зебуи маҳаллӣ дар синни 20-моҳагӣ гӯшти хушсифат гирифта шуд. Микдори сафеда дар гӯшт аз рӯи гурӯҳҳо оптималӣ буда, 22,58 ва 22,87%, равшан мутаносибан — 2,81; 2,98 ва 3,24%-ро ташкил дод.

Гӯшти чорвои ҳамаи гурӯҳҳо аз рӯи нишондодҳои баланди сафеда (6,0-6,1) ва арзиши энергетикӣ (6,83; 6,86 ва 7,01 МДЧ) фарқ карда шуд.

Дар вақти забҳи чорвои ҳамаи гурӯҳҳои ҷавонаҳо ашёи хоми вазнини чарм гирифта шуд. Пӯстҳо ҳамчун "Бӯққачагии вазнин" баҳо

дода шуданд. Пӯстҳои коркардшуда барои болопӯшҳо (хромӣ), барои тағ (дубҳои сурх), барои поёни пойафзол аз рӯи хосиятҳои молӣ ва технологӣ, таркиби химиявӣ ва сифатҳои физикию механикӣ ба талаботи меъёрҳои ГОСТ 938-21-71, ОСТ 17 ва ГОСТ 1010-78.-285-80 мувофиқат мекунанд.

Дар вақти парвариш кардан ва ба гӯшт супоридани як сар буқча аризи аслии 1 сентнер афзоиши чорвои маҳаллӣ 4350 сомонӣ назар ба чорвои типӣ тоҷикӣ 170,0 сомонӣ кам ва нисбат ба ҳамсолони дурағи - маҳаллӣ 210,0 сомонӣ кам шуд.

Бояд қайд кард, ки аз рӯи ин нишондиҳанда дар чорвои дурағи гурӯҳи II аризи аслии он нисбат ба типӣ нави тоҷикӣ ҳамагӣ 40,0 сомонӣ қимат шуд, ҳол он ки хароҷоти хӯроки ба ҳар килограмм афзоиши вазни зинда 10,3 11,7 воҳиди хӯрока бо даромаднокии гӯшти гови истеҳсолшуда 22,0; 57,0 ва 62,2%-ро ташкил дод.

Ҳамин тариқ ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар асоси корҳои иҷрогардида бо ташаббуси бевоситаи олимон, намоёндагони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ва мутахассисони Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи 28 декабри соли 2019 семинари илмӣ - амалии минтақавӣ «Рушди соҳаи чорвои сергӯшт ва самтҳои афзалиятноки он», дар хоҷагии ҷамоавии “Кангурт”-и ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон баргузор гардид. Дар семинари мазкур оиди ба пешниҳоди типӣ чорвои сергӯшти тоҷикӣ масъалагузорӣ карда шуд.

Дар айни замон аз рӯи нишондодҳои истеҳсолӣ дар хоҷагии Кооперативи “Кангурт” ва хоҷагии деҳқонии “Файзобод”-и ноҳияи Темурмалик саршумори чорвои сергӯшти типӣ тоҷикӣ ҳамагӣ 500 сар, дар хоҷагии ба номи С. Сафарови ноҳияи Балҷувон ва аҳоли 240 сар ва дар хоҷагиҳои ноҳияҳои Ховалинг 300 сар, ҷамъоҷамъ 1040 сар чорвои калони сергӯшти типӣ тоҷикӣ парвариш меёбанд.

Дар асоси дастур оид ба апробатсияи дастовардҳои селекционӣ дар чорводорӣ барои пешниҳод намудани типӣ чорвои сергӯшти тоҷикӣ аз

саршумори чорвоҳои парваришбандаи ноҳияҳои Темурмалик, Балҷувон ва Ховалинг ва корхонаҳои инфиродӣ - ҳамаги 1040 сармиқдори муайяни ин саршумори ба стандарти зотӣ ҷавобгӯӣ муайян карда ба ҳисоб гирифта шудааст:

Аз ҷумла саршумори чорвои модина – 550 сар

Саршумори буққаҳои наслӣ – 35 сар

Ҷавонаҳои то 3-сола 200 сар

Дар натиҷаи муайян намудани қобилияти мутобиқшавӣ, тартиб додани нақшаи интихоб ва хостагирӣ барои ташкили подаҳои селекционӣ ва такрористехсолкунӣ, сохти конститутсионӣ, намуди беруна (экстерер), муайян кардани таркиби хун, гӯшт, пуст, нафаскашӣ, таркиби химиявии гӯшт ва равған, таркиби морфологии тана (туш), таркиби ғизои гӯштӣ, тана ва бадан дар подаҳои хоҷагиҳои зотпарварӣ ва деҳқонӣ парвариши саршумори чорвои гӯштӣ бо ду роҳ гузаронида шуд. Дар натиҷа 2 гурӯҳи гомологӣ ва 4 оила дар ду ноҳияҳои Темурмалик ва Балҷувони вилояти Хатлон ташкил карда шуд.

Дар асоси пурра омӯхтани чорвои ба апробатсия гузошта шуда, дар 3 хоҷагии зотпарварӣ ва 5 хоҷагии деҳқонӣ ва тафтиши тамоми ҳуҷҷатҳо вобаста ба онҳо, комиссияи озмоишӣ ба чунин ҳулоса омаданд:

1. Аз тарафи олимони Институти чорводорӣ ва ҷарогоҳи АИКТ ва намояндагони хоҷагиҳо, идораҳои кишоварзии вилоятӣ ва ноҳиявӣ, ҳамчунин мутахассисони хоҷагиҳои зотпарварӣ типӣ нави чорвои калони сергӯшти тоҷикӣ офарида шуд.

2. Дар типӣ мазкур маҳсулнокии баланди генеалогии Файзобод №4312 ва Мерган №1215 гузошта шудааст. Ҳайвонҳо вобаста ба намуди беруна (экстерер), вазни зинда, сатҳи маҳсулнокии гӯшт ва қобилияти мутобиқшавӣ ва ба талаботҳои навъи заводӣ мувофиқ буда ва метавонад беҳтарин дастоварди селекционӣ ҳисоб карда шаванд.

3. Хоҷагиҳои зотпарварӣ ва хоҷагиҳои деҳқоние, ки дар онҳо ин тип парвариш карда мешавад, базаи устувори таъминкунандаи маҳсулот

ё саршумори зотӣ дар дохили кишвар, бе тавассути воридот аз дигар минтақаҳо ва ҷумҳуриҳо, сифатҳои зотӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокии гӯшт дар хоҷагиҳои ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад.

ХУЛОСАҲО

Аз рӯи натиҷаҳои корҳои анҷомдодашуда хулосаҳои зерин баровардан мумкин аст:

1. Типи тоҷикии чорвои гуштӣ дар натиҷаи тадқиқоти ҷандинсолаи олимону мутахассисон аз соли 1958 дар шароити куҳсор ба вучуд оварда шудааст. Бо Қарори №1/2 Коллегияи Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 апрели соли 2023 тасдиқ шудааст.

2. Вазни зиндаи букҷаҷаҳо дар вақти таваллуд дар гуруҳи I - 20,3 килограмм, дар гуруҳи II - 25,0 килограмм ва дар гуруҳи III - 25,3 килограмм ё бартарии он дар гуруҳи III мутаносибан 19,8 фоиз ва 18,8 фоизро ташкил дод. Дар синни 20-моҳа ин бартарият, мутаносибан, 11,6% (15,21%) ва 13,2% (1,88%) буд. Вазни зиндаи чорвои типӣ тоҷикӣ 389,4 килограмм, дураҷаҳо — 382,2 килограмм ва маҳаллӣ 338,0 килограммро ташкил дод. [1-M], [4-M], [5-M].

3. Ба ҳамаи генотипҳои таҳқиқшудаи букҷаҷаҳо дар давраи аз 0 то 18-моҳа афзоиши миёнаи шабонарӯзӣ хос буд, вале бартариятро букҷаҷаҳои гуруҳи III нишон доданд. Ин бартариятро букҷаҷаҳои гуруҳҳои II ва III дар давраи аз 0 то 20 моҳа нигоҳ доштанд ($P < 0,01$). Суръати нисбии афзоиши букҷаҷаҳои гуруҳи III аз 12 то 20-моҳа 60,13 фоизро ташкил дод, ки ин назар ба букҷаҷаҳои гуруҳи I 19,03 фоиз ва назар ба букҷаҷаҳои гуруҳи II 12,5 фоиз зиёд аст. Аз давраи таваллуд то 20-моҳа суръати афзоиши нисбии букҷаҷаҳои гуруҳи II — 175,60 фоиз, гуруҳи III — 175,43 фоиз, гуруҳи I — 163,70 фоизро ташкил дод. [1-M], [4-M], [5-M].

4. Букҷаҷаҳои типӣ тоҷикӣ дар синни 20-моҳа дар аксари ҳамаҷаҳо ва нишондиҳандаҳои ҳолати бадан нисбат ба говҳои маҳаллӣ ва дураҷа бартарӣ нишон доданд.

5. Вазни зиндаи букҷаҷаҳо пеш аз фарбеҳкунӣ дар гуруҳи I - 235,5 килограмм, дар гуруҳи II - 254,4 килограмм ва дар гуруҳи III - 260,8 килограммро ташкил дод. Дар давоми 153 рӯзи фарбеҳкунӣ вазни

зиндаи онҳо гуногун буд. Масалан, дар ин давра вазни зиндаи букқачаҳои гуруҳи III - 104,5 килограммро зиёд шуда, назар ба ҳамсолони гуруҳи I - 12,3 килограмм ва гуруҳи II - 10,2 килограмми бартари доштанд.

6. Вазни кушташудаи танай букқачаҳои гуруҳи III нисбатан баланд буд - 203,3 кг ё нисбат ба букқачаҳои гуруҳи I - 22,25 фоиз ва ба букқачаҳои гуруҳи II - 0,59 фоиз зиёд мебошад. Баромади гӯшт дар гуруҳи I - 56,4 фоиз, дар гуруҳи II - 59,34 фоиз ва дар гуруҳи III - 55,29 фоизро ташкил дод. Букқачаҳои гуруҳи III баромади зиёди гӯшти лахм дошт — 76,7 кг, ки ин назар ба ҳамсолони гуруҳи I ва II мутаносибан 18,96 ва 3,94 килограмм зиёд мебошад. [2-М, [4-М], [5-М], [8-М], [9-М], [10-М].

7. Гуногунии генотипии букқачаҳо ба сифати гӯшт низ таъсир расонд. Аз чумла, миқдори сафеда дар таркиби гӯшт ба ҳисоби миёна дар гуруҳи I - 21,7; II - 21,8 ва III - 20,5 фоизро, раған бошад, мутаносибан, 8,7; 7,9 ва 8,9 фоизро ташкил дод. Арзиши энергетикӣ қисми гӯшт ба 1 килограмм вазни зинда аз рӯи гуруҳҳо 6,83; 6,86 ва 7,01 МҶ-ро ташкил дод. [4-М], [5-М], [7-М].

8. Майдони пӯсти букқачаҳои гуруҳи III - 158 фоиз, гуруҳи I - 129 фоиз ва гуруҳи II - 149 фоизро ташкил дод. Мувофиқи он пӯсти букқачаҳои типӣ тоҷики ва дурагаи онҳо ба навъи сеюм ва гуруҳи I ба навъи чорум дохил карда шуд. [4-М], [5-М].

9. Даромаднокии парвариши букқачаҳои типӣ тоҷикӣ 62,2 фоиз, дурагҳо — 57,0 фоиз, чорвои маҳаллӣ бошад ҳамагӣ 22,0 фоизро ташкил дод. Ҳамин тариқ, дуруст интиҳоб кардани генотипҳои чорво ва технологияи оптималии парвариши онҳо имконият медиҳад, ки истеҳсоли гӯшт зиёд ва арзиши аслии он 1,2—2,2 баробар кам карда шавад. [4-М], [5-М].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ТАТБИҚИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАДҚИҚОТ

Барои баланд бардоштани истеҳсоли гӯшти аз ҷиҳати экологӣ тоза истифодаи системаи парвариши бӯқчаҳо дар ҷароғоҳо самаранок мебошад.

Бинобар ин сабаб ба хоҷагӣҳое, ки бо парвариши ҷорҳои гӯштӣ машғул мебошанд, тавсия дода мешавад саршумори типӣ тоҷикии сергӯштро зиёд намуда аз он бо таври васеъ истифода намојанд.

РУЙХАТИ АДАБИЁТ ИСТИФОДАШУДА

1. Алентаев, А.С. Эффективность межпородного скрещивания ауэлитанского скота с голштинскими быками в зоне юга Казахстана / А.С. Алентаев // Докл. ТСХА. 2003. №275. С. 429-432.
2. Амерханов, Х. Эффективность отбора производителей по собственной продуктивности в мясном скотоводстве / Х. Амерханов, В. Хайнацкий, Ф. Каюмов, С. Тюлебаев // Молочное и мясное скотоводство. - 2011. - №. 3. - С. 2-5.
3. Амерханов, Х.А. Племенные захираы в развитии специализированного мясного скотоводства / Х.А. Амерханов, Ф.Г. Каюмов // Вестник мясного скотоводства. - 2003. - Т. 3. - № 62. - С. 3-7.
4. Артюхина, И.Н. Эффективность голштинизации черно-пестрого скота / И.Н. Артюхина, О.А. Гриненко // Зоотехния. 2001. №5. С. 4-6.
5. Ахмедов, Д.М. Особенности экстерьера и изменение линейных промеров тела бычков разного генотипа / Д.М. Ахмедов, В.И. Косилов, Т.А. Иргашев // Пища. Экология. Качество: Труды XIII международной научно-практической конференции. - Красноярск. - 2016. С. 101-105.
6. Ахмедов, Д.М., Иргашев, Т. А. Изучение особенностей кожно-волосяного покрова бычков разного генотипа//Современное состояние и перспективы развития кормопроизводства и ратсионального кормления животных: Мат. Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 1-2 декабря 2022 г. - Уфа: Башкирский ГАУ, 2022. С.253-258.
7. Багрий, Б.А. Технология производства говядины на промышленной основе / Б.А. Багрий // Оренбург. ВНИИМС. 1985. С. 115.
8. Багрий, Б.А. Племенная работа в мясном скотоводстве / Б.А. Багрий, Э.Н. Доротюк. М.: Колос, 1979. 272 с.
9. Бакай, А.В. Воспроизводительная способность голштинизированных помесей черно-пестрой породы в условиях Южного Урала / А.В. Бакай, Н.Е. Добровольская, Ю.Н. Добровольский // Современные проблемы

зоотехнии и агробизнеса: сб. науч. тр. Моск. гос. акад. вет. мед. М., 2003. С. 4-5.

10. Басангов, А.П. Из опыта оценки быков-производителей калмыцкой породы по качеству потомства / А.П. Басангов // Кн.: Мясное скотоводство и овцеводство Калмыкии. Научные труды КНИИМС, вып.5, (II). 1978. С. 29-37.

11. Басангов, А.П. Мясная продуктивность потомков бычков-производителей основных линий калмыцкой породы / А.П. Басангов // Племенная работа в мясном скотоводстве. ВАСХНИЛ. М.: Колос. 1980. С.25-31.

12. Басангов А.П. Оценка быков-производителей основных линий калмыцкой породы по мясным качествам потомства // Дисс ... канд. с.-х. наук. - М., 1975.

13. Багрий, Б.А. Технология производства говядины на промышленной основе/ Б.А. Багрий. - Оренбург: ВНИИМС, 1995. - С. 115.

14. Бельков, Г.И. Использование лимузинской породы для повышения продуктивности молочно-мясных пород / Г.И. Бельков, В.А. Панин // Достижения науки и техники АПК. - 2010. - № 10. - С. 45 – 46.

15. Бельков, Г.И. Мясная продуктивность бычков-кастратов симментальской, красной степной пород и их помесей с лимузинской породой / Г.И. Бельков, В.А. Панин // Доклады РАСХН. - 2010. - №5. - С.33-35.

16. Бельков, Г.И. Научное обеспечение развития животноводства и пути повышения его эффективности / Г.И. Бельков, В.А. Панин // Современные технологии в сельском хозяйстве: матер. междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 70-летию Оренбургского НИИСХ. - Оренбург, 2007. - С. 379-388.

17. Беляев, А.И. Новый внутрипородный тип скота абердин-ангусской породы / А.И.Беляев, И.Ф. Горлов, В.И. Левахин, Е.С. Горбрых // Зоотехния. 2004. №2. С. 4-7.

18. Важенин, В.Н. Молочный скот Урала и методы его

совершенствования / В.Н. Важенин, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко // Уфа: Изд-во БНИИСХ, 2004. 694 с.

19. Виль, А.В. Рост и развитие помесного голштино-холмогорского молодняка в условиях Заполярья / А.В. Виль, А.В. Кисель, П.И. Уколов // Сб. науч. тр. Ленинградского вет. ин-та. 1990. №111. С. 18-20.

20. Владимиров, В.Л. Биохимические раванды у животных мясного направления продуктивности в связи с возрастом и разной скоростью роста / В.Л. Владимиров // Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. доктора биол. наук. Львов, 1974. 26 с.

21. Востриков, Н.И. Использование породных захираов скота разного направления продуктивности для увеличения производства говядины: автореф. дисс. докт. с.-х. наук / Н.И. Востриков. - Оренбург, 2000. - 35с.

22. Всяких, А.С. Теоретические основы племенного дела / А.С. Всяких // М. 1964. С 432.

23. Востриков, Н.И. Технология производства говядины на промышленной основе / Н.И. Востриков, Г.И. Бельков, Г.М. Туников. М.: Агропромиздат, 1988. 216 с.

24. Гайко, А.А. Интенсивное выращивание молодняка в условиях Белоруссии / А.А. Гайко, В.С. Обухович, В.И. Шляхтунов, В.В. Сычев // Молочное и мясное скотоводство. - 1996. - № 2. - С. 24 - 27.

25. Гайко А.А. Мясная продуктивность крупного рогатого скота и качество говядины / А.А. Гайко. - М.: Урожай. 1971. 208 с.

26. Гамарник, Н.Г. Нагул мясного скота в Сибири с продленным сроком выпаса / Н.Г. Гамарник, В.Ф. Петров, М.И. Рагимов // Методические рекомендации. Новосибирск: СО ВАСХНИЛ СибНИПТИЖ. 1990. 48 с.

27. Гамарник, Н.Г. Эффективность использования герефордского скота при создании отрасли мясного скотоводства в Сибири / Н.Г. Гамарник // Автореф. дисс...доктора с.-х. наук. Новосибирск. 1985. 49 с.

28. Гармаев Д.Ц. Совершенствование технологии мясного скотоводства

в условиях Забайкалья / Д.Ц. Гармаев // Дисс ... доктора с.-х. наук. Дубровицы, 2008. 397 с.

29. Гармаев, Д.Ц. Технология мясного скотоводства в Республике Бурятия: Монография. / Д.Ц. Гармаев // Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2007. 178 с.

30. Гармаев, Д.Ц. Эффективность выращивания бычков казахской белоголовой породы разных типов телосложения / Д.Ц. Гармаев, Ж.Ж. Токтохоев // Зоотехния. 2008. №3. С. 20-22

31. Гартованная, О.В. Мясная продуктивность бычков зимовниковского типа калмыцкой породы / О.В. Гартованная // Дисс ... канд. с.-х. наук. пос. Персиановский. 2008. 185 с.

32. Гармаев, Д.Ц. Экстерьерный профиль и динамика индексов телосложения молодняка красного степного скота в зависимости от пола, возраста и физиологического состояния на Южном Урале / Гармаев Д.Ц. и др. // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. – 2016, 2013 - № 1 (42). - С. 64-68.

33. Гильмияров, Л.А. Убойные качества молодняка черно-пестрой породы и ее полукровных помесей с породой обрак / Л.А. Гильмияров, Х.Х. Тагиров, И.В. Миронова // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2010. № 3. С. 15-19.

34. Гильмияров, Л.А. Убойные качества молодняка чёрно-пёстрой породы и её полукровных помесей с породой обрак / Л.А. Гильмияров, Х.Х. Тагиров, И.В. Миронова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2010. № 3 (27). С. 88-90.

35. Гильмияров, ЛА. Мясные качества молодняка черно-пестрой породы и ее помесей с обрак / Л. Гильмияров, Х. Тагиров, И. Миронова // Молочное и мясное скотоводство. - 2011. - №. 1. - С. 18-19.

36. Гомбоев, З.В. Продуктивные качества бычков калмыцкой породы разных генеалогических линий / З.В. Гомбоев // Автореф. дисс ... канд. с.-х. наук. Улан-Удэ. 2015. 18с.

37. Гомбоев, З.В. Продуктивные качества бычков калмыцкой породы разных генеалогических линий / З.В. Гомбоев // Дисс ... канд. с.-х. наук. Улан-Удэ, 2015. 113 с.
38. Гуткин, С.С. Качество туши мясного скота / С.С. Гуткин // Животноводство. 1978. № 8. С. 79-81.
39. Гуткин, С.С. Мясная продуктивность и качество мяса у бычков разных пород / С.С. Гуткин, Л.З. Мазуровски, Ф.Х. Сиразетдинов // Сб. научн.тр. ВНИИМСа. Оренбург. 2000. вып. 53. С. 51-58.
40. Гуткин, С.С. Мясная продуктивность молодняка крупного рогатого скота при интенсивном выращивании / С.С. Гуткин // Животноводство. - 1988. - № 1. - С. 46-48.
41. Джимбеев, Л.Ц. Племенной подбор и типы спаривания при разведении калмыцкого скота по линиям / Л.Ц. Джимбеев // Научные труды КНИШС, вып. 2 (8), Элиста. 1973, С. 33-41.
42. Дзюба, Н.Ф. Конверсия протеина и энергии кормов в продукты убоя бычков, выращенных на ратсионах с разным удельным весом концентратов / Н.Ф. Дзюба, О.Н. Могиленец // Научн. Тр. ВИЖа. Вып. 61. 2001. С. 85-91.
43. Доротюк, Э.Н. Мясному скотоводству - интенсивное развитие / Э.Н. Доротюк // Молочное и мясное скотоводство. - 1989. - №2. - С. 18-20.
44. Доротюк, Э.Н. Калмыцкий скот и пути его совершенствования / Э.Н. Доротюк // М.: Россельхозиздат. 1981. 144 с.
45. Доротюк, Э.Н. Мясному скотоводству – интенсивное развитие / Э.Н. Доротюк // Молочное и мясное скотоводство. 1979. №2. С. 18-20.
46. Дунин, И. Настоящее и будущее отечественного скотоводства / И. Дунин, В. Шаркаев, А. Кочетков // Молочное и мясное скотоводство. - 2012. - №. 6. - С. 2-5.

47. Дунин, И.М. Перспективы развития мясного скотоводства в России в современных условиях / И.М. Дунин, Г.И. Шичкин, А.А. Кочетков // Молочное и мясное скотоводство. - 2014. - №5. - С. 2-5.
48. 48 Емельянов, Е.Г. Совершенствование генофонда костромского скота / Е.Г. Емельянов // Зоотехния. 2004. №2. С. 2-4.
49. Еременко, В. К. Калмыцкий скот и методы его совершенствования: монография / В.К. Еременко, Ф.Г. Каюмов. М.: Вестник РАСХН. 2005. 385 с.
50. Жаймышева, С.С. Особенности поведения чистопородного и помесного молодняка крупного рогатого скота по сезонам года/ С.С. Жаймышева, В.И. Косилов, Т.А.Иргашев// Иинновационные технологии увеличения производства высококачественной продукции животноводства: матер. II междунар.научно-практической конференции Института животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук совместно с ФГБОУ ВО Башкирским государственным аграрным университетом (18-19 Октября 2018 Г.). Под общей редакции доктора б. наук Амиршоева Ф.С. и доктора с.-х. наук Иргашева Т.А. – -Душанбе: «ЭР-граф», -2018. -С.76-79.
51. Заднепрятский, И. Использование лимузинского скота в скрещивании на Белгородчине/ И. Заднепрятский // Молочное и мясное скотоводство. - 2005. - №7. - С. 10-14.
52. Зайкин, Г.Л. Использование казахского белоголового скота и симменталов разной селекции при скрещивании / Г.Л. Зайкин, Ф.Ф. Латыпов // Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию со дня рождения К.А. Аюпова: Юб. сб. науч. тр. Оренбург. 2001. С. 152-154.
53. Зеленков П.И. Испытание бычков мясных пород по собственной продуктивности за укороченный срок их выращивания и оценка производителей по качеству потомства / П.И. Зеленков, В.К. Осипова, А.А. Пудева и др. Персиановка. 1997. 19 с.

54. Иргашев, Т.А. Качество мясо бычков разного генотипа в условиях Таджикистана / Т.А. Иргашев // В сборнике: Разработка и освоение инноваций в животноводстве материалы Международной научно-практической конференции. под редакцией: В.И. Левахина. 2013. С. 114-117.
55. Иргашев, Т.А. Динамика гематологических показателей бычков таджикского типа чёрно-пестрой породы / Т.А. Иргашев, Д.М. Ахмедов // Современные тенденции в развитии овцеводства и козоводства / Сб. матер. Междунар. науч.-прак. конф. Оренбург Издательский центр ОГАУ, (Российская Федерация). - 2014. - С.111-115.
56. Иргашев, Т.А. Использование генетических ресурсов крупного рогатого скота и зебу для увеличения производства говядины. Иргашев Т.А., Косилов В.И. / Монография, Душанбе: “Донишварон”, 2017. 296 с.
57. Иргашев, Т.А. Интенсивность роста бычков калмыцкой породы и их гибридов в условиях горной зоны Таджикистана/ Т.А.Иргашев, В.И.Косилов, М. Хусайнов// Доклады ТАСХН №1 (55), Душанбе. 2018. – С. 41-46.
58. Иргашев, Т.А., Амиршоев, Ф.С.,Изатуллоев, С., Косилов, В.И., Хусейнов М., Халимов Х. Гематологические показатели крови и газообмена бычков разного генотипа в горных условиях Таджикистана / Материалы международной научно-практической конференции: «Научно-практическое обеспечение интенсивного развития животноводства и кормопроизводства на современном этапе», посвященной 90-летию со дня основания Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства (14 июня 2023 г). 2-том. Алматы. - 2023.-С. 210-215.
59. Иргашев, Т.А., Амиршоев, Ф.С., Соатов, С.С., Рофизода, Х.Х. Качественные показатели шкур зеравшанского типа памирского экотипа яков / Мат. Респуб. научно-практ. конфер. //«Роль Лидера нации в индустриализации агропромышленного комплекса страны и повышения эффективности землепользования» (24-25 ноября 2023 года). -Дангара,

2023. С.199- 202.

60. Иргашев, Т.А., Амиршоев, Ф.С., Халимов, Х. Динамика живой массы и среднесуточного прироста бычков разного генотипа в условиях горной зоны таджикистана / мат. респуб. научно-практ. конфер. //«Роль Лидера нации в индустриализации агропромышленного комплекса страны и повышения эффективности землепользования». (24-25 ноября 2023 года). -дангара, 2023. с.195-199.

61. Иргашев, Т.А., Изатуллоев, С. Морфологический состав туши бычков разного генотипа в условиях горной зоны Таджикистана/ Современные проблемы развития ветеринарной медицины и биотехнологии: Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием 31 марта 2023 г. /под общей редакцией М.С. Сеитов - Электрон. дан (1,35 Mb) - Оренбург: ФГБОУ ВО ОГАУ, Оренбург. 2023. С.231-233.

62. Иргашев, Т.А., Олимов, С.Х. Влияние премикса на мясную продуктивность бычков симментальской породы/ Современные проблемы развития ветеринарной медицины и биотехнологии: Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием 31 марта 2023 г. /под общей редакцией М.С. Сеитов - Электрон. дан (1,35 Mb) - Оренбург: ФГБОУ ВО ОГАУ, Оренбург. 2023. С.224-226.

63. Иргашев, С.Т., Ханджаров, А., Иргашев, Т.А. Природно-кормовые угодья пастбищ дангаринского массива. Эффективность выращивания сельскохозяйственных животных и птиц и роль ветеринарного обслуживания в обеспечении продовольственной безопасности РТ // Материалы международной научно - практической конференции (Душанбе, 29-30 мая 2023 г.) - Душанбе: Шарки озод, 2023, -С. 110-115.

64. Иргашев, С.Т., Ханджаров, А.Р., Иргашев, Т.А. Влияние изменение климата на растительное сообщества пастбищ центральной части гиссарского хребта Таджикистана / Материалы международной научно-практической конференции: «Научно-практическое обеспечение интенсивного

развития животноводства и кормопроизводства на современном этапе», посвященной 90-летию со дня основания Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства (14 июня 2023 г). 3-том. Алматы. -2023.-С. 90-94.

65. Иргашев, С.Т., Ханджаров, А.Р., Иргашев, Т.А. Возделывание эспарцета для создания культурных пастбищ на склоновых землях среднегорной зоны/ Состояние и перспективы увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства: материалы XII Международной научнопрактической конференции / Башкирск. гос. аграр. ун-т, Новосиб. гос. аграр. ун-т [и др.]. - Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2023 - С.32-35.

66. Ирсултанов, А.Г. Эффективность производства говядины и размер групп скота на откорме /А.Г. Ирсултанов // Молочное и мясное скотоводство, 1982. №10. С. 31-33.

67. Калашников, А.П. Достижения в науке о кормлении животных / А.П. Калашников // Вестник с.- х. науки 1978. № 1. С. 49-54.

68. Карликов, Д.В. Методы разведения черно-пестрого скота/ Д.В. Карликов, О.Г. Цветкова, Е.В. Ногинова // Зоотехния. 2001. №2. С. 5-9.

69. Карликов, Д.В. Хозяйственно-биологические качества симментальских и симментал × красно-пестрых голштинских первотелок (F₁) на двух уровнях формирования молочной продуктивности / Д.В. Карликов, П.С. Катмаков // Использование мировых генетических ذخираов для совершенствования отечественных пород скота: Сб. тр. ВНИИтчем. М., 1990. С. 21-27.

70. Каюмов, Ф.Г. Продуктивность калмыцкого скота южноуральского типа / Ф. Каюмов, В. Габидулин, Л. Сурундаева // Молочное и мясное скотоводство. -2010. -№ 4. -С. 11 – 13.

71. Каюмов, Ф.Г. Репродуктивные качества телок казахской белоголовой породы и ее помесей с быками высокорослых мясных пород

/ Ф. Каюмов, Т. Сидихов // Молочное и мясное скотоводство. -2013.-№5. - С.4-6.

72. Каюмов, Ф.Г. Мясная продуктивность и биологические особенности бычков и кастратов калмыцкого и казахского белоголового пород / Ф.Г. Каюмов // Автореф. дисс...канд. с.-х. наук. Оренбург. 1974. 23 с.

73. Каюмов, Ф.Г. Мясная продуктивность и биологические особенности бычков и кастратов калмыцкого и казахского белоголового пород / Ф.Г. Каюмов // Автореф. дисс. канд. с.-х. наук. Оренбург. 1974. 23 с.

74. Каюмов, Ф.Г. Мясное скотоводство: отечественные породы и типы, племенная работа, организация воспроизводства стада / Ф.Г. Каюмов / Монография: М.: Вестник РАСХН. 2014. 216 с.

75. Косилов, В.И. Показатели роста, развития и этологической реактивности молодняка, полученного путём двух-трёхпородного скрещивания красного степного скота с англерами, симменталами и герефордами/В.И. Косилов, С.И. Мироненко, Д.А.Андриенко//Вестник мясного скотоводства. -2014.- №5(88). -С. 16-19.

76. Косилов, В.И. Клинические и гематологические показатели чёрно-пёстрого скота разных генотипов и яков в горных условиях Таджикистана / В.И. Косилов, Т.А. Иргашев, Б.К. Шабунова, Д. Ахмедов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 1 (51). С. 112-115.

77. Косилов В.И. Влияние пробиотической добавки Ветоспорин-Актив на эффективность использования энергии ратсионов лактирующими коровами чёрно-пёстрой породы / В.И. Косилов, И.В. Миронова// Вестник мясного скотоводства. 2015. № 2 (90). С. 93-98.

78. Косилов, В.И. Потребление питательных веществ и баланс азота у коров чёрно-пёстрой породы при введении в их ратсион пробиотического препарата Ветоспорин-Актив / В.И. Косилов, И.В. Миронова //Известия Оренбургского государственного аграрного университета. -2015. - № 3 (53). -С. 122-124..

79. Косилов, В.И. Научные и практические основы увеличения производства говядины при создании помесных стад в мясном скотоводстве : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / В.И. Косилов, - Оренбург, 1995. - 48 с.
80. Косилов, В.И. Потребление и использование питательных веществ ратсионов бычками разных генотипов / В.И. Косилов, И.В. Миронова // Вестник мясного скотоводства. -2015. -№1 (89). -С. 78-82.
81. Косилов, В.И. Эффективность использования энергии ратсионов коровами чёрно-пёстрой породы при скармливании пробиотической добавки Ветоспорин-Актив/ В.И. Косилов, И.В. Миронова//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. -2015. - № 2 (52). -С. 179-182.
82. Косилов, В.И. Влияние пробиотической добавки Ветоспорин-Актив на эффективность использования энергии ратсионов лактирующими коровами чёрно-пёстрой породы/ В.И. Косилов, И.В. Миронова//Вестник мясного скотоводства. -2015. -№ 2 (90). -С. 93-98.
83. Косилов, В.И. Создание помесных стад в мясном скотоводстве / В.И. Косилов, С.И. Мироненко. - М.: ООО ЦП «Васиздат», 2009. - 304с.
84. Косилов, В.И. Эффективность использования питательных веществ ратсионов бычками чёрно-пёстрой породы и её двух-трёхпородных помесей / В.И. Косилов, И.В. Миронова, А.В. Харламов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2015. - № 2 (52). - С. 125-128.
85. Косилов В.И., Никонова Е.А., Пекина Н.В. [и др.] Потребление и использование питательных веществ ратсионов бычками симментальской породы при включении в ратсион пробиотической добавки Биогумитель 2Г / В.И. Косилов, Е.А. Никонова, Н.В. Пекина [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2017. -№ 1 (63). -С. 204 - 206.

86. Костомахин, Н.М. Состояние и перспективы совершенствования крупного рогатого скота красной степной породы / Н.М. Костомахин // Главный зоотехник. - 2005. - №5. - С. 25-28.
87. Костомахин, Н.М. Адаптационные и продуктивные качества крупного рогатого скота различного экогенеза / Н.М. Костомахин // Главный зоотехник. 2005. №9. С. 33-34.
88. Красота, В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / В.Ф. Красота, В.Т. Лобанов, Т.Г. Джапаридзе. М.: Колос. 1983. 321 с.
89. Кулешов, П.Н. Теоретические работы по племенному животноводству / П.Н. Кулешов. М.: Сельхозгиз. 1947. 223 с
90. Латыпов, Ф.Ф. Эффективность промышленного скрещивания казахской белоголовой и немецкой пятнистой пород / Ф.Ф. Латыпов // Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. Оренбург, 2002. 20 с.
91. Левантин, Д.Л. Использование свехремонтных телок для производства говядины/Д.Л. Левантин, А.В. Черкаев //Зоотехния. - 1991 .- №4. - С.43-48.
92. Левантин, Д.Л. Теоретические основы интенсивного производства говядины // Интенсификация производства говядины / Д.Л. Левантин // Сборник статей. М., Колос. 1966, 1968, 1974. 202 с.
93. Левантин, Д.Л. Увеличение производства говядины / Д.Л. Левантин // Зоотехния.-1990. - №3. - С. 48-53.
94. Левантин, Д.Л. Эффективность выращивания и откорма на мясо помесей / Д.Л. Левантин. - Боровск, 1980. - Вып. 60. - С.70-73.
95. Левахин, В.И. Мясное скотоводство: проблемы и пути их решения / В.И. Левахин // Вестник мясного скотоводства. Тр. Всерос. НИИ мясного скотоводства. Оренбург, 2002. Вып. 55. С. 3-9.
96. Легошин, Г.П. Мясная продуктивность крупного рогатого скота в зависимости от генетических и технологических факторов Г.П. Легошин 2013, Д.Л. Левантин // Научно-техн. Бюлл. ВИЖа, Дубровицы. 1990. Вып.

100. С. 1-76.

97. Легошин, Г.П. Прогнозирование сортового состава туши у бычков разных генотипов / Г.П. Легошин, С.М. Долгачев, Г.Ю. Калинин // Молочное и мясное скотоводство. 2002. №4. С. 12-14.

98. Легошин, Г.П. Производство говядины в России: проблемы и перспективы развития / Г.П. Легошин // Мясные технологии. 2009. №1. С. 48-51.

99. Лискун Е.Ф. Выращивание молодняка крупного рогатого скота мясо-молочных и мясных типов / Е.Ф. Лискун // Избранные труды. М.: Сельхозгиз. 1961. 534 с.

100. Логинов, С.Б. Мясная продуктивность чистопородных кастратов казахской белоголовой, симментальской и шаролеизской пород и их полукровных помесей / С.Б. Логинов, А.А. Салихов // Тезисы докл. науч.-практ. конф. – Оренбург, 1993. – С. 28-29.

101. Логинов, С.Б. Мясная продуктивность чистопородных кастратов казахской белоголовой, симментальской, шаролеизской пород и их полукровных помесей / С.Б. Логинов, А.А. Салихов // Тез. докл. XII межрегионал. Науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. Оренбург. 1995. С. 28-29.

102. Мамаев, И.И.. Рост, развитие и гематологические показатели бычков черно-пестрой породы и ее двух-, трехпородных помесей / И.И. Мамаев, Х.Х. Тагиров, Р.С. Юсупов, И.В. Миронова // Молочное и мясное скотоводство. -2014.-№2.- С2-4.

103. Мазуровский, Л.З. Племенная ценность и адаптационные качества бычков герефордской породы разных эколого-генетических групп / Л.З. Мазуровский, Н.П. Герасимов, Е.В. Заикина // Вестник мясного скотоводства. Оренбург. Вып. 63 (1). 2010. С. 36-41.

104. Макаев, Ш.А. Казахский белоголовый скот и его совершенствование / Ш.А. Макаев, Ф.Г. Каюмов, Е. Насамбаев // Монография. М., Вестник РАСХН. 2011. 336 с.

105. Мамаев И.И. Рост, развитие и гематологические показатели бычков чернопестрой породы и ее двух-, трехпородных помесей / И.И. Мамаев, Х.Х. Тагиров, Р.С. Юсупов, И.В. Миронова // Молочное и мясное скотоводство. 2014. № 2. С. 2-4..
106. Миронова, И.В. Характеристика мясной продукции молодняка черно-пестрой породы и ее помесей с салерсами / И.В. Миронова, Д.Р. Гильманов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2012. №2 (26). С. 45-49.
107. Могиленец, О.Н. Оценка товарных туш и мяса говядины / О.Н. Могиленец, Г.В. Епифанов, Г.П. Легошин // Зоотехния. 1999. №12. С. 20-23.
108. Никифорова, Л.Н. Молочная продуктивность первотелок разных генотипов / Л.Н. Никифорова // Производство экологически чистой безопасной продукции растениеводства и животноводства: материалы междунар. науч.-практич. конф. Брянск, 2004. С. 408-411..
109. Нусов Н.И. Производство говядины на промышленной основе / Н.И. Нусов, А.А. Панкратов, Л.Л. Комаров. М.: Колос. 1977. 314 с.
110. Овсянников, А.И. Методы выведения пород сельскохозяйственных животных. Генетические основы селекции животных / А.И. Овсянников. М.: Наука. 1969. С. 295-307.
111. Побокков, Г.В. Формирование продуктивных и технологических качеств черно-пестрого скота Заволжья при использовании голштинских быков разного генотипа / Г.В. Побокков // Дис. ... канд. с.-х. наук. Волгоград, 2005. 162 с.
112. Прахов, Л.П. Новая технология выращивания бычков мясных пород/ Л.П. Прахов, Б.Д. //Молочное и мясное скотоводство. - 1992. - № 4. - С. 23-25.
113. Прахов, Л.П. Оценка быков мясных пород по качеству потомства и испытание бычков по интенсивности роста, живой массе, мясным формам / Л.П. Прахов, И.В. Лушников, Д.Г. Савина и др. // Метод, рекомендации.

М.: ВО Агропромиздат. 1990. 17 с.

114. Прахов, Л.П. Рост и развитие комолого и рогатого молодняка казахской белоголовой породы / Л.П. Прахов, Г.А. Чернов, Н.А. Семибратов // В кн. Использование селекционных резервов в производстве говядины. Оренбург. 1975. С. 121-123.

115. Проскуряков, А.Н. Эффективность интенсивного выращивания молодняка крупного рогатого скота калмыцкой породы / А.Н. Проскуряков // Автореф. дисс...канд. с.- х. наук. Улан-Удэ. 1974. 22 с.

116. Рагимов М.И. Производство говядины на промышленной основе в Сибири / М.И. Рагимов, Н.Г. Гамарник, А.Н. Жуков и др. М.: Колос. 1982. 127 с.

117. Рябов, Н. Оптимизация возраста перевода бычков на откормочную площадку / Н. Рябов // Молочное и мясное скотоводство. 2004. №6. С. 9-10.

118. Сабанчиев, З. Рост и мясная продуктивность голштинизированного черно-пестрого скота / З. Сабанчиев, О. Гетоков // Молочное и мясное скотоводство. 1996. №5. С. 8-10.

119. Сизов, Ф.М. Основы сокращения потерь мясной продукции при технологических стрессах в период выращивания, откорма и реализации молодняка крупного рогатого скота / Ф.М. Сизов // Автореф. дисс....доктора с.-х наук. Оренбург. 1999. 42 с.

120. Слюсарь, А.Г. Влияние генотипа по голштинской породе на живую массу и взаимосвязь ее с молочной продуктивностью коров красно-пестрой породы / А.Г. Слюсарь // Совершенствование технологий производства и переработки продукции животноводства: материалы междунар. науч.-практич. конф. Волгоград, 2005. С. 84-85.

121. Смирнов, Д.А. Создание симменталов мясного типа / Д.А. Смирнов, И.И. Насыбулин // Зоотехния. 2002. № 11. С. 5-8.

122. Солошенко, В.А. Выращивание бычков на откормочных площадках

круглогодичного действия на ратсионах с различными уровнями энергии и протеина / В.А. Солошенко // Технология производства продуктов животноводства на промышленной основе: Тр./ СибНИПТИЖ. Новосибирск. 1985. С. 59-63.

123. Тагиров, Х.Х. Изменение промеров тела и особенности экстерьера молодняка чёрно-пёстрой породы и её помесей с породой обрак / Х.Х. Тагиров, Л.А. Гильмияров, И.В. Миронова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. -2012. -№ 1 (29).-С. 85-87.

124. Тагиров, Х.Х. Биоконверсия питательных веществ и энергии корма в съедобные части тела бычками и кастратами разных генотипов / Х.Х. Тагиров, И.В. Миронова, Л.А. Гильмияров // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2011. № 2 (30). С. 108-111.

125. Тагиров, Х.Х. Особенности репродуктивной функции телок черно-пестрой породы при использовании пробиотической кормовой добавки "Биогумитель" / Х.Х. Тагиров, Р.Р. Шакиров, И.В. Миронова // Вестник мясного скотоводства. 2013. № 2 (80). С. 62-67.

126. Тагиров Х.Х. Особенности роста и развития бычков черно-пестрой породы при скармливании пробиотической кормовой добавки Биогумитель / Х.Х. Тагиров, Ф.Ф. Вагапов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2012. № 6 (38). С. 123-126.

127. Тагиров, Х.Х. Особенности роста и развития молодняка чёрно-пёстрой породы и её помесей с породой обрак / Х.Х. Тагиров, Л.А. Гильмияров, И.В. Миронова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2010. № 3 (27). С. 81-83.

128. Танана, Л.А. Эффективность использования голштинской породы для улучшения продуктивных качеств скота / Л.А. Танана, Н.Н. Климов, С.И. Коршун, А.А. Дорошко // Фундаментальные и прикладные проблемы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных в изменившихся условиях системы хозяйствования и экологии: материалы междунар. науч.-практич. конф. Ульяновск, 2005. С. 204-207.

129. Торчков Т. Особенности роста голштинизированных телок в условиях Кабардино-Балкарии / Т. Торчков // Молочное и мясное скотоводство. 1999. №6. С. 8-9.
130. Туников, Г.М. Теория и практика скотоводства / Г.М. Туников, В.В. Калашников, В.А. Захаров, П.И. Зеленков // Рязань. 1996. 212 с.
131. Тюлебаев, С.Д. Продуктивные качества бычков симментальской породы мясного типа / С.Д. Тюлебаев, Н.А. Плохих // Главный зоотехник. -2011. -№ 8. -С. 29-36.
132. Тюлебаев, С.Д. Состояние и перспективы создания симментальской мясной породы в Российской Федерации / С.Д. Тюлебаев, С.А. Мирошников // Вестник мясного скотоводства. - 2010. -Т. 3. -№ 63. -С. 77-83.
133. Усолкина, Н.Н. Показатели естественной резистентности у животных при скрещивании и гибридизации / Н.Н. Усолкина, А.Г. Юферова, К.Б. Кольцова // Производство молока и мяса в условиях Северного Зауралья: Тр. НИИСХ Северного Зауралья. Новосибирск, 1991. С. 33-41.
134. Федоров, В.И. Рост, развитие и продуктивность животных / В.И. Федоров. М.: Колос. 1973. С. 161-176.
135. Фенченко, Н.Г. Биологически активные вещества в питании животных / Н.Г. Фенченко, Ф.Х. Сиразетдинов. Уфа. 2005. 200 с.
136. Хайнацкий, В. Новый подход к оценке племенной ценности производителей в мясном скотоводстве / В. Хайнацкий // Молочное и мясное скотоводство. -2013.-№. 8.- С.7-9.
137. Хайнацкий В.Ю. Совершенствование методов селекции для увеличения темпов генетического прогресса при создании заводских типов животных казахской белоголовой породы / В.Ю. Хайнацкий // Автореф. дисс.... доктора с.-х. наук. Оренбург. 2013. 49 с.
138. Черкаева, И.А. совершенствование технологии производства говядины в промышленных и традиционных условиях

содержания / И.А. Черкаев // Обзорная информ. М., 1982. 53 с.

139. Шевелева, О.М. Совершенствование продуктивных качеств крупного рогатого скота западной Сибири с использованием породных и адаптивных факторов / О.М. Шевелева // Автореф. дис доктора с.-х. наук. Новосибирск. 2006. 43 с.

140. Шилов А. Мясная продуктивность симментал х монбельярд х голштинского скота / А. Шилов // Молочное и мясное скотоводство. 2001. №1. С. 25-26.

141. Эрнст, Л.К. Крупномасштабная селекция в скотоводстве / Л.К. Эрнст, А.А. Цалитис. М.: Колос. 1982. 238 с.

ИНТИШОРОТ АЗ РҶӢИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ

Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда

[1-М]. Изатуллоев, С. Динамикаи вазни зинда ва нишондиҳандаҳои забҳи чорвои ирсияташон гуногун дар шароити минтақаи кӯхистони Тоҷикистон / Т.А. Иргашев, В.И.Косилов, **С Изатуллоев**, Ф.С.Амиршоев // Маҷаллаи назариявӣ ва илмию амалӣ. «Кишоварз», -№4 -Душанбе. - 2020.-С. 63-67.

[2-М]. Изатуллоев, С. Нишондиҳандаҳои забҳ ва тағйирёбии морфологии танайи бӯқчаҳои генотипашон гуногун дар шароити минтақаи кӯхистон /**Изатуллоев, С.** // Маҷаллаи назариявӣ ва илмию амалӣ. «Кишоварз», -№4 -Душанбе. -2023 -С. 70-72).

[3-М]. Изатуллоев, С. Тағйирёбии нишондиҳандаҳои гематологии хун ва хусусиятҳои мубодилаи газу энергияи бӯқчаҳои ирсияташон гуногун / Иргашев Т.А., **Изатуллоев С.**, Косилов В.И.,// Гузоришҳои АИКТ,-№ 4, Душанбе. -2023. -С.57-61

Монография

[4-М]. Изатуллоев, С. Истифодаи оқилонаи иқтисодии захираҳои биологии бӯқчаҳои ирсияташон гуногун дар истеҳсоли гӯшти гов /Т.А. Иргашев, В.И. Косилов, Д. Гармаев, В.В. Толочка, И.В. Миронова, Ҳусейнов, М. Ребезев, **С.Изатуллоев.** ш.Душанбе: Нашриёти КВД «Матбаа». 2022. 301 с.

Тавсиянома

[5-М]. Изатуллоев, С., Иргашев, Т.О., Амиршоев, Ф.С., Изатуллоев, С., Хусенов, М., Косилов, В.И. Тавсиянома оид ба сифатҳои маҳсулнокии гӯштии бӯқчаҳои типии чорвои калони сергӯшти тоҷикӣ (дастури методӣ) – Душанбе: КВД “Матбаа”, -2023.- 24 с.

Мақолаҳо дар маҷмуи маводи конференсия ва дигар нашриҳо:

[6-М]. Изатуллоев, С. Намуди зоҳирӣ ва инкишофи қаду қомати бӯқчаҳои ирсияташон гуногун дар шароити минтақаи кӯхистони Тоҷикистон / **Изатуллоев С.** //Конф. IV илмӣ-амалии миллии

(умумироссиягӣ) «Нақши илми кишоварзӣ дар рушди хоҷагии ҷангал ва кишоварзии Шарқи Дур», (11-12 декабри соли 2020, Уссурийск), Уссурийск, 2020.- С-97-102.

[7-М]. Изатуллоев, С. Тадқиқоти муқоисавии нишондодҳои химиявӣ ва биохимиявии сифати гӯшти букҷаҷаҳои ирсияташон гуногун / **С.Изатуллоев, Т.А. Иргашев** // Конф. ҷумҳуриявии илмию амалӣ. «Комёбиҳои биохимияи муосир дар Тоҷикистон», (Душанбе, 17 октябри 2020), Душанбе, 2020. -С. 76-79.

[8-М]. Изатуллоев, С. Сифатҳои маҳсулнокии гӯштии ҷавонаҳои чорвои зотҳои сергӯшт дар минтақаи кӯҳистон / **Т.А.Иргашев, М.Хусейнов, С.Изатуллоев**, [ва дигарон]. Конф. VIII байнал. илмию амалӣ. / Донишгоҳи давлати аграрии Бошқирдистон, Донишгоҳи аграрии Томск. - Новосибирск: Маркази тадқиқотии ИЦ НГАУ «хӯшаи тиллоӣ». - 2020 -С.56-59.

[9-М]. Изатуллоев, С. Нишондиҳандаҳои муқоисавии забҳи букҷаҷаҳои ирсияташон гуногун дар шароити минтақаи кӯҳистон/Т.А.Иргашев, **С.Изатуллоев, В.И. Косилов** //Саноат ва истеҳсолоти кишоварзӣ: ҳолат ва дурнамои рушд» Душанбе. 2021. -С.125-132.

[10-М]. Изатуллоев, С. Сифатҳои забҳ ва таркиби морфологии гӯшти букҷаҷаҳои ирсияташон гуногун дар шароити минтақаи кӯҳистони Тоҷикистон / **Т.А.Иргашев, В.И. Косилов, Изатуллоев С.** //Конференсияи ияи IV Миллии (умумироссиягӣ) бо иштироки олимони байналмилалӣ (Новосибирск, 26 феввали 2021) / Донишгоҳи давлатии аграрии Новосибирск: Маркази иттилоотии ИЦ НГАУ «Хӯшаи тиллоӣ», 2021. - С. 669-673.

[11-М]. Изатуллоев, С. Хусусиятҳои физиологии нишондиҳандаҳои букҷаҷаҳо вобаста ба синну сол ва мавсим дар шароити кӯҳистон / **М. Хусейнов, Т.А. Иргашев, С.Изатуллоев**// Амнияти озуқаворӣ ва рушди

деҳот» (Луганск, 25 январ - 08 феввали 2021). - Луганск: GOU VO LNR LSAU, 2021 - С.204-206

[12-М]. Изатуллоев, С. Тағйирёбии мавсимии рафтори ҷавонаҳои ирсияташон гунун дар шароити кӯҳистон // Т.А. Иргашев, **Изатуллоев С.** М.Хусейнов, Д.М. Ахмедов / Маҷмуаи мақолаҳои илмӣ. Конференсияи илмӣ-амалӣ: Технологияҳои инноватсионии истеҳсолот, коркарди маҳсулоти чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбӯриасалпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. ДАТ (29 март 2022). ҶДММ «Нӯшоб». Душанбе, 2022. - С. 166-168.

[13-М]. Изатуллоев, С. Таъсири генотип ба мубодилаи газу энергия дар гӯсолаҳои гов дар шароити кӯҳистон /Т.А. Иргашев, М. Хусейнов, Конф. байналмилалӣ бахшида ба 85-солагии академик Х.М. Сафаров (04.05.2022). Донишгоҳи миллии Тоҷикистон - ДМТ. - Душанбе, 2022. -С. 193-197.

Замима

**Санад оид ба дар амал тадқиқ намудани натиҷаҳои корҳои илмӣ ва
таҳқиқоти дар истеҳсолот**

дар асоси натиҷаҳои кори рисолаи илмӣ Иззатуллоев Сафар дар мавзӯи «Сифатҳои маҳсулнокии буккачаҳои ҷорҳои калони сергӯшти тили тоҷикӣ ва дураҳои онҳо», ҳангоми дар ҷароғҳои ғиёҳ доштан оид ба навъи тоҷикӣ ғиёҳҳои калони гӯшти ки дар Кооперативӣ «Кангурт» ва хоҷагии деҳқонии «Файзобод»-и ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2018-2021 гузаронида шудааст.

Дар хоҷагии кооперативии «Кангурт» ва хоҷагии деҳқонии «Файзобод»-и ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон таҷрибаҳои илмӣ оид ба омӯзиши маҳсулнокии гӯшт ва хусусиятҳои биофизиологии буккачаҳои ҷорҳои калони тили тоҷикӣ дар шароити қўҳистони вилояти Хатлон гузаронида шуданд.

Дар асоси таҳқиқоти ҷидаиёсодани олимони Институтҳои ҷорводорӣ ва ҷароғҳои Академияи илмҳои хоҷагии кишлоки Тоҷикистон ва мутахассисони хоҷагиҳои тили тоҷикӣ ҷорҳои калони гӯшти ба вуҷуд оварда, тасдиқ карда шуд (Протоколи № 03 Совети илмӣ-техникӣ). Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, № 1/2 аз 04.03.2023 с.) ва шаҳодатномаи муаллифӣ (дастгоҳи селекционӣ № Тҷ 07) як қатор муаллифони ва т. Ҷамъияти илмӣ шӯбаи селекция ва технологияи ҷорводорӣ гӯшти, кутоспарварӣ ва аспарварӣ Иззатуллоев С.И. Натиҷаҳои ба даст овардан қисми диссертация дар хоҷагиҳои ноҳияҳои қўҳистони вилояти Хатлон ҷорӣ карда шуданд.

Дар асоси таҳқиқоти ва озмоишҳои истеҳсоли бо мақсади зиёд намудани истеҳсоли гӯшти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва самаранокӣ иқтисодии соҳаи ҷорводорӣ гӯшти ба истеҳсолкунаандгонии ғиёҳҳои гӯшти тавсия медиҳем, ки бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ аҳолии вилоят бо маҳсулоти ҳайвонот ва мақсади иқтисодии парварishi ғиёҳи маҳсули гӯшти тавсия дода мешавад, ки буккачаҳои барвақтпази тили тоҷикӣ ҷорҳои калони гӯшти парварishi карда шаванд.

Тавсияҳои пешниҳоднамудан унвонҷӯ дар хоҷагиҳои зотпарварӣ ва сектори хусусӣ, ки ҷорҳои гӯштиро парварishi менамоянд, сарфи назар аз шакли моарифат татбиқ карда шуда, дар мамлакат гӯшти хушнӯш истеҳсол карда шаванд.

Директори хоҷагии
кооперативии Кангурт



Ғаниев Ф.